DE SOLIS AC LVNAE DEFECTIBVS

LIBRI V.


DE SOLIS AC LUNAE DEFECTIBUS LIBRI V.

P. ROGERII IOSEPHI BOSCOVICH,
SOCIETATIS JESU,
AD REGIAM SOCIETATEM LONDINENSEM.

Ibidem autem

Et ASTRONOMIAE Synopsis,
Et Theoria LUMINIS Newtoniana,
Et alia multa ad PHYSICAM pertinentia,
VERSIBUS PERTRACTANTUR,
Cum ejusdem Auctoris adnotationibus.

EDITIO VENETA PRIMA
Ex exemplari editionis Londinensis anni 1760.
Correcto, et perpolito ab ipso Auctore.



VENETIIS, MDCCLXI.
TYPIS ANTONII ZATTA.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

EDITOR VENETUS
LECTORI.

Habes, amice Lector, editionem primam Italicam operis jamdiu desiderati, quod Auctor toti Reip. Litterariae notissimus demum edidit Londini ante hosce sex menses sub ipsum finem anni 1760. Erat ea quidem omnino necessaria; cum Londinenses libri pauci admodum ad nos deveniant, et nimis magno pretio constent, quod quidem accidet editioni illi ipsi, quae est non solum elegantissima, sed magnifica sane in quarto. Nos, ut et molem voluminis contraheremus, et minueremus pretium, hanc adhibuimus minorem formam, in qua tamen adornanda multo plus et operae, et pecuniae impendimus, ut per te ipse vide-

re poteris, quam fieri soleat in iis libris, qui commercii causa imprimuntur hic apud nos. Illud in primis curavimus, quod in eo potissimum genere plerumque negligitur, ut, quam fieri posset, correctissima prodiret editio.

Nacti autem sumus exemplar ab ipso Auctore *diligentissime expensum, et correctum, in cujus fine habetur ejus manu descriptum additamentum illud, quod ibi invenies, ubi et illud videbis, cur id in Londinensi editione fuerit omissum. Ibidem autem is profitetur, se plures in eo exemplari correxisse errorculos tam typorum, quam, ut ipse appellat, praeproperae scriptionis; sunt autem hujusce generis nonnullae voculae, quae hac illac, paucae admodum, ipsi effugerant aliae pro aliis, potissimum in adnotationibus. Occurrunt autem in eodem exemplari loca etiam nonnulla, quae mutatione per-*

perquam exigua unius, vel alterius vocis, aut additiuncula brevissima videtur voluisse expolire magis; quae omnia cum huc diligenter transtulerimus, arbitramur, hanc nostram editionem illi ipsi Londinensi, utcumque usque adeo elegantiori, longe praestare.

In illud itidem incubuimus maxime, ne dum praecedentis editionis errores corrigebamus, novi nobis irreperent. Idcircò adhibuimus et correctores plures, et correctiones: adhuc tamen effugerunt nonnulli; cum nulla humana mens satis diu in eadem illa ingenti contentione, qua hic opus esset, perdurare possit, quin identidem evagetur nonnihil. Quamobrem illud quoque curavimus, ut iterum post impressionem singula folia diligenter relegerentur, et errorculorum, qui deprehensi sunt, catalogum adjecimus, qui quidem multo brevior extitisset, si eos omisissemus,

 quos

quos primo intuitu per te ipse facile posses corrigere, cujusmodi sunt fere omnes; sed satius duximus, eos etiam adnotare; ita enim confidimus, fore omnino, ut Auctori ipsi faciamus satis, qui de suorum Elementorum Matheseos editione Veneta (non tamen nostra) jure sane ita conqueritur ob immanem errorum numerum, qui eam reddunt fere prorsus inutilem, ut illud opus ita impressum pro suo non agnoscat.

Titulum Operis Londinensem retinuimus totum, in quo quidem notatu sane dignum occurrit illud P. Rogerii Josephi Boscovich Societatis Jesu ad Regiam Societatem Londinensem. *Id quidem satis ostendit, quanti hisce ipsis usque adeo calamitosis temporibus ipse Auctor suum Ordinem faciat, et amet, cujus se publice profiteatur apud ipsos Heterodoxos, apud quos est hospitatus per menses septem, mutatis*

vesti-

vestibus, non animo. Ii vero, qui ipsum id opus ita offerentem non solum cum omnibus et humanitatis, et benevolentiae significationibus exceperint, sed in eumdem suum litterarium coetum adscripserint (adscripserunt autem statim post illam hujus operis editionem) satis itidem indicarunt quanti ipsum faciant, & quid de illo judicent Ordine, ad quem is pertinet, et cui ita firmiter adhaeret. Solum in nostro titulo illud adjecimus, nos hanc editionem comparasse ex Londinensi exemplari correcto, et perpolito ab ipso Auctore.

Illud praeterea tibi nos gratum facturos arbitrati sumus, si adderemus catalogum eorum omnium, quae is huc usque typis edidit, inter quae Dissertationum in primis ingens habetur numerus, quarum plures ita rarae jam sunt, ut paucissima supersint exemplaria,

ria, priorum in primis, quae tantummodo occasione publicarum Disputationum editae sunt exemplarium numero nimis exiguo, nec usquam jam prostant venalia, licet saepe ingenti etiam proposito pretio conquirantur. Censemus nos hic habere completum Catalogum ejus et Operum, et Dissertationum, et Schediasmatum, quorum fere omnium genuinos invenimus titulos. Utinam ad manus essent exemplaria etiam omnium, ut liceret collectionem edere, quod quidem curaturum olim speramus Auctorem ipsum reducem e praesenti suo Constantinopolitano itinere. En interea Catalogum ipsum, quem hic subjicimus.

CA-

CATALOGUS
OPERUM
P. ROGERII JOSEPHI BOSCOVICH S. J.

impressorum usque ad initium anni 1761.

Opera, & opuscula justæ molis.

Anni primae edition.

SOpra il Turbine, che la notte tra gli 11, e 12 Giugno del 1749 danneggiò una gran parte di Roma. Dissertazione del P. Ruggiero Giuseppe Boscovich della Comp: di Gesù. In Roma appresso Nicolò, e Marco Pagliarini, in 8. — 1749

Elementorum Matheseos tomi tres, in 4. *Prodierunt anno 1752 sub titulo,* Elementorum Matheseos ad usum studiosae juventutis, tomi primi pars prima complectens Geometriam planam, Arithmeticam vulgarem, Geometriam Solidorum, et Trigonometriam cum planam, tum sphaericam. Pars altera, in qua Algebrae finitae elementa traduntur. Romae: excudebat Generosus Salomoni. *Iis binis tomis sine nova eorum impressione mutatus est titulus anno 1754 in hunc,* Elementorum Vniversae Matheseos — 1752

Annus primae edition. thefeos Auctore P. Rogerio Jofepho Bofcovich Soc: Jefù Publico Mathefeos Profeffore Tomus I continens &c. Tomus II continens &c., *& adjectus eft fequens*

1754 Tomus III continens Sectionum Conicarum Elementa novâ quadam methodo concinnata, et Differtationem de Transformatione locorum Geometricorum, ubi de Continuitatis lege, ac de quibufdam Infiniti myfteriis: *Typis iifdem ejufdem Generofi Salomoni omnes in* 8. *Extat eorundem impreffio Veneta anni* 1758, *de qua in Praefatione.*

1755 De Litteraria Expeditione per Pontificiam ditionem ad dimetiendos duos Meridiani gradus, et corrigendam mappam geographicam, juffu, et aufpiciis Benedicti XIV. P. M. fufcepta a Patribus Soc: Jefu Chriftophoro Maire, & Rogerio Jofepho Bofcovich. Romae 1655. In Typographio Palladis: excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini, in 4. *Quidquid eo volumine continetur, eft* Patris Bofcovich *praeter bina brevia opufcula* Patris. Maire, *quae ipfe* P. Bofcovich *inferuit. Proftat etiam Mappa Geographica ditionis Pontificiae delineata a* P. Maire *ex obfervationibus utrique communibus.*

1556 De Inaequalitatibus, quas Saturnus, & Jupiter fibi mutuo videntur inducere, praefertim circa tempus conjunctionis. Opufculum ad Parifienfem Academiam tranfmiffum, et nunc primum editum. Auctore P. Rogerio Jo-

Josepho Boscovich Soc: Jesu; Romae: ex Typographia Generosi Salomoni, in 8. *Annus primae edition.*

Philosophiae Naturalis Theoria redacta ad unicam legem virium in Natura existentium Auctore P. Rogerio Jos: Boscovich S: J: publico Matheseos Professores in Collegio Romano. *Prostat Viennae Austriae in Officina libraria Kalivvodiana: in 4. In fine accedit Epistola ad* P. Carolum Scherffer Soc: Jesu. *Habetur secunda editio Viennensis paullo posterior, et nunc fit tertia hic a Remondino.* 1758

Adnotationes in aliorum Opera.

CAroli Noceti e Societate Jesu de Iride, et Aurora Boreali Carmina... cum notis Josephi Rogerii Boscovich ex eadem Societate. Romae: excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini, in 4. *Perperam nomen* Josephi *antepositum est ibi nomini* Rogerii. 1747

Philosophiae Recentioris a Benedicto Stay in Romano Archigymnasio Publico Eloquentiae Professore.... cum adnotationibus, et Supplementis P. Rogerii Josephi Boscovich S. J. In Collegio Rom. Publici Matheseos Professoris. Tomus I. Romae: Typis, et sumptibus Nicolai, et Marci Palearini, in 8. *Duae ejus editiones prodierunt simul.* 1755

Tomus II. Romae: Typis, et sumptibus Nicolai, et Marci Palearini, in 8.

In

Annus primae edition. In *singulis ex hisce tribus voluminibus ea, quae ad P. Boscovich pertinent, efficerent per se* 1760 *ipsa justum volumen. In solis primi Stayani tomi supplementis occurrunt 39 ipsius Dissertationes de variis argumentis pertinentibus potissimum ad Metaphysicam, et Mechanicam.*

Dissertationes impressae pro exercitationibus annuis, et publicè propugnatae: omnes in 4.

1736 DE Maculis Solaribus. Exercitatio Astronomica habita in Collegio Romano Soc: Jesu. Romae: ex Typographia Komarek.

1737 De Mercurii novissimo infra Solem transitu. Dissertatio habita in Seminario Romano. Romae, Typis Antonii de Rubeis.

Constructio Geometrica Trigonometriae sphaericae. Romae, ex Typographia Komarek. *Hujus titulus vel est hic ipse, vel parum ab hoc differt.*

1738 De Aurora Boreali Dissertatio habita in Seminario Romano. Romae: Typis Antonii de Rubeis. *Eadem eodem anno edita fuit etiam typis Komarek.*

1739 De Novo Telescopii usu ad objecta coelestia determinanda. Dissertatio habenda a PP. Soc: Iesu in Collegio Romano. Romae, ex Typographia Komarek. *Extat recusa sine ulla mutatione in Actis Lipsiensibus ad annum* 1740.

De Veterum argumentis pro Telluris sphaerici-

ricitate. Dissertatio habita in Seminario Romano Soc: Jesu. Romae: Typis Antonii de Rubeis.

Annus primae edition.

Dissertatio de Telluris Figura habita in Seminario Romano Soc: Jesu. Romae: Typis Antonii de Rubeis. *Eadem prodiit in 8. anno* 1744 *in opere, cui titulus* Memorie &c. In Lucca per li Salani, e Giuntini, *& in titulo additur*: nunc primum aucta, et illustrata ab ipsomet Auctore; *sed ea editio scatet typorum erroribus, ut et reliqua inferius nominanda in eadem collectione inserta.*

De Circulis Osculatoribus. Dissertatio habenda a PP. Societatis Jesu in Collegio Romano Romae: ex Typographia Komarek. 1740

De Motu corporum projectorum in spatio non resistente. Dissertatio habita in Seminario Romano Soc: Jesu. Romae: Typis Antonii de Rubeis.

De Natura, et usu infinitorum, et infinitè parvorum. Dissertatio habita in Collegio Romano Soc: Jesu. Romae: ex Typographia Komarek. 1741

De Inaequalitate gravitatis in diversis Terrae locis. Dissertatio habita in Seminario Romano Soc: Jesu. Romae: Typis Antonii de Rubeis.

De Annuis Fixarum aberrationibus. Dissertatio habita in Collegio Romano Societatis Jesu. Romae: ex Typographia Komarek. 1742

D

Annus primae edition. De Obſervationibus Aſtronomicis, et quo pertingat earundem certitudo. Diſſertatio habita in Seminario Romano Soc: Jeſu. Romae: Typis Antonii de Rubeis.

Diſquitio in Univerſam Aſtronomiam publicae Diſputationi propoſita in Collegio Romano Soc: Jeſu. Romae: ex Typographia Komarek.

1743 De Motu Corporis attracti in centrum immobile viribus decreſcentibus in ratione diſtantiarum reciproca duplicata in ſpatiis non reſiſtentibus. Diſſertatio habita in Collegio Romano. Romae: Typis Komarek. *Eadem prodiit anno 1747 ſine ulla mutatione in Commentariis Acad. Bononienſis Tom. II. par. III.*

1744 Nova methodus adhibendi phaſium obſervationes in Eclipſibus Lunaribus ad exercendam Geometriam, et promovendam Aſtronomiam. Diſſertatio habita in Collegio Romano. Romae: ex Typographia Komarek. *Eadem prodiit, in 8. anno 1747 cum exigua mutatione, vel additamento in Opere ſuperius memorato, cui titulus* Memorie &c. In Lucca per li Salani, e Giuntini.

1745 De Viribus Vivis Diſſertatio habita in Collegio Romano Soc: Jeſu. Romae: Typis Komarek. *Eadem prodiit anno 1747 ſine ulla mutatione in Commentariis Acad: Bonon: To. II. par: III, et in Germania pluribus vicibus eſt recuſa.*

1746 De Cometis. Diſſertatio habita a PP. Soc: Jeſu

Jesu in Collegio Rom. Romae: ex Typographia Komarek.

Annus primae edition.

De Aestu Maris Dissertatio habita a PP. Soc: Jesu in Collegio Romano. Romae: ex Typographia Komarek. *Ea est Dissertationis pars 1.; secunda pars nunquam prodiit. Quae pro illa fuerant destinata, habentur in Opere* de Expeditione Litteraria, *& in supplementis Philosophiae Stayanae tomo* II. 1747

Dissertationis de Lumine pars prima publicè propugnata in Seminario Romano Soc: Jesu. Romae: Typis Antonii de Rubeis. 1748

Dissertationis de Lumine pars secunda publicè propugnata a PP. Soc: Jesu in Collegio Romano. Romae: ex Typographia Komarek.

De Determinanda Orbita Planetae ope Catoptricae, ex datis vi, celeritate, et directione motus in dato puncto. Exercitatio habita a PP. Soc: Jesu in Collegio Romano. Romae: ex Typographia Komarek. 1749

De Centro Gravitatis. Dissertatio habita in Collegio Romano Soc: Jesu. Romae: ex Typographia Komarek. *Eadem paullo post prodiit iterum cum sequenti titulo, & additamento.* De Centro Gravitatis. Dissertatio publicè propugnata in Collegio Romano Soc: Jesu Auctore P. Rogerio Josepho Boscovich Societatis ejusdem. Editio altera. Accedit Disquisitio in centrum Magnitudinis, qua quædam in ea Dissertatione proposita, atque alia iis affinia demonstrantur. 1751

** Romae,

Annus primae edition. Romae : Typis , et sumptibus Nicolai , et Marci Palearini.

1753 De Lunae Atmosphaera . Dissertatio habita a PP. Soc: Jesu in Collegio Romano . Romae : ex Typographia Generosi Salomoni . *Multa eorundem typorum exemplaria prodierunt paullo post cum nomine Auctoris in ipso titulo , et cum exigua unius loci mutatione .*

1754 De Continuitatis Lege , et Consectariis pertinentibus ad prima materiae elementa , eorumque vires . Dissertatio habita a PP. Societatis Jesu in Collegio Romano . Romae : ex Typographia Generosi Salomoni .

1755 De Lege virium in Natura existentium . Dissertatio habita a PP. Soc: Jesu in Collegio Romano . Romae : Typis Generosi Salomoni ,

De Lentibus , et Telescopiis dioptricis . Dissertatio habita in Seminario Romano . Romae : ex Typographia Antonii de Rubeis .

Plures ex hisce Dissertationibus prodierunt etiam iisdem typis , sed cum alio titulo , habente non locum , ubi sunt habitae , vel propugnatae , sed tantummodo nomen Auctoris . In hac postrema mutatae sunt binae paginae , posteaquam plurima exemplaria fuerant distracta . In prioribus tribus sunt pauca quaedam mutata , vel addita a P. Horatio Burgundio *adhuc Professore Matheseos in Collegio Romano , qui fuerat ejus Praeceptor ; sed eo jam ad Dissertationes ejusmodi conscribendas utebatur.*

Eae omnes , quae pertinent ad Seminarium Romanum

manum, habent in ipso titulo adscripta nomina Nobilium Convictorum, qui illas propugnarunt, et sub eorum nomine referuntur plures ex iis in Actis Lipsiensibus.

Annus primae editionis.

Multa pertinentia ad ipsum P. Boscovich *habentur in binis Dissertationibus, quarum tituli,* Synopsis Physicae Generalis, *et* De Lumine, *quarum utraque est edita* Romae anno 1754, Typis Antonii de Rubeis, in 4. *Id ibidem testatur earundem Auctor (is est* P. Carolus Benvenutus Soc: ejusdem *) affirmans, ea sibi ab eodem* P. Boscovich *fuisse communicata.*

Habetur etiam ampliatio solutionis cujusdam problematis pertinentis ad Auroram Borealem, soluti in adnotationibus ad Carmen P. Noceti, *inserta in quadam Dissertatione impressa Romae circa annum 1756, et publicè propugnata, cujus Auctor est* P. Lunardi *Soc. Jesu, qui affirmant ibidem, se eandem acceptam ab ipso* P. Boscovich *proponere ejusdem verbis.*

Subjicimus jam bina opuscula Italica, quae communi nomine PP.um Le Seur, Jacquier, ac suo conscripsit ipse P. Boscovich. *Utrumque est sine loco impressionis, et nomine Typographi; impresserunt autem Palearini Fratres Romae jussu Praesulis, qui tum curabat Fabricam S. Petri, a quo et publicè distributa sunt per Urbem.*

Annus primae edition.

1742 Parere di tre Matematici, sopra i danni, che si sono trovati nella Cupola di S. Pietro sul fine del 1742, dato per ordine di Nostro Signore Benedetto XIV, in 4. *In fine opusculi habentur subscripta omnium tria nomina.*

1743 Riflessioni de' PP. Tomaso Le Seur, Francesco Jacquier dell' Ordine de' Minimi, e Ruggiero Giuseppe Boscovich della Comp. di Gesù sopra alcune difficoltà spettanti i danni, e risarcimenti della Cupola di S. Pietro proposte nella Congregazione tenutasi nel Quirinale a' 20 Gennaro 1743, e sopra alcune nuove Ispezioni fatte dopo la medesima Congregazione.

1757 *Habentur itidem Italico sermone binae ex iis, quas Itali vocant* Scritture, *pro quadam lite Ecclesiae S. Agnetis Romanae, pertinentes ad aquarum cursum Romae editae anno 1757.*

Inserta.

Nunc faciemus gradum ad inserta in Publicis Academiarum monumentis, in diariis, in collectionibus, et in privatorum Auctorum Operibus.

In Monumentis Acad: Bononiensis.

Praeter reimpressionem binarum Dissertationum in To. II, *de quibus supra, habetur in To.* IV

1757 De Litteraria Expeditione per Pontificiam ditio-

ditionem. *Est Synopsis amplioris Operis, ac habeatur plura ejus exemplaria etiam seorsum impressa.* *Annus primae editionis*

In Romano Litteratorum diario vulgo Giornale de' Letterati appresso i Fratelli Pagliarini.

D'Un antica villa scoperta sul dosso del Tuscolo: d' un antico Orologio a Sole, e di alcune altre rarità, che si sono tra le rovine della medesima ritrovate. Luogo di Vitruvio illustrato. *Ibi ejus schediasmatis Auctor profert, uti ipse profitetur, quae sigillatim audierat ab ipso* P. Boscovich. 1746

Dimostrazione facile di una principale proprietà delle Sezioni Coniche, la quale non dipende da altri Teoremi conici, e dissegno di un nuovo metodo di trattare questa dottrina.

Dissertazione della Tenuità della Luce Solare. Del P. Ruggiero Gius: Boscovich Matematico del Collegio Romano. 1747

Dimostrazione di un passo spettante all' angolo massimo, e minimo dell' Iride, cavato dalla prop: IX par: 2 del libro I dell'Ottica del Newton con altre riflessioni su quel capitolo. Del P. Rug: Gius: Boscovich della Comp: di Gesù.

Metodo di alzare un Infinitinomio a qualunque potenza. Del P. Rug: Gius: Boscovich.

Annus primae edition.

1748 Parte prima delle Riflessioni sul metodo di alzare un Infinitinomio a qualunque potenza. Del P. Ruggiero Giuf. Boscovich della Comp: di Gesù.

Parte seconda &c.

Soluzione Geometrica di un Problema spettante l'ora delle alte, e basse maree, e suo confronto con una soluzione algebraica del medesimo data dal Sig. Daniele Bernoulli. Del P. Ruggiero Giuseppe Boscovich della Compagnia di Gesù.

Dialogi Pastorali V sull'Aurora Boreale del P. Ruggiero Giuf: Boscovich della Comp: di Gesù.

1749 Dimostrazione di un metodo dato dall' Eulero per dividere una frazione razionale in più frazioni più semplici con delle altre riflessioni sulla stessa materia.

1750 Lettera del P. Ruggiero Giuf: Boscovich della Comp: di Gesù al Sig: Ab: Angelo Bandini in risposta alla lettera del Sig: Ernesto Freeman sopra l'Obelisco d' Augusto. *Nomen*, Freeman *est fictitium*, *Auctorem denotans Neapoli latentem, et aliis Operibus satis notum. Extat eadem etiam in folio.*

Altera de eodem Obelisco admodum prolixa Epistola, Italice, et Latine scripta ad eundem Bandinium *suo nomine ab ipso* P. Boscovich *habetur in ejusdem Bandinii Opere, cui titulus*, De Obelisco Caesaris Augusti e Campi Martii ruderibus nuper eruto. Commentarius Au-

ctore

ctore Angelo Maria Bandinio. Romae apud Fratres Palearinos, in folio. *Ibidem in fine habetur alia epistola itidem admodum prolixa de eodem argumento nomine* Stuarti, *e cujus schedis relictis apud Cardinalem Valentium in ejus discessu ab Urbe eam Epistolam conscripsit, ac ejus comperta illustravit, ac auxit ipse* P. Boscovich. — *Annus primae edition.*

Osservazioni dell'ultimo passaggio di Mercurio sotto il Sole seguito a' 6 di Maggio 1753, fatte in Roma, e racolte dal P. Ruggiero Giuf: Boscovich della Comp: di Gesù con alcune riflessioni sulle medesime. — 1753

In aliis Monumentis.

IN *Collectione Opusculorum Lucensi cui titulus.* Memorie sopra la Fisica, e Istoria naturale di diversi Valentuomini. In Lucca per li Salani, e Giuntini, in 8., *praeter binas dissertationes, de quibus supra, habetur,*

Problema Mecanicum de solido maximae attractionis solutum a P. Rogerio Josepho Boscovich Soc. Jesu Publico Professore Matheseos in Collegio Romano: Tomo I. — 1743

De Materiae divisibilitate, et Principiis corporum. Dissertatio conscripta jam ab anno 1748, et nunc primum edita. Auctore P. Rogerio Jos. Boscovich Soc. Jesu, To. IV. — 1757

Omnium horum quatuor Opusculorum habentur etiam exemplaria seorsum impressa.

** 4 *In*

Annus primae edition. 1745 *In editione Elementorum Geometriae* Patris Taqueti *facta Romae sumptibus* Venantii Monaldini, Typis Hieronymi Mainardi, in 8. habetur Trigonometria sphaerica P. Rogerii Josephi Boscovich, *quae deinde adhuc magis expolita prodiit Tomo I. ejus* Elementorum Matheseos. *Habetur praeterea ibidem Tractatus* De Cycloide, et Logistica, *qui etiam seorsum impressus est iisdem typis.*

1752 *In Opere Comitis Joannis Baptistae Soardi, cui titulus*, Nuovi instromenti &c. in Brescia dalle stampe di Gio: Battista Rizzardi, in 4., *habentur binae epistolae Italicae ipsius* P. Boscovich *de Curvis quibusdam, cum figuris, et demonstrationibus.*

1758 *In Optica Abbatis De la* Caille *latinè reddita* a P. Carolo Scherffer Soc: Jesu, *et impressa Viennae in Austria habetur schediasma* Patris Boscovich de Micrometro objectivo.

In postremo tomo Commentar. Academiae Parisiensis in Istoria, et in uno e tomis *Correspondentium ejusdem Academiae, creditur esse breve aliquid pertinens ad ipsum* P. Boscovich.

Poëtica.

1753 P. Rogerii Josephi Boscovich Soc. Jesu (inter Arcades Numenii Anigrei Ecloga recitata in publico Arcadum consessu primo Ludorum Olympicorum die, quo die Michael

chael Josephus Morejus Generalis Arcadiae Custos illustrium Poëtarum Arcadum effigies formandas jaculorum ludo substituerat. Romae in 8. *Extat eadem iisdem Typis etiam in Collectione tum impressa omnium, quae ea occasione sunt recitata.*

Annus primae edition.

Stanislai Poloniae Regis, Lotharingiae, ac Barri Ducis, et inter Arcades Euthimii Aliphiraei, dum ejus effigies in publico Arcadum Coetu erigeretur, Apotheosis. Auctore P. Rogerio Josepho Boscovich Soc: Iesu inter Arcades Numenio Anigreo. Romae ex Typographia Generosi Salomoni. in 8. *Est poëma versu heroico. Idem autem recusum fuit Nancei cum versione Gallica* Dom. Cogolin. 1753

Pro Benedicto XIV. P. M. Soteria. *Est itidem poema Heroicum ejusdem* P. Boscovich *pertinens vel ad hunc, vel ad superiorem annum: est autem* impressum Romae in 4. apud Fratres Palearinos, occasione periculi mortis imminentis, evitati a Pontifice convalescente. 1757

In Nuptiis Joannis Corrarii, et Andrianae Pisauriae e nobilissimis Venetae Reip: Senatoriis familiis. Carmen P. Rogerii, Jos: Boscovich S. J. Publici in Romano Collegio Matheseos Professoris. Romae: ex Typographio Palladis: excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini, in 4. 1758

Est et aliud ejus poëma Heroicum anno 1756 *im-*

Annus primae edition.

impressum Viennae in Austria in collectione carminum facta occasione inaugurationis novarum Academiae Viennensis aedium.

Sunt & epigrammata nonnulla in Collectionibus Arcadum, inter quae unum pro recuperata valetudine Joannis V *Lusitaniae Regis, et unum Pro Rege tum utriusque Siciliae, nunc Hispaniae, ac pro Regina ejus conjuge.*

Extant etiam pauca admodum exemplaria unius ex illis, quas in Italia appellamus Cantatine, *impressa Viterbii anno 1750 pro Visitatione B. Mariae Virginis, in qua sex, quas dicimus* Ariette, *profanae ad sacrum argumentum transferendae erant, manente Musica, et inter se connectendae.*

In hoc ipso Londinensi Opere habentur in adnotationibus bina Epigrammata cum versionibus Italicis, sive Sonetti.

PRAE-

PRAEFATIO AUCTORIS.

DABIS veniam, amice Lector, si te hìc in ipso limine nonnihil detineo, ut quaedam, quae ad Opus pertinent, quod tibi offero, proponam.

Opus inscribitur *De Solis ac Lunae defectibus*, quod quidem argumentum videtur prima fronte maximè aridum, et jejunum; et quidem fuisset ejusmodi, nisi occasione arrepta, plurima, quae aliquem cum eo nexum habent, pertractanda suscepissem.

Primo libro Astronomiae synopsim quandam exhibui; cum enim plurimis, quae ad astrorum distantias, et motus pertinent, indigerem ad argumentum pro dignitate pertractandum; censui, satius fore, si ea omnia aliquanto fusius in ordinem digesta praemitterem una cum iis, quae Se-

ad quandam coeleſtis theoriae ideam rite concipiendam requirerentur.

Secundo libro ipſam eclipſium naturam aggreſſus, illud explicavi, unde proveniant primo quidem Solis, tum Lunae defectus, quo ordine, et quibus temporum intervallis; ubi et eorum uſum ad Geographiae perfectionem expoſui.

Tertio libro ſum perſecutus phaenomena, quae in ſolari defectu obſervantur, ubi luminis in totalibus Solis eclipſibus circa Solis locum extantis conſideratio, ac plura alia, quae in eclipſibus, vel totalibus, vel partialibus obſervantur, uberem mihi campum aperiunt, per quem latiſſime divagari poſſim.

Quarto libro pertractavi phaenomena, quae pertinent ad Lunae eclipſim, ubi et in penumbrae conſideratione, et in lumine, quod ab

at-

atmoſphaera Terrae refractum in Lunam incidit, contemplando, ſatis amplum itidem argumentum ſum nactus: theoriam autem propoſui diſtributionis hujuſce refracti luminis per umbram Terrae, quam ad eclipſeos Lunaris cognitionem maxime pertinere arbitror, quam quidem alibi nequaquam inveni.

Quinto demum libro illud expoſui, cur Luna in totalibus eclipſibus ſaepe admodum appareat rubro colore infecta, cujus itidem phaenomeni ſatis uberem explicationem alibi non reperi: id autem deduxi tam a refrangibilitate diverſa radiorum diverſos colores exhibentium, quam a vicibus facilioris reflexionis, et facilioris tranſmiſſus, quae duo cum ſint praecipui cardines theoriae luminis NeWtonianae, totam hujuſmodi theoriam; et praecipua ejus con-

confectaria ad Naturae cognitionem maxime opportuna evolvi.

Haec ad argumentum pertinent, quibus episodia immiscui sane multa, ad demulcendum animum severiorum contemplatione defatigatum, quorum episodiorum praecipua in omnium librorum fine invenies. Veterum itidem Mythologia fere ubique sum usus, cum de astris agerem, quibus et vitam, et vero etiam Divinitatem ii dederant, quod ad amoenitatem carminis opportunum forecensui, nec vero ineptum ad profundiora etiam tanquam mysteria facilius ingerenda, et explicanda.

Adnotationes adjeci, in quibus soluta oratione exposui dilucidius aliquanto, quae versibus pertractantur, ut ab iis etiam, qui in Astronomia, et universa Mathesi sunt rudes, facilius intelligi possent ipsa

car-

carmina. Cogitabam et ſupplementa quaedam adjicere, in quibus Geometria, et Calculo in ſubſidium vocatis, omnia fuſius exponerentur, et accuratius definirentur; ſed ob tantam argumenti, quod amplexus ſum, amplitudinem, nimis in longum abibat res, nec mihi advenae, ac paucis menſibus in Anglia commorato, et plurimis, quae cognoſcenda erant, diſtracto, ſatis ocii ad id fuit, quod tamen nec omnino neceſſarium arbitratus ſum. Addam id fortaſſe aliquando, ſi vita ſupererit.

Plures occurrunt in ipſo poëmate epochae pertinentes ad ea tempora, quibus certae ejus partes conſcriptae ſunt, quae non penitus inter ſe conſentiunt. Et quidem fere caſu quodam id in opus ordinatum coaluit. Conſcripſeram, et in ſo-

ſolemni ſtudiorum inſtauratione in Collegio Romano recitaveram jam ab anno 1735. poëmation de Solis, ac Lunae Defectibus, quod tunc quidem trecentis circiter verſibus continebatur totum: ii fere omnes nunc etiam remanent hac, illac diſperſi primo, et ſecundo libro, et ipſum exordium cum prioribus binis invocationibus, et bina epiſodia, quae nunc habentur in eorum librorum fine, conſervavi integra, paucis adjectis. Diu autem deinde jacuit, cum Theologicis primum, tum Mathematicis diſtractus ſtudiis poëſim fere penitus ſepoſuiſſem. Verum poſt duodecim circiter annos ad Muſarum amorem ſum revocatus exemplo hinc P. Caroli Noceti, inde Benedicti Stay, quorum mentionem hic facio in adnotationibus, qui philoſophica argumenta verſibus

lati-

latinis elegantissimis persequebantur ; quibus ego adnotationes, et dissertationes adjeci plures, cum ederentur.

Hinc ad ipsum, quod olim pertractaveram, argumentum revocavi animum, et primò quidem eum adjeci librum, qui nunc est tertius, primo nondum in duos discisso, et novis additamentis aucto, atque id quidem anno 1749. Insequenti anno aggressus sum commissam mihi a Pontifice dimensionem gradus Meridiani, et correctionem mappae geographicae ditionis Pontificiae una cum P. Christophoro Maire nostrae Societatis homine doctissimo, quod opus binis me annis per itinera fere continua exercuit : in iis inter equitandum, vel expectandam opportunam observationi occasionem, ut tempus fallerem, et animum a taedio importuno avocarem, tam pri-

ores duos fere omnes, quam omnes omnino posteriores duos libros conscripsi; et in iis ipsis itineribus, quod in tertio libro occurrit de observationibus pertinentibus ad dimensionem gradus factis in aedibus Garampianis Arimini, ac de Garampii laudibus adjeci, occasione arrepta ab iis, quae ibidem pertractaveram. Pleraeque epochae ad eos binos pertinent annos; et quoniam plura, quae nunc praecedunt, posteriore tempore sunt conscripta, idcirco nec ipsae epochae semper eodem occurrunt ordine, quo ad temporum seriem referuntur. Sunt autem nonnulla etiam multo posterius adjecta, ut ea, quae post finem libri primi occurrunt in laudem binorum Cardinalium, qui ad Arcadum Romanorum coetum, cum ejus libri initium ibi recitarem, advenerant, et

ini-

initio ejuſdem libri invocatio ad Regiam Societatem Londinenſem, quam hìc in Anglia hoc anno elucubravi.

Editionem, quam plures amici, et Typographi poſtularent, tamdiu diſtuli, non quod ſperarem, me unquam ſatis aut ocii, aut animi habiturum ad ſingula perpolienda, et limanda; ſed quod aliis vel Operibus imprimendis impeditus, vel gravioribus curis diſtractus ſum; donec in Angliam delatus ante hoſce ſex menſes, et ſummam erga me doctiſſimorum hominum humanitatem expertus, eorum in primis, qui ad Regiam Societatem pertinent, ac ipſius Comitis Maclesfieldii digniſſimi Societatis ipſius Praeſidis, ut aliquam grati animi ſignificationem exhiberem, ad Operis editionem adjeci animum, quod ipſi Societati inſcriberem in perenne obſequii mei ar-

gumentum. Nec vero inopportuna res mihi est visa, cum in eo Opere plura Societatis ipsius membra collaudarentur, ac NeWtoniana theoria gravitatis generalis attingeretur pluribus in locis, tota vero ejusdem theoria luminis uberius evolveretur, qua occasione ejusdem, qui ob adeo multa, et adeo mira tam physica quam mathematica comperta, est utique ingens quoddam et Societatis ipsius Regiae, et Anglicae nationis, et vero etiam totius humani generis decus, ac ornamentum, habebatur poëtica Apotheosis. Rem exequor, et Regiae Societatis nomine insignitum Opus emitto: nullam vero nuncupatoriam epistolam addo, cum ipsa invocatio, quae occurrit lib. I. ver. 19, et ejus adnotatio vices ipsius gerant.

Extant apud amicos descripta exempla

empla in Italia, Germania, vel Gallia vel totius operis, vel libri cujuspiam, a quibus nonnulla hic identidem occurrent immutata, non quidem fusiora loca, sed plerumque voces, et hemistichia: haec jam sola pro meis haberi velim, cum inter edendum aliquanto diligentius omnia perpenderim, quod prius vel ocii defectu, vel taedio quodam impeditus, nunquam satis accuratè praestiteram. Remanent adhuc admodum multa vel corrigenda fortasse, vel limanda; sed ea ignosces sanè, si aequus sis, homini severiores mathematicas disciplinas publicè profitenti jam ab annis 20, qui licet postremis hisce annis plura poëmatia typis ediderit, poësim tamen identidem, ob animi oblectamentum quoddam tantummodo, excoluit, non ex officio exercuit.

ARGUMENTA.

ADJECTA IN HAC EDITIONE.

ARGUMENTUM LIBRI I.

Proponit argumentum totius Operis, tum post Phoebum, et Uraniam, invocat a versu 19 Societatem Regiam, et ejus Praesidem cum elogio plurium e Sociis. A Versu 59 proponit argumentum hujus libri, quod est synopsis quaedam Astronomiae. Primo quidem a versu 64 agit de fixis, de earum lumine, et loco in systemate Mundano, tum a versu 89 de Zodiaco, et ejus signis, ac a versu 149 innuit nonnullas alias constellationes. A versu 161 de Solis positione; tum a versu 173 innuit ejus motum annuum agit, ac persequitur positionem planetarum a versu 175: agit versu 188 de Cometarum situ, et motibus, a versu 196 de Lunae distantia, et magnitudine A versu 208 proponit signa, per quae singuli planetae dignoscantur, ut et diversa cometarum genera; tum a versu 282 transit ad eorundem planetarum motus nobis apparentes. Proponit motum communem diurnum a versu 287, cujus plura consectaria innuit a versu 315; tum a versu 335 alium exponit motum itidem communem, qui dicitur Praecessio Aequinoctiorum, et ejus effectus. A versu 359 innuit effectum parallaxeos; tum a versu 373 transit ad motus proprios. Nimirum a versu 381 agit de motu Solis annuo per Zodiacum, et anni ipsius diversis velut aetatibus, a versu 447 de motibus ellipticis Planetarum circa Solem, ubi innuendo Keplerianas leges excurrit in laudes Benedicti Stay, qui eas versibus latinis felicissime exposuit; et a versu 497 proponit eorum distantias a Sole, et tempora periodica: a versu 531 agit de cometarum motibus circa Solem per ellipses oblongas, ac a versu 549 de motibus planetarum, et cometarum, uti nobis apparent perturbatissimi, a versu 602 de nodis, a versu 640 de secundariis planetis, sive satellitibus. Sed a versu 644 singillatim exponit motum ellipticum obliquum Lunae circa terram, et mensem tam periodicum, quam synodicum, ac motum cum ipsa Terra annuum. A versu 764 proponit inaequalitates omnes motuum ipsius Lunae, ac a versu 788 causas earundem petitas a gravitate generali Newtoniana, cujus leges exhibet. A versu 877 gradum facit ad lumen, proprium in Sole, et fixis, solare in planetis, et cometis; unde a versu 899 explicat phasium lunarium theoriam, quam a versu 922 affirmat, Episodii loco, Prometheum a Minerva accepisse, dum ejus curru in Coelum evehebatur, et inter Mortales divulgasse, damnatum idcirco etiam, quod Deorum secreta vulgaverit. Accedit post libri finem Episodium in laudem binorum Cardinalium recitatum in Arcadum Romanorum conventu.

LIBRI II.

In exordio brevem exhibet synopsim eorum, quae in primo libro sunt pertractata; tum a versu 36 proponit argumentum hujus libri, in quo agitur de eclipsibus. Primo quidem a versu 43 proponit illud, Solem in eclipsi conservare totum suum lumen, quod probat, a versu 50

ex

ex eo, quod dum is deficit in aliis Terrae locis, in aliis apparet totus lucidus de more, a versu 90 ex eo, quod in eclipsi totali Solis planetae plerumque, et aliquando etiam cometae apparent lucidi, qui tamen a Sole lumen accipiunt. Concludit a versu 113 esse aliquid, quod se interponat, et ejus aspectum impediat. Quaerit a versu 126, quid istud sit, et ostendit a versu 132, non posse esse fixas, a versu 136 nec planetas superiores, nec inferiores, ubi, occasione arrepta, fuse agita versu 173 de transitu Veneris sub disco Solis, ac de ejus observationis raritate summa, et utilitate, cum ameniore episodio a versu 260 de observando transitu hujusce anni. Ostendit a versu 316 ne Cometis quidem tribui posse hosce defectus Solis; unde concludit a versu 343, Lunam solam relinqui, quae se interponat, ubi nimirum in conjunctione cum Sole sit nodo proxima. Id ita se habere, probat, ex pluribus, quae conjuncta rem conficiunt: 1. a versu 379, quod eo tempore Luna nusquam alibi in Coelo appareat 2. a versu 396, quod id accidat solum in novilunio, quo tempore Sol, et Luna conjunguntur; 3. a versu 412, quod Luna tum sit proxima alteri nodo, cujus rei observandae binas proponit methodos. Affirmat autem a versu 484, facile agnosci Lunam in eclipsi solari, si aspiciatur umbra Solem tegens, ubi docet, quo pacto Solem impune intueri liceat; ac 1. quidem, docet a versu 518, et formam, et molem illius umbrae congruere cum forma, et mole Lunae, ubi de eclipsibus agit partialibus, totalibus annularibus; 2. a loco, et motu umbrae, ac parallaxi, quae congruunt cum lunaribus, ex quibus omnibus concludit a versu 624, eclipsim Solis oriri ab interpositione Lunae, ubi innuit etiam eclipses fixarum per Lunam, vel per planetas, vel aliorum ex his per alios. A versu 649 transit ad eclipses Lunae, quam, docet, amittere lumen, quod accipiebat a Sole, ingressam in umbram Terrae ubi appellens ad oppositionem cum Sole in plenilunio sit prope nodos. A versu 676 id probat a forma umbrae Lunam occupantis, ab ejusdem magnitudine, positione, et motu congruentibus cum iis, quae debentur sectioni coni umbrosi, quae quidem omnia singillatim persequitur. Agens de magnitudine digreditur a versu 723 ad contractionem telescopii dioptrici, et micrometri filaris, et exponit hujus usus alios, tum a versu 893 usum hunc ad deprehendendam magnitudinem ejus umbrae ita congruentem cum sectione coni umbrosi ac a versu 934 agit de ejusdem positione itidem congruente, et a versu 960 concludit, hanc esse omnino lunarium eclipsium causam. Ad plures confirmationes totius theoriae utriusque defectus transit a versu 963, petitas a temporibus, quibus eclipses Solis, et Lunae possunt accidere, vel recurrunt, ubi limites determinat distantiae Lunae a nodis, pro utriuslibet defectu, et eorum limitum consectaria evolvit a versu 1071; ac a versu 1201 exponit periodum lunationum 223, post quam apogeum, et nodi redeunt fere ad easdem Coeli plagas. Demum a versu 1243. fuse explicat usum eclipsium pro determinanda longitudine geographica locorum, et inde a versu 1363 digreditur ad felicitatem nostrorum temporum, quibus jam innotescunt ea omnia, et exhibet crassas tam Veterum Philosophorum plurium, quam vulgi errores in eadem re...

LI-

ARGUMENTA.
LIBRI III.

In exordio de more repetit summa capita praecedentis libri; tum proponit argumentum novi, quo agit de variis praenomenis luminis pertinentibus ad eclipsim Solis, quorum causas innuit in invocatione. Primo quidem a versu 23 proponit singillatim phoenomena eclipseos totalis: tenebras crepusculo similes: majorum syderum aspectum: quendam annulum, qui solet extare circa Solem obductum, et quendam lucidum velut rhombum, qui quandoque excurrit utrinque sub zodiaco, quae omnia effugiunt, ubi Sol incipit detegi, et dimidio Sole detecto dies est jam plena. A versu 61 incipit ab annulo: proponit ejus causam petitam a diffractione, sive inflexione radiorum luminis circa Lunam, quam luminis proprietatem explicat, et experimentis confirmat: proponit a versu 119 experimentum artificialis eclipseos cum annulo ex difractione; sed a versu 147 demonstrat, id non posse transferri ad veras eclipses. A versu 195 impugnat sententiam eorum, qui annulum repetunt ab atmosphaera Lunae, et a versu 228 fuse ostendit, Lunam non habere atmosphaeram similem nostrae, licet a versu 319 ipsi tribuat fluidum quoddam magis simile nostrae aquae, quod tamen non possit parere illum annulum. Hinc a versu 377 affirmat, et annulum, et rhombum provenire ab atmosphaera Solis, quam existere probat a versu 391, et ejus naturam exponit, ac a versu 420 deducit inde annulum. A versu 424 incipit agere de rhombo, ubi occurrit elogium P. Noceti, qui idem argumentum pertractavit. Igitur a versu 443 agit de ipsius atmosphaerae figura, conformatae ob vim centrifugam ortam ex rotatione circa axem Solis formam lentis vastae, quae oblique visa e Terra debeat apparere sub zodiaco sub forma rhombi hinc, et inde a Sole: a versu 520 exponit, cur interdiu videri non possit hic rhombus, nimirum obrutus a nimio Solis lumine, et a versu 540, quibus anni temporibus videri possit mane, vel vespere, ut eodem pacto videatur etiam in eclipsi Solis. A versu 553 explicat, cur in eclipsi appareant stellae, quas, docet, interdiu non videri, solum quia a nimio Solis fulgore obruuntur: caeterum, docet, eas videri per tubum opticum, qui noctem in suo gremio imitatur, ubi a versu 585 digreditur ad suas fixarum observationes factas interdiu pro dimensione gradus Meridiani in Pontificia ditione, quarum partem cum inierit in aedibus Comitis Francisci Garampii Ariminensis Patricii, in ejus laudes excurrit a versu 626. A versu 672 proponit illud, videri majores stellas, interdiu etiam ex profundis puteis, ubi de Observatorio Parisiensi tum elogio Gallorum. A versu 719 exponit, cur in eclipsi totali non habeatur nox densa, nimirum ob lumen reflexum ab atmosphaera Terrae posita ad latus, et ab extante Solis atmosphaera. A versu 786 exponit, cur, dimidio Sole obtecto, lux diei videatur fere illaesa. Duas reddit rationes, primam, docens a versu 801, quo pacto anima latens in cerebro acquirat notitiam rerum externarum per sensus; tum a versu 865, quo pacto tremor in oculi fibris excitetur fere idem, sive extet Sol integer, sive dimidius. Secundam rationem profert a versu 914 petitam a dilatatione majore pupillae in minore lumine, ubi oculum describit. In-

de

de digreditur ad Christi Ascensionem in Coelum, inventa occasione admodum opportuna episodii respondentis festo diei, quo hanc partem in Arcadum conventu recitaverat.

LIBRI IV.

In exordio innuit itidem argumentum libri III, et proponit argumentum hujusce libri, nimirum plura phaenomena luminis in eclipsi Lunae. A versu 13 agit de penumbra, quae umbram praecedit, cujus originem, et naturam exponit; tum a versu 144 proponit figuras geometricas, quae exhiberent conum umbrae, et penumbrae, viam Lunae, et tempora initii, ac finis utriuslibet in eclipsi lunari, ubi occasione arrepta a voluptate, qua geometricae contemplatione defigunt animum, digreditur ad Archimedem in ejusmodi contemplatione confossum a milite, ac a versu 263 determinat ipsa tempora morae tam in penumbra, quam in umbra. A versu 327 incipit agere de lumine tenui, quod remanet in Luna immersa in ipsam umbram, quod, docet, esse lumen intortum a refractione facta in atmosphaera terrestri, et a versu 407 demonstrat, id descendere ad axem umbrae infra locum Lunae, adeoque incurrere in Lunam ipsam. A versu 429 exponit, cur id lumen sit ita tenue, quod nimirum magna pars intercipiatur a vaporibus, et a versu 513 addit rationem alteram petitam a distractione radiorum, quam parit inaequalitas refractionis, quam distractionem determinat. A versu 751 agit de lege, qua id lumen distribuitur per umbram, ubi considerat intra conum umbrae duos alios conos, per quos definitur spatium, quod nullum accipit radium, quod accipit ex altera parte, quod e binis oppositis, vel ex integro circulo atmosphaerae terrestris, ac a versu 637 determinat tempora debita morae in hisce postremis binis spatiis, et a versu 697 ordinem, quo lux debeat in Luna progrediente minui, vel augeri. A versu 734 profert impedimentum, quod ei theoriae afferunt nubes, quae si tegant totum tractum atmosphaerae terrestris, per quem radii deberent transire, Luna debet ita omne lumen amittere, ut videri desinat, quod tamen cur admodum raro debeat evenire, exponit a versu 771. Inde autem arripit occasionem excurrendi ampliore, et amoeniore episodio, in quo persequitur aeris inclementiam, et admodum insitatam constitutionem Naturae, quae, ipsum insectari est visa, inquirentem ejus secreta in sui dimensione gradus Meridiani, ubi occurrit occasio plurium elogiorum, P. Maire sui socii, Benedicti XIV. P. M, Cardinalis Sylvii Valentii, Ragusii suae patriae, et in adnotationibus Ragusinorum plurium, etiam quorundam e suis.

LIBRI V.

Statim proponit argumentum hujus libri, in quo explicat illud, cur Luna in eclipsibus suis soleat apparere rubra; et quoniam rationem ejus phaenomeni desumit a theoria luminis Newtoniana, Newtonum invocat, tanquam suum Numen, ac a versu 14 enumerat omnia ejus comperta pertinentia ad gravitatem generalem, et Mundi systema, et a versu 42 omnia pertinentia ad lucem, et colores. Porro binas phaenomeni rationes profert, alteram petitam a refrangilitate diversa radiorum, alteram ab iis, quas Newtonus appellat vices facilioris reflexionis, et facilioris transmissus. Exorsus a priore proponit a versu 94 compositionem radii integri ex filis innumeris, quorum quodlibet ex ipsa natura sua excitet ideam sui coloris, et habeat suum determinatum gradum refran-

fran-

frangibilitatis, quae fila docet a versu 113, separari in refractione, conservatos semper deinde eodem colore, et eodem refrangibilitatis gradu post primam separationem sine ulla mutatione, quae inducatur per novas refractiones, vel reflexiones. A versu 141 proponit lepore poetico ordinem colorum, et nomina, et a versu 182 colores compositos, qui oriuntur e mixtione plurium simplicium. Ut eam theoriam experimentis confirmet, proponit a versu 198 veram philosophandi methodum per observationes, et experimenta sine hypothesibus arbitrariis; tum a versu 220 describit instrumenta necessaria ad confirmandam theoriam experimentis, nimirum prisma, et lentem: a versu 235 exponit notissimum experimentum prismatis adhibiti in conclavi obscuro ad spectrum imaginis solaris habendum per separationem filorum, ut a versu 270 usum lentis ad colligenda fila homogenea, et magis separanda heterogenea. A versu 294 docet, quo pacto post ejusmodi separationem possint nova experimenta institui in singulis filis simplicibus transmissis per exiguum foramen, vel in pluribus per plura, detorquendo singula iterum ad videndam constantem naturam, et unienda plura ad videndum colorem compositum, quem gignunt. His expositis, applicat a versu 325 eam theoriam ad radios in atmosphaera nostra refractos, ubi cum violacei magis refringantur, quam rubei, hi minus distracti deveniunt ad Lunam densiores, et in ea praevalent. A versu 355 transit ad secundam phenomeni rationem, quam dicit esse multo potiorem; ac a versu 373 proponit binas dispositiones, quas alternatim acquirit quaevis particula luminis, cum quarum altera si deveniat ad superficiem dirimentem bina media heterogenea, facilius reflectitur, et cum altera facilius transmittitur: a versu 399 addit discrimen intervalli, quo dispositiones ipsae redeunt pro variis circumstantiis; et potissimum in variis coloratis filis. A versu 427 exponit experimentum, quo Newtonus eam proprietatem luminis invenit, transmittendo vel fila singula, vel radium integrum per laminam tenuem aeris, vel alterius fluidi inclusam inter bina vitra alterum planum, alterum tornatum ad ingentem sphaeram, vel utrumque sphaericum. A versu 555 exponit annulos coloratos, quos exhibet illa tenuis lamina alios in lumine transmisso, alios in reflexo, et a versu 595 ejus discriminis rationem reddit petitam ab illo discrimine intervalli vicium in diversis filis coloratis. Hinc a versu 620 exponit, cur laminae crassae corporis pellucidi colores non separent, et a versu 650 cur separent tenues lamellae, ac a versu 644 docet, data crassitudine lamellae, specie materiae, ex qua constat, et angulo radii in ingressu, determinari posse per calculum, qui debeant colores apparere in radio transmisso, qui in reflexo, quod Newtonus praestiterit, observationibus respondentibus theoriae, qui etiam inde invenerit discrimen inter corpora opaca, et pellucida, quod fuse exponitur a versu 661, et discrimen inter colores variabiles duorum generum, et constantes, quod exponitur a versu 732, ut et a versu 783 mutatio coloris constantis ex mutatione crassitudinis particularum, ex quibus corpus componitur. Exposita hac luminis theoria considerat a versu 795 constitutionem atmosphaerae terrestris, cujus vapores si sint admodum crassi, nubes gignant ex theoria ipsa, si tenuiores, nebulam, si tenuissimi, Coelum sudum, quo tamen casu adhuc multi supersint, qui aliquid lucis reflectant, in qua debeat haberi color caerulens, flavescente lumine directo, quod progreditur. A versu 839, considerat singulos vaporum globulos

bulos, et ostendit, globulos haberi certae tenuitatis, qui reflectant radios magis refrangibiles, ut violaceos, quin possint reflectere minus refrangibiles, ut rubeos; contra vero eum, qui hos possit reflectere, semper simul et illos posse. Hinc a versu 849 demonstrat in radio, qui satis longo tractu per medium pellucidum progrediatur, debere plurimum praevalere colorem rubeum, et in reflexo violaceum, ac a versu 861 refert, et explicat observationem Halleyi, cujus elogium texit, qui in machina urinatoria radium Solis directum vidit admodum rubeum, colore aquae apparente viridi. Ex iis principiis deducit a versu 884 caussam ruboris in aurora, et vespertino crepusculo petitam a longo radii obliqui itinere per atmosphaeram Terrae, et a versu 903 demum exponit rationem secundam ruboris Lunae, ad quam nimirum in eclipsi deveniunt radii post iter longissimum per atmosphaeram ipsam. Iis binis rationibus physicis addit tertiam episodii loco petitam a Veterum Mythologia; quam orditur a versu 914: Dianam in plenilunio nitidissimam agere pompas solemnes cum Nymphis comitibus, quae ejus laudes canant, quas a versu 928 singillatim refert: ipsam sua forma, et iis laudibus superbam insultare omnibus, potissimum Vestae (nimirum Terrae) tum sordidae, et nigrantis. Vestam ulcisci, et conum umbrosum projicere in pompae locum: fugere Nymphas: furere equos: ruere currum; Dianam vero frustra invocato fratre Phoebo, et remoto, nec, vidente ob Vestam interpositam, in desperationem agi, ac se unguibus lacerare; unde cruenta tota appareat.

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Serafino M. Maccarinelli* Inquisitor General del Santo Officio di *Venezia* nel Libro intitolato *De Solis ac Lunae Defectibus libri V. P. Rogerii Josephi Boscovich Societatis Jesu ad Regiam Societatem Londinensem, ibidem autem, et Astronomiae Synopsis, et Theoria luminis Newtoniana &c.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Secretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza ad *Antonio Zatta* Stampator di *Venezia*, che possa esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Publiche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 4. Maggio 1761.

(Angelo Contarini Procurator Riformator.
(Bernardo Nani Riformator.
(Francesco Morosini 2. Kav. Proc. Rifor.

Registrato in Libro a Carte 87. al Num. 248.

Giacomo Zuccato Segr.

Addì 9. Maggio 1761.

Registrato nel Magistrato Eccell. degli Esecutori contro la Bestemia.

Gio: Pietro Dolfin Seg.

In verſibus.

Errata	*Corrige*	*Errata*	*Corrige*
Pag. lin.		Pag. lin.	
7. 2. ſrontem	frontem	227. 5. golbum	globum
15. 10. vitae	vittae	228. 5. ſinnatus	ſinuatus
38. 18. Phoebae	Phoebeae	252. 15. Opponat	Opponant
48. 1. ima	imas	260. 1. patenti	petenti
52. 21. Phoeboeque	Phoebeoque	3. tunc	nunc
55. 3. Illa	Ille	264. 16. ergo	ego
81. 2. unt	Sunt	284. 5. Caelo	Coelo
82. 11. Aſſe uitur	Aſſequitur	285. 8 Coeruleus	Caeruleus
98. 12 appoſitas	oppoſitas	299. 6. Principio	Principio
208. 9. imam	imum	305. 19. diſcendent	diſcedent
121. 13. Phobeo	Phoebeo	323. 5. ſimul	ſemel
159. 2. quecumque	quaecumque		

In Adnotationibus.

17. 30. ut raque	utraque	145. 34. Dollonciano	Dollondiano
32. 23. annullus	annulus	152. 25. pendent	pendente
36. 25. ſpectari	ſpectati	238. 23. Id	id
58. 28. ſiſtula	fiſtula	244. 28. eſſe	eſſet
76. 27. apparentes	apparente	246. 17. 22	22
81. 24. nobis	nodis	250. 30. intervellum	intervallum
87. 29. plenilunium	novilunium	256. 34. fuerant	fuerant
91. 27. perigae	perigeae	35. angulm	angulum
29. apogae	apogeae	262. 27. Bartolomei	Bartholomaei
98. 34. teminetur	terminetur	270. 32. perihelia	aphelia
35. mutae	mutuae	301. 16. prurſus	prorſus
100. 31. curvature	curvaturae	305. 25. contingant	contingas
104. 34. collegit	colligit	312. 33. tentummodo	tantummodo
106. 27. fuudum	fundum	315. 29. lamine	laminae
108. 26. ſphaericicita-	ſphaericitatis	337. 33. dodoloribus	doloribus
140. 30. ora	(tis hora	341. 5. habeat	habent

Errores interpunctionum.

1. 14. aethereo	, Aethereo	75. 8. forte	forte,
3. 14. , μετρῳ	μετρῳ ,	82. 28. lib. I	lib. I :
4. 3. mos	mos ,	96. 25. moles	moles ,
25. animus	animus ,	299. 9. luminis	luminis :
39. 4. gyros	gyros .	337. 9. nudam	nudam ,
50. 11. Ire	Ire ,	342. 2. que .,	que
69. 15. fulgida	, fulgida		

DE

DE SOLIS AC LVNAE DEFECTIBVS.

LIBER I.

CUR quondam [1] aethereas Titan sine nube per auras
Dum micat, et puro respergit lumine terras,
Praetexat subita nitidos ferrugine vultus,
Impatiensque moræ fuscis nox prodeat alis
Atra die medio, stellasque inducat Olympo; 5
Cur, sudo dum laeta nitet Latonia Coelo,
Nunc tenebris condat caput, et nunc sanguine multo
Inficiat frontem, Latiis memorare Camoenis
Aggrediar, penitusque imas educere causas. 10
Tu mihi, [2] qui Arcadico, aethereo qui summus Olympo,
Phoebe, nites, naturae aditus tu pande repostos,
Divinumque immitte jubar; tu suffice venam
Te dignam: tua res agitur, seu lumina terris

[1] Innuuntur hic praecipua capita pertractanda in toto opere: porro in eclipsi totali Solis solent et stellae apparere: Luna autem dum deficit, aliquando ita est nigra, ut etiam ex oculis penitus evanescat, aliquando est admodum rubra.

[2] In eclipsi Solis radios solares amittit Terra intercepros a Luna, in eclipsi Lunae ipsa Luna solares radios amittit a Terra interceptos; quare utrumque argumentum ad Phoebum pertinet, qui quidem jure a Poëta Astronomo idcirco etiam invocatur, quod idem et in Arcadico Olympo emineat Musarum, ac Poëtarum Princeps, et in Olympo aethereo, nimirum in Coelo, sit Sol ipse Princeps Astrorum omnium.

Ipſe neges, ſolita ſeu fraudes luce ſororem.
Tuque adeo Aonias inter [3] mihi maxima Divas, 15
Uranie, terras quae dedignata jacentes
Alta petis curſu, & caput inter ſydera condis,
Huc ades, atque tuum facilis ne deſere vatem.
Ante tamen Pindique patrem, doctaſque ſorores
Te primum mea vota vocant, te in carmina poſcunt, 20
Nobile Parkeridum [4] germen, meritiſſime docti
Angligenûm cœtus praeſes; te namque ſuperba,
Te duce lecta cohors Naturae arcana latentis
Regalem ad Thameſis ripam ſcrutatur, & omnes

3 Maxima mihi, nimirum Poëtae itidem Aſtronomo.

4 Haec tertia invocatio locum tenet nuncupatoriae epiſtolae, et idcirco evaſit aliquanto fuſior, ut nimirum exponantur rationes, ob quas Regali Societati, et ejus Praeſidi, Comiti de Macclesfield, e nobiliſſima Parkeriorum familia, hoc opus jure nuncupari poſſit; agitur nimirum in eo de argumentis, in quibus plura Societatis membra excellunt maximè, et plura ex iiſdem membris, ſumma cum laude nominantur.

In primo libro habetur quoddam univerſae Aſtronomiae compendium; in ea tum alia plura Societatis membra, tum in primis Bradleyus aeternum ſibi nomen compararunt. Bradleyo autem ipſi ob nutationem axis, et aberrationem luminis feliciſſime detectas illud debet Aſtronomia, quod nunc demum perfici poteſt, et in dies magis perficitur.

In libro II. habetur fuſior deſcriptio teleſcopii, et micrometri: per totam Europam eſt pervulgata Shorti fama ob egregia ejus teleſcopia tam dioptrica, quae objectivum vitrum habent, quam catadioptrica, quae habent ſpeculum metallicum. Is autem non conſtruit tantummodo teleſcopia, ſed et iis optimè utitur, ſatis egregius et Aſtronomus, et Geometra, ac inſigne Regalis Societatis membrum. Micrometra illa vetera, quae ocularia dicuntur, filis conſtant, quorum aliqua, vel ſaltem unicum, ope cochleae promoventur, et per notas adſcriptas diviſionibus habentur omnes minimorum motuum partes, unde fit, ut exiguas coeleſtes quantitates eorum ope

Telluris

Telluris vastae comperta effundit in oras. 25
Quae canimus, vestris pars maxima debita curis.
Pandimus astrorum et positus, motusque: quis ignes
Servare æthereos, cursumque notare fugacem
Aptior, & longùm ignotas deprendere leges
Ingenti Bradleyade, cui diva tuenti 30
Assidet Uranie, totumque recludit Olympum?
Persequimur teretesque tubos, inclusaque vitra,
Filaque, quae tenues Coeli dant prendere partes,
Mensurasque aeri incisas: quis in arte tuborum
Par Shorto, seu vitra velis, seu dura metalla 35

metiri liceat, ac inde et nomen adepta sunt a Graeco, *μικρον*, *parvum*, et, *μετρω* *metior*. Porro in hoc, et in quovis alio Astronomicorum instrumentorum genere, quod cochlearum aequabilem motum, et divisiones in metallo incisas requirit, Angli Artifices ante omnes alios, quotcunque ubilibet per Europam habentur, longe excellunt.

In lib. II. itidem agitur de transitu Veneris sub Sole, quem anno sequenti 1761. habituri sumus, quem quidem Halleyus praedixit primus, et commoda, quae inde in Astronomiam provenire possunt, vulgavit; habetur autem et alia observatio cum ingenti elogio ipsius Halleyi libro v.

In eodem lib. II. fit mentio de horologiis oscillatoriis Grahami, qui primus id instrumentorum genus mirum in modum perfecit, et Artifex egregius simul, et Observator.

In lib. I. occasione arrepta ab inaequalibus Lunae motibus exponitur gravitas generalis mutua Newtoni, a qua plurimae perturbationes oriuntur in Lunae motibus, quae itidem innuuntur.

Liber quintus totus versatur circa lucem, et colores, totam Newtoni theoriam evolvens, opportunissimam ad explicandum, cur Luna in eclipsibus sit saepe rubra. Porro ibidem habetur quaedam ipsius veluti Apotheosis, cum invocatione, et hymno, in quo omnia ejus philosophica comperta continentur. Habetur autem circa ejus finem illud, ad quod hic alluditur:

Dona tibi, tibi thura parat studiosa juventus,
Altaque marmoreis meditatur templa columnis.

Inserere, atque imis adducere ſydera terris?
Anne notas alibi melius ſuper aere rigenti
Sculpere mos, cochleiſque pares inducere ſpiras?
Quid memorem fato raptos? mea carmina veſtri
Et laudes celebrant Halleji, et docta reperta, 40
Et memorant culti mira inſtrumenta Grahami,
Aurata aequales dum cuſpide dividit horas.
Angligenûm ſed primus honos, et gloria tanti
Prima chori longe ante alios Newtonus ibidem
Emicat, atque operis mihi magna in parte refulget. 45
Seu referam implexis Phoeben erroribus actam;
Ille mihi aſtrorum nexus, vireſque miniſtrat,
Syderei queis ſeſe ignes per mutua turbant;
Sive Deam media ſordentem ſanguine in umbra;
Ille almae textum lucis, mixtoſque colores 50
Suggerit, et longi dat carminis argumentum.
Idem ergo et ſummo inſeritur mihi celſus Olympo
Jam Numen, coliturque hymno, dum digna recenti
Surgunt templa Deo, dum maſcula thura parantur.
Ergo opus excipite, atque aures adhibete canenti, 55
Tuque, et tota cohors, facilemque adjungite mentem,
Ac trepidum aſſenſu vatem firmate ſecundo.
Defectus Solis varios, Lunaeque labores
Si penitus noſſe, et caecas evolvere cauſas 60
Eſt animus ſuperas ſcrutari ante omnia ſedes
Cura ſit, et poſitus aſtrorum, et diſcere motus.
Principio 5 Coelum dum ſuſpicis, atque ſerenam,

5 Ponuntur hic objecta coeleſtia eo ordine, quo videri poſſint, tranſeundo a ſtellis fixis, et errantibus, quae apparent per noctem, ad Lunam, quae in fine Lunationis apparet in Aurora, ac deinde ad Solem; et idcirco poſitum eſt

Sydera

Sydera per noctem, et Divae tenuata triformis
Cornua, surgentemque eoo e littore Phoebum;
Ne defixa polo, superisque haerentia tectis 65
Rere procul paribus disjungier intervallis,
Ceu, picta auratum qua sustinet aula lacunar,
Haerent infixi trabibus longo ordine clavi.
Haec magis, illa minus vacuum per inane, vel aura
In tenui immensas dispersa per aetheris oras 70
Tolluntur Coelo, atque humili à Tellure recedunt.
Quae [6] saliunt semper, tremulaque in luce coruscant,
Tenvibus et radiis, ut acutae cuspidis ictu,
Percellunt oculos rutilantia, semper eosdem
Inter se positus, atque intervalla tuenti 75
Objiciunt certa, et nullum mutata per aevum.
Hinc ea fixa vocant. Summi ad confinia Mundi
Illa quidem spatiis elata immanibus, omnes
Mensorum eludunt curas, et se ardua condunt.
Nec tenues mittunt radios: fors igne nitentem 80
Aut aequant Phoebum, aut etiam nitidissima vincunt.
At circum immensas late distracta per auras
Lumina dispereunt, longoque labore viarum
Nocturnas aegre vincunt jam fessa tenebras.
Si liceat spatium superare immane volatu 85
Daedaleo, Coelique altos conscendere fines,
Ipsum etiam videas pariter decrescere Phoebum

illud *Divae tenuata triformis Cornua*; nam cornua in fine Lunationis evadunt quotidie tenuiora, et tunc sub Auroram Luna oritur.

Porro stellae dispersae sunt ad distantias admodum diversas vel in spatio vacuo, vel in aura aetherea ita tenui, ut nullam motibus resistentiam pariat.

6 Stellae aliae dicuntur iner-

Paullatim, et caeca demum se condere nocte.
Quis tamen et formas omnes, et nomina pandat
Singula connumerans, certasque ex ordine sedes? 90
In medio stellis ardet fulgentibus ingens

rantes, sive fixae, aliae errantes, sive Planetae. Stellae fixae vividissimum habent Lumen, sed scintillant ob exiguitatem diametri apparentis, ob quam a tenuissimis quibusque vaporibus teguntur, et reteguntur per vices: dicuntur fixae, quia servant eandem ad sensum positionem ad se invicem. Olim est creditum, eas servare omnino ejusmodi positionem; verum detecti sunt per telescopia quidam satis exigui quarundam fixarum motus, qui nobis videntur exigui ob immanem distantiam, sed fortasse sunt satis magni. Adhuc tamen, cum sub sensum sine telescopiis non cadant, hic habentur pro nullis.

Huc usque creditum est, nullam haberi methodum ad computandam earum distantiam, cum crederetur, nullam haberi ipsarum eam, quam Astronomi parallaxim dicunt, ne ab orbe annuo quidem oriundam: at per hos ipsos dies, quibus haec Londini scribimus, Dominus Maskelyne, et Astronomus, et Geometra egregius, Societatis Regalis membrum, in postremo congressu Societatis die 26. Jun. 1760, Societati proposuit parallaxim Sirii, quam deduxit ex 18 observationibus Caillii habitis ad Caput Bonae Spei, quae ejusmodi est, ut diameter orbis annui subtendat in Sirio ipso angulum secundorum 15. Inde calculo inito invenitur distantia Sirii a nobis semidiametrorum orbis annui, sive distantiarum Terrae a Sole 27502. Sed ut res multo adhuc certius constet, proposuit illud, ut in Insula S. Helenae, occasione observandi transitum Veneris sub Sole, id etiam observetur, cum ibi ea fixa proximè ad zenith accedat, ubi exactissimè definiuntur fixarum loca. Sirius tanto reliquis omnibus fixis lucidior, semper etiam propior est creditus. Habentur sanè plurimae observationes aliarum fixarum, quae accedunt ad nostrum zenith, in quibus nulla deprehenditur sensibilis parallaxis.

Fixae proprio lumine fulgent, ut Sol: hinc censentur totidem Soles, et quae tantummodo ob immanem distantiam tanto minus lucidae appareant, quam Sol: et sane, si possemus satis recedere ab ipso Sole, ipse etiam paullatim minueretur nobis, ac de-

Fascia

Fascia 7, et immenso Coelum complectitur orbe
Excurrens longe, qualis quae regia frontem
Praecingit vitta, et comptos de more capillos
Comprimit adstringens, vel qui demittitur alte 95

mum etiam evanesceret. Si constaret vera ratio luminis alicujus fixae ad lumen Solis, facile definiretur, ad quam distantiam oporteret recedere, ut Sol evaderet ejusdem luminis, ac illa fixa; nam lumen est in ea, quam Geometrae dicunt rationem reciprocam duplicatam distantiarum. Tentavit id quidem Hugenius, et post illum plures alii, ac nuperrimè Bouguerius conatus est eam luminum proportionem invenire; sed mihi omnes eae methodi suspectae sunt ob plures rationes, quas hic persequi non vacat. Progressi autem sunt iidem ad definiendam ipsarum fixarum distantiam ex eadem ratione luminum, ponendo fixas esse Soli aequales. Sed et illud est omnino incertum, cujus verae magnitudinis sint; nam Astronomi appellant stellas magnitudinis primae, secundae, tertiae, ex magnitudine, quae nudo oculo intuenti apparet, et quae pendet a sola vi luminis oculum ipsum percellentis: est admodum probabile, alias esse minores, alias majores Sole, et sine ulla certa relatione magnitudinis cum distantiis dispersas esse per illa immensa intervalla, uti Planetae nullam habent certam magnitudinum, et distantiarum relationem.

Dictum est, eas esse *summi ad confinia Mundi*; nimirum Mundi nobis conspicui; incertum enim omnino est, quo se protendat Mundus, fortasse ultra omnes fixas nobis conspicuas in immensum, si Mundi nomine appelletur aggregatum omnium rerum creatarum. Ineptus sane sit, qui cum suorum oculorum vi, vel etiam cum vi suae imaginationis terminet infinitae potentiae Divini Opificis foecunditatem. Posset aggregatum totum rerum sub nostros sensus cadentium esse quaedam exigua particula, granulum quoddam arenulae respectu operis in immensum majoris a D. O. M. procreati; et adhuc nobis ita exiguis id ipsum immensum appareret.

7 Zodiacus, qui in sphaera armillari cernitur, ut fascia quaedam. Is dividitur in duodecim partes, quae dicuntur signa, et continentur iis binis versibus:

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Ex humeris, laterique affixum sustinet ensem
Balteus, eoo advectis e littore gemmis,
Concharumque nitet spoliis, auroque refulget.
Bissenis illam signis fulgentibus unam
Concessisse Deos, dicunt. Stant ordine longo 100
Dispofita in gyrum, et spatiis aequalibus ardent.
Prima tenet, rutilisque Aries se cornibus alté
Erigit, et puri tenues petit aetheris auras,
Ostentatque nitens aurato vellere dorsum.
Ille olim aequoreas genitos Athamante per undas 105
Phryxum, atque exceptam fatis obstantibus Hellen
Extulit: hirsuto frater sedet altus in auro,
Et ventos, tumidi despectat et aequoris iram,
Cornigerae fronti fidens, dorsoque patenti.
At soror insano heu! nimium conterrita fluctu, 110
Ventorumque minis trepidat, dejectaque dorso
Labitur infelix. Nequidquam voce cadentem
Compellat lacrymans, et brachia tendit, opemque
Implorat Superum frater: perit obruta fluctu,
Ah perit! immiti, et moriens dat nomina ponto. 115
Incolumis ripa post tanta pericula Phryxus
Vota Jovi solvit, ditemque ardentibus aris
Vectorem sistit mactans, ac vellus ab alto
Fornice, et auratae suspendit cornua frontis.
At Pater Omnipotens sacro protexit ab igne 120
Illaesum, inseruitque polo, et fulgentibus astris

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
Tria postremum praecedentia dici solent Sagittarius, Capricornus, Aquarius. Nota sunt Poëtis, quae hic ex Mythologia Veterum ornandi carminis gratia assumuntur.

Distinxit

Diſtinxit frontem, atque hirſuti velleris aurum.
Pone ſubit, rapta, et fato meliore per undas
Avecta aequoreas quondam qui virgine Taurus
Promeruit ſuperas ſedes. Cum Caſtore Pollux 125
Conſequitur; partem geminis nam fratribus unam
Alternis tantúm genitor permiſit habendam.
Deinde loci Cancer fervens exaeſtuat: illum
Excipit, et [8] corde, et cauda jaculatur ab ima
Immitem rabidus flammam Leo, quem labor olim 130
Herculeus ſylva Nemeae proſtravit in alta.
Tum virgo Erigone radianti dives ariſta,
Tum geminae ſubeunt Lances, quibus aequus ab alto
Naturam librat Divum pater, atque hominum rex,
Productiſque dies exaequat noctibus, atque 135
Committit luci tenebras, et temperat aeſtum.
Proximus his vaſto ſe corpore Scorpius infert
Corde nitens medio, et chelas extendit apertas
Horrentem bifida contorquens cuſpide caudam.
Dein genus ambiguum dorſo Centaurus equino 140
Inſerit humanos artus, volucremque ſagittam
Theſſalico multum adnitens emittit ab arcu.
Deinde procelloſus Caper imminet, atque nivali
Concretus glacie frontemque, humeroſque rigentes
Torpet hebes; verſa quem triſtis Aquarius urna 145
Excipit, aſſiduis atque imbribus obruit agros.

8 Leo habet binas ſtellas primae magnitudinis, in corde, et in cauda: Virgo unam in Spica, quam manu tenet: Scorpius unam in corde: ad eas hic alluditur. Quando Sol ingreditur Libram, eſt Aequinoctium, ſive dies noctibus aequales fiunt, atque eo reſpiciunt, quae de hoc ſigno hic habentur.

Poſtremos

Poſtremos cohibent Phryxei velleris auream
Urgentes caudam radiantia vincula Piſces.
Caetera, quae tenues procul hinc elata per auras
Inſeruere aſtris Superi, Coeloque locarunt; 150
Perſeus, anguiferaeque caput furiale Meduſae,
Lernaei domitor monſtri, Jovis alite raptus
Et puer, et ſaxo Andromede religata rigenti,
Et pater, et ſciſſis genitrix miſeranda capillis;
Atque alii, atque alii: tum nomina mille ferarum, 155
Fluviorum rex Eridanus, geminaeque Coronae,
Et Lyra, et aequoreas quae prima innare per undas
Auſa Ratis ventos riſit, tumidaſque procellas,
Aetheris immenſas late diſtracta per oras
Diverſas habitant ſedes, Coelumque frequentant. 160

Inferiora [9] tenet Phoebus loca: nec tamen idem
Haud ſeſe aethereas immenſum attollit in oras,
Deſpectatque humiles ſublimi e vertice terras.
Finge etenim vaſto intortum glomeramine filum,
Quo liceat gyris ter mille amplectier orbem 165
Telluris magnae, immenſi tumida aequora ponti,

[9] Sol eſt longe inferior ſtellis fixis, ſed diſtat plurimum a Terra. Si illa, quam Aſtronomi dicunt parallaxim horizontalem Solis, uti eam nunc plerumque Aſtronomi eſſe cenſent, potiſſimum poſt obſervationes Caillii ad Caput Bonae Spei, eſt proximè ſecundorum $10\frac{1}{2}$; diſtantia Solis a Terra continet ſemidiametros terreſtres 19644. Circumferentia cujuſvis circuli eſt ad ejuſdem ſemidiametrum quam proximè, ut 710. ad 113. Hinc ad exprimendam eam diſtantiam aſſumuntur hic tria millia circumferentiarum, quae efficiunt ſemidiametros 18850, numerum minorem, ſed proximum priori; ac dicitur, filum, quod circumvolvatur circa omnem Terram per ter mille vices, ſi diſtendatur Solem verſus, nondum ab ipſa Terra eo perventurum.

Tot

Tot campos, vallesque, et summa cacumina montes:
Evolve, ac tenues elatum mente per auras
Distende in Solem; terris et si caput imis
Haereat, haud ipsum speres contingere Phoebum, 170
Usque adeo celsa consurgit in aethera fronte.

Ille [10] suos mutat positus, Coelumque per amplum
Excurrit longè; jamque his, jamque ignibus illis
Jungitur, et totum circum aethera lustrat oberrans.
Ipsa [11] quoque incertam mutant errantia sedem 175
Sydera, discurruntque Polo: Cyllenius ignis,
Et Venus, et diri sydus ferale Gradivi,
Cumque suis comitum turmis dominator Olympi
Jupiter, & nimio genitor jam fractus ab aevo.
Phœbum obeunt, terrasque inter, Titanis & orbem 180
Jam sese Majae proles, & Mater Amoris
Insinuat; jam se Phoebo sublimior effert.
Tum Mavors, tum deinde Jovis, tardique parentis
Assurgit Coelo sydus; jamque alta recedunt
Post Phoebum, multaque latent in luce diei; 185
Jam Phoebo adversum percurrunt aethera, et umbram

10 Sol positionem suam ad fixas ita mutat, ut integrum gyrum perficiat, delatus nimirum per eclipticam motu annuo, de quo infra.

11 Planetae itidem locum in Coelo mutant: nominantur hic autem tantummodo planetae primarii eodem ordine, quo a Sole distant, et, ut plerumque in toto poemate, mythologicis characteribus designantur; sunt autem Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, et Saturnus: innuuntur etiam secundarii planetae postremorum comites, nimirum quatuor satellites Jovis, et quinque Saturni.

Porro horum planetarum orbitae Solem ita ambiunt, ut orbita Terrae jaceat ultra orbitas Veneris, et Mercurii. Hinc hi duo planetae sunt propiores Soli, quam Terra; et dicuntur idcirco inferiores, ac ha-

Obscurae

Obscurae clarant noctis, tristesque tenebras.
Phoebum [12] etiam ardenti ferales crine Cometae
Mille viis diversi obeunt; jamque ardua tendunt
Ire loca, et spatiis se longe immanibus abdunt; 190
Jam redeunt, propiusque, at non impune, flagrantem
Rursus adire Deum, atque accedere cominus audent
Immemores; imo rabidas nam pectore flammas
Concipiunt, patulisque atros e faucibus ignes,
Commixtamq; vomunt nebulam, fumosq; nigrantes. 195

bent binas conjunctiones opticas cum Sole respectu Terrae, alteram, quam dicunt inferiorem, cum jacent respectu Solis ad eandem partem cum Terra ipsa, adeoque respectu Terrae sunt infra Solem, inter ipsam Terram, et Solem; alteram conjunctionem habent cum Sole superiorem, cum ultra Solem sunt, jacentes respectu ipsius Solis ad partes oppositas iis, ad quas jacet Terra. Reliqui tres planetae dicuntur superiores: ii nunquam possunt subire inter Solem, et Terram, cum ab illo semper distent magis, quam haec: sed quando jacent in directum cum Terra respectu Solis, si jaceant ad eandem partem, sunt respectu Terrae in oppositione cum ipso Sole; si jaceant ad partes oppositas, sunt in conjunctione cum Sole, sed ultra ipsum Solem. In hoc secundo casu magis distant a Terra, quam in primo, et idcirco dicuntur in hoc casu *alta recedere post Phoebum*, sunt enim altiora respectu Terrae. In eodem casu per diem sunt supra horizontem cum ipso Sole, et non apparent; in priore autem casu oppositionis supra horizontem sunt per noctem, et fulgore suo clarant etiam nonnihil noctem ipsam: certe Venus, et Jupiter aliquando ita emicant, ut et umbram projiciant, quae sensu percipi possit.

12 Cometae etiam circa Solem gyrant, sed dum planetarum orbitae per angustum Coeli spatium moventur, quod Zodiaci fascia occupat, ipsi habent directiones motuum admodum varias ita, ut aliae orbitae sint etiam aliis perpendiculares, immo et oppositae motuum directiones habeantur; ac dum planetae gyrant in orbibus fere circularibus, illi moventur in ellipsibus admodum oblongis ita, ut in maxima a Sole distantia, quod aphelium dicitur, plurimis vicibus magis distent, quam in minima,

Proxima

Proxima [13] Telluri vix quidquam assurgit in auras
Cynthia, demissoque humilem regit aethere currum.
Vix etenim tantum se attollit in aethera, quantum
Excurrit decies Terrae revolubile dorsum;
Atque licet turgere pares videantur uterque 200
Et Solis, Lunaeque globus, (namque aetheris alti
Dimidium unius condunt e partibus illis,
Quarum ter decies bissenas integer orbis
Occupat aethereus) transverso corpore qua se

quae appellatur perihelium, et in illo quidem casu debeant refrigescere plurimum, in hoc incalescere, et fere inflammari, quo calore excitati vapores, dum in atmosphaera Solis ascendunt ad partes Solis oppositas, caudam generant Soli ipsi semper aversam, quam ego eum unicam esse putem causam caudae cometicae, saepe ipsas caudas fumantes appello, vel cum cometas nomino, ad fumum alludo.

13 Luna est Telluri proxima: ipsius media distantia a Terra est semidiametrorum terrestrium quam proxime 60, quod hic exprimitur per 10 circumferentias terrestres, quarum singulae paullo plus continent, quam senas Terrae semidiametros: Magnitudo apparens Lunae, sive ejus, ut diximus, apparens diameter, est proxime aequalis magnitudini, sive diametro apparenti Solis, nimirum aliquando tantillo major, aliquando minor, utriusque nimirum media diameter apparens parum superat dimidium gradum circuli coelestis. Cum vox gradus apud Veteres Latinos non valeat idem, quod nunc apud Astronomos; ea vox, et omnia alia artis vocabula apud Veteres non usitata, in hoc poemate evitantur; satis autem hic exprimitur gradus orbis aetherii, nimirum circuli coelestis, cum dicatur *quarum ter decies bissenas occupat orbis*, nam si multiplicentur simul ter decem, sive 30, et bissex, sive 12, fiunt 360, quot nimirum sunt circuli gradus. At ea aequalitatis apparentia provenit ab immani distantiarum discrimine, nam Sol ita est magnus, ut ejus diameter sit plusquam triplo major, quam distantia Lunae a Terra. Nam diameter Solis continet diametros terrestres circiter 95, et distantia media Lunae a Terra 30. Distantia autem Solis a Terra 19644 semidiametrorum terrestrium, uti diximus in adn.

Distendit

Distendit Titan, plusquam ter crassior illo est, 205
Quod spatium a nostro Divam disterminat orbe,
Tercentum et paribus spatiis sese altior effert.

[14] Nec labor est positum, et variam mutantia sedem
Sydera scrutanti certis cognoscere signis:
Quodque [15] suum prodit jubar, aut sua forma, locusve. 210
Fumantes tergo caudae, crinesve soluti
Distinguunt, seu barba truces promissa cometas.
Lux placida errantes stellas, dubiique tremoris
Expers, ni densos agitet gravis aura vapores;
Clara Jovem prodit, Saturnum plumbea, at igne 215
Sanguineo fervet Mavors, et concitat acri
Mortales animos oestro, inspiratque furorem.

Quod si nec pigeat Coelum per vitrea longo
Septa tubo, Coelique ignes scrutarier, haud te

9, continet distantiam Lunae semidiametrorum 60 vicibus 327 circiter, qui numerus rotunde, ut ajunt, hic exprimitur per illud *Tercentum*.

14 Vide, si libet, versus appositos in fine hujus libri, qui huc inserti fuerunt, dum in conventu privato Arcadum Romae hoc libri initium recitaretur coram binis Eminentissimis Cardinalibus.

15 Lumen, forma, et locus, quem occupant, satis distinguit planetas, et cometas, tam a fixis, quam inter se: de his singillatim quaedam adduntur inferius. Cometae habent quandam pallentem veluti nebulam circa se, quae, si apparet circa ipsos aequaliter sparsa, dicitur coma; si in longum protenditur, tendit autem tum semper ad partes Soli oppositas, dicitur barba, vel cauda, prout dirigitur ad eam plagam, ad quam motu proprio cometa tendit, vel ad oppositam. Hinc cometae criniti, barbati, vel caudati. Sunt criniti, ubi longe distant extra Solis atmosphaeram, vel ubi jacent fere in directum cum Sole, et Terra: dum ad Solem descendunt, sunt caudati: dum ascendunt ab ipso, barbati.

Planetae plerumque non scintillant; sed tamen, ubi Coelum est satis vaporosum, ipsi etiam tremulo quodam lumine subsultant.

Jupiter,

Jupiter, aut dubia Saturnus imagine fallet. 220
Quinque [16] patri comites, at gnato quattuor adſtant
Affixi lateri, greſſumque ſequuntur herilem,
Spectanti et dominos mille inter ſydera ſignant.
Ille etiam, regno quamquam dejectus adempto,
Geſtat adhuc immanem, et multa in luce coruſcam
Ingentis damni ſolatia parva coronam:
Huic gemmis diſtincta chlamys, variataque fuco
Plurima coeruleo praecingit faſcia pectus.
Ergo ſuae natum vitae, patremque corona
Prodet, et intuitu dabit uſque agnoſcere primo. 230
At quamquam in medio quondam bene notus Olympo,
Mutato contra ignarum mox ore tuentem
Ludet, et aſtrorum latitabit in agmine Mavors.
Ille etenim terris quondam ſat proximus imis
Emicat, atque trucem oſtentans ex aethere frontem 235
Sydera ſanguineo paene omnia lumine vincit,
Inſultans: at mox vectus procul aethera in altum
Miteſcit ſenſim, poſitoque colore, minſque,
Vix aequat ſtellas tenui jam luce minores. (quam
Alma [17] Venus nunquam media tibi nocte, nec un-

[16] Jupiter habet, uti diximus, ſatellites quatuor, Saturnus quinque: ille et faſcias quaſdam, ut vittas, ac in iis partes aliquas lucidiores, obſcuriores alias videre eſt; hic annulum latum, quo cingitur in morem coronae ambientis caput: quae quidem omnia ſine teleſcopiis diſcernere nequaquam licet: ad ea ex Veterum mythologia alluditur. Mars in perigeo eſt circiter quintuplo propior Terrae, quam circa apogeum, et in primo caſu ita effulget, ut fere Jovem aequet; ſed colore fere ſanguineo; in ſecundo vero vix a perquam exiguis ſtellis diſcernitur.

[17] Venus non apparet, niſi mane ante Solem, et tum appellatur Phoſphorus, vel veſpere poſt Solem, quo tempore dicitur Heſperus. Vim luminis

Adverſa

Adversa Phoebo Coeli de parte nitebit.
Hesperus (ut sero occiduas cum vespere ad oras
Effulget, Divam Graji dixere vocantes)
Consequitur Phoebum: ast eadem consurgit ab undis
Phosphorus Eois, et Phoebi nunciat ignes, 245
Vicinumque diem, pecudumque, hominumque labores.
Illa Jovem radiis pulcherrima vincit, et ore,
Quo miserum mortale genus, quo numina captat,
Effundit jubar, ac nocturnas discutit umbras.
Atque olim, licet e medio Sol altus Olympo 250
Imbuat aërios immenso lumine campos,
Exerit alma Polo nitidum caput, atque stupentes
Allicit adspectantum oculos, ignaraque rerum
Corda rudis vulgi percellit; nuper ut amplam
Agrippae ad molem, atque immanibus alta columnis 255
Atria, confluere affusas circum undique turmas
Vidimus, & densa mirari sydus ab umbra.
Ast olim obscuras etiam spoliata per auras
Depositis graditur radiis, tenuique renidens
Lumine seu torquet miseros, seu fallit amantes, 260
Immensas late quaesita per aetheris oras.

Unus [18] vix unquam tibi se Cyllenius ignis
Spectandum dabit; atque oculos percellet acutos.
Nam semper Phoebi rutilo tam proximus orbi

habet admodum diversam ob mutatam distantiam a Terra, et positionem: aliquando in maxima sui luminis vi cernitur puro Coelo interdiu: id accidit, cum haec primo scriberentur, et ex obscuriore loco Urbis prope Pantheon, ac ex ipso templo per illam unicam ejus fenestram ingenti concursu hominum spectata est per plures dies.

18 Mercurius Soli proximus raro admodum cernitur, in maximis nimirum quibusdam elongationibus a Sole: tum autem vividissimum habet lumen ob ipsam tantam Solis viciniam.

Vix

Vix unquam hinc, atque hinc dextra, laevaque recedens,
Evolat, et tanti radiis sese explicat ignis. 265
Proinde latet, rarusque, atque imo in margine Coeli
Erumpit primo seu vespere, sive furentes
Cum jam Solis equos, currumque Aurora paravit,
Et roseos puro profudit ab aethere flores. 270
Vividus at multa vicinae in luce diei
Frustra fallaces quaerentem condere vultus
Ostendet fulgor, radiorum et cuspis acuta
Prodet perreptantem, & inania furta parantem.
At Phoeben sudo quis non agnorit Olympo 275
Suspiciens? Norunt pueri, innuptaeque puellae,
Alternantque choros, & mutua carmina dicunt;
Novit et insanum furiali turbine rhombum
Contorquens immitis anus, frontemque minacem
Crispat, et ore fremens immurmurat, abreptamque 280
Ardenti sperat Divam deducere curru.
Hactenus, aetherias teneant quae sydera sedes,
Queis noscenda tibi signis, quo sparsa per Axem
Ordine: nunc varios cursus, variosque recursus
Expediam, facili praesens modo numine Phoebus 285
Dicentem regat, et veniant ad carmina Musae.
In primis [19] Coelo quidquid nitet, Aurea Phoebe,
Phoebusque, errantesque ignes, dirique Cometae,
Syderaque extremi disjuncta in margine Mundi,

19 Habetur hic motus communis diurnus, et exprimitur tam Tychonica sententia Telluris quiescentis, quam Copernicana Telluris motae; in utraque sententia excitari debet in mente eadem idea, cum eodem modo impellantur nostrorum sensuum fibrae, sive quiescat Terra, et moveantur astra, sive ea quiescant, et haec moveatur, adeoque idem debeat in utroque casu propagari motus ad cerebrum.

Spectanti celerem motum, gyrosque perennes 290
Objiciunt: cursu occiduas namque omnia in oras
Cernimus unanimi contendere, seque rotatu
Urgere assiduo, & magnos circum ire per orbes;
Sive quod immensi moles vastissima Coeli
Ipsa super gemino sese, Tellure quieta, 295
Cardine circumagat, conclusaque transferat astra;
Sive quod affuso librata sub aëre Tellus
Axe suo se verset agens, Coeloque quieto,
Eoas contra semper nitatur in oras.
Namque oculos eadem pulsat, pertingit ad imas 300
Forma eadem cerebri sedes, sive omnia circum
Spectatorem obeant immotum, sive quietis
Omnibus, ipse suo se vortice flectat in orbem.
  Contorta insani quondam sic impete venti
Stantem alta in puppi dum te jubet unda rotatu 305
Circumagi rapido, et subita vertigine torquet,
Mille rates, si mille notis dant plena secundis
Lintea, spumantesque undas, montesque remotos,
Littoraque, et turres, et quidquid in aethere summo
Eminet, immotum circa te volvier, atque 310
Illo, quo raperis, raptari vortice credas.
Atque hinc, et patria exusta dum Troïus heros
Provehitur portu, terrasque recedere, et urbes
Vidit, et objecto discedere littora ponto.
  Hoc [20] oritur motu Titan, atque occidit, atra 315

[20] A motu diurno pendet ortus, et occasus Solis, adeoque alternatio diurna caloris, et frigoris utilissima ad vegetationem, aestus marinus, quo aquae elevantur, vel deprimuntur in eodem loco pro diversa positione, quam is acquirit ad Solem, et Lunam, a quorum actione in Newtoni theoria pendet figura, quam Tellus debet acquirere ad habendum ae-

Alternans

Alternans cum nocte diem, et vel rore tepenti,
Foecundaque fovet radiorum aspergine sylvas,
Humorem inspirans venis, fibrasque resolvens,
Vel finit admissos sensim concrescere succos.
Hinc tumido alternos ciet aequore Cynthia fluctus, 320
Jamque locis îsdem trahit undas, jamque repellit
Attollens, pondusque levans, jamque aggravat, atque
Introrsum premit, et fundum compingit ad imum.
Hinc dubias regit Ursa rates, dum cardinem ad ipsum
Acta brevi circum, & nunquam demersa sub undas 325
Orbe meat, Coelique plagas, Terraeque patentis
Designat varias lenta vertigine sedes,
Ventorumque domos: hinc ardua vertice ab alto
Sydera scrutatus pastor sua tempora novit,
Excubiasque novas ciet, indulgetque sopori. 330

Communem [21] hunc dicunt; namq; omnia sydera mo-
Consensu unanimi, & communi foedere servant: (tum
Illum etiam exactae quoniam mensura diei
Limitibus finit certis, dixere diurnum.

Est alter primo assimilis, quique omnia motus 335
Sydera lege pari circumfert, non tamen îsdem
Cardinibus, non occiduas directus in oras,
Nec spatiis adeo conclusus temporis arctis.
Obliquos peragit nam cursus, signifer orbis

quilibrium. Eodem modo circumaguntur circa polos stellae omnes; unde fit, ut Ursa, potissimum minor, et potissimum ea ipsius stella, quae, cum in ejus cauda sita sit, appellatur Cynosura, polo proxima, et idcirco minimo motu acta, et nunquam occidens, sit aptissima ad designandos cardines horizontis; aliae autem stellae paullo remotiores ab ipso polo aptae sint ad designandas horas per noctem, quas nimirum rustici, et pastores norunt ex solo stellarum aspectu.

21 Omnes stellae etiam fixae

Qua ſeſe adverſum excurrens protendit in ortum, 340
Ac poſt bis centum, et decies poſt ſaecula quinque
Vix redit ad caput, et gyro coit integer uno.

Illius hoc axis motu ſe haud paſſibus aequis
Contorquet, jamque hos, jamque illos aetheris ignes
Ad Boream rapit, atque immoto in cardine figit. 345
Scilicet et tempus veniet, cum ſe omnis Olympi
Invertet facies, nec jam reget altera Grajas,
Altera Sidonias puppes fera: Roma ſepultas
Littore ſub Libyco mirabitur aethera in altum
Produci flammas: telo metuendus acuto 350
Aequoreis Indus torvum caput efferet undis;
Exurget Junonis avis, frontemque ſuperbam
Eriget, & longo protendet ſyrmate caudam,
Quaeque pedes contraxit Apus, quaeque igne quaterno
Nunc regit incertos alio Crux aequore nautas, 355
Aeſtivo campos nec findet Sirius igne,
Nec Boream, gelidaſque nives, glaciemque rigentem
Reſtituet Caper, aut verſabit Aquarius urnam.

Non [22] tamen his tantum ſi motibus incita tendant

habent allum motum itidem communem; ſed is alios habet polos, nimirum polos eclipticae, adeoque ejus directio eſt obliqua reſpectu directionis motus prioris: fit non in occidentem, ſed in orientem, et eſt lentiſſimus, cum exigat circiter 25 annorum millia ad unicum gyrum abſolvendum.

22 His motibus nulla fit mutatio in poſitione mutua ſtellarum, ſi ſpectentur a loco quopiam proximo centro Terrae: ſpectanti e ſuperficie ipſius occurrit mutatio quaedam poſitionis, ob illam, quae ab Aſtronomis dicitur parallaxis, quae aſtra deprimit: ea oritur ab obliquitate radii viſualis, qui inclinatur ad rectam tranſeuntem per centrum Terrae, et per aſtrum, adeoque id efficit, ut ipſum aſtrum non referatur ad illud Coeli punctum, ad quod referretur, ſi ſpectaretur e centro Terrae: eſt autem idcirco parallaxis eo

Sydera,

Sydera, Tellurisque sinu spectator ab imo
Suspiciat, cursumque oculis scrutetur acutis,
Turbari positus, atque intervalla locorum
Sentiet. Unanimi dum se vertigine circum,
Et paribus torquent gyris, fugiuntque, sequnturque;
Immutata manent spatia, atque immobilis ordo. 365
Illa modo, aethereas quae non nimis ardua in oras
Extulerunt caput, et Terras fugere jacentes,
Obliquo lucis tractu si celsus ab alto
Despectes Terrae dorso, vel nuper ab undis
Egressa aequoreis, vel jam ruitura sub undas, 370
Credideris mutasse locum, atque a vertice Olympi
Demitti, et fundum plus aequo accedere ad imum.
At non 23 &, propriis dum sese errantia gyris
Sydera contorquent, certa intervalla locorum,
Ut monui, & positus servant, semperque sub îsdem 375
Syderibus fixis, Coeloque feruntur eodem.
Atque age jam, vastis qua lege coercita campis
Excurrant, varios Coeli qua parte meatus
Instituant, renoventque, canam: tu mente canentem
Sectare, et tacito cantum sub pectore versa. 380
Principio 24 Coeli per dorsum immane ruentem

major, quo astrum est remotius a zenith, et horizonti propius: est itidem eo major, quo astrum est propius Terrae, ac idcirco in stellis fixis prorsus insensibilis, in planetis omnibus perquam exigua praeter Lunam, in qua aliquando superat unum gradum. Dicitur autem hic despectare astrum is, qui id intuetur, ut exprimatur illud, radium, per quem is ipsum videt, esse quodammodo altiorem recta tendente a centro Terrae ad ipsum astrum, quam ob causam id per hanc parallaxim deprimitur.

23 Motus proprii planetarum perturbantes positionem mutuam.

24 Aequator, quem ecliptica ipsi obliqua secat in duo

Concipe, quae media excurrens regione diurnos
Exercet motus magis omnibus amplior una
Orbita, et immoto procul alta recedit ab axe.
Hanc ſecat obliquam, et rutilis qua ſplendida ſignis 385
Faſcia procurrit longe, par altera primae
Semita per mediam protenditur, atque rigentem
Non nihil ad Boream ſe hinc alta attollit, et inde
Non nihil imbre gravem ſe prona inclinat ad Auſtrum.
Illa plagam, unanimi, ſignat, quam ſydera motu 390
Reſpiciunt, dum lenta meant ad Memnonis oras;
Illa viam, proprium qua Phoebus in aethere curſum
Aut peragit, curru et liquidas radiante per auras
Igneus, igniferoque regens fumantia fraeno
Quadrijugum colla invehitur, pigramque jacentis 395
Terraï molem circum undique luſtrat oberrans,
Seu tota Terrae cum mole obeuntibus ipſum
Creditur Eoas contendere ſemper in oras.
Quidquid id eſt, totum biſſenis menſibus orbem
Abſolvit Titan, atque anni tempora ſignat. 400
Vere novo molitur iter, qua ſe utraque jungit
Semita, tum gelidas orbis procurrit ad oras
Signifer: hinc primum Coeli menſoribus ortum
Aetherei capiunt motus: hoc omnibus unum

bus punctis: ſecundus ille motus ſtellarum, de quo adn. 21, eſt parallelus ipſi eclipticae, ac per eam fit motus proprius Solis annuus: concipitur ab Aſtronomis initium ejus motus in altera e binis interſectionibus eclipticae cum aequatore, nimirum in ea, in qua zodiacus pergendo in orientem tranſit ab hemiſphaerio auſtrali ad boreale, et ad eam interſectionem Sol devenit in aequinoctio verno, quae idcirco etiam appellatur ſectio verna. Ab hac eadem ſectione verna Aſtronomi incipiunt numerare et aſcenſionem rectam, et longitudinem, per quas, conjunctas cum declinatione, et latitu-

Principium

Principium constat numeris, haec ultima meta. 405
Ipse [25] Aries, fulvo rutilat qui fulgidus auro
Agmen agens comitum primus, bissenaque Coelo
Signa regens, hac ipsa olim de parte coruscum
Fundebat jubar: at longo jam tempore in ortum
Post annos bis mille abiit, sedemque secundam 410
Nunc tenet, et spatio Pisces subiere relicto.
At priscum nomen servat locus, atque recentem
Dicitur a puro fulvi Sol velleris auro
Ducere nunc etiam auspiciis felicibus annum.
Non illo imparibus noctem discriminat horis, 415
Atque diem Titan, non illo tempore torvus
Aut Aquilo, aut Boreas saevit, glacieque nivali
Et sylvas, camposque, atque alto a culmine montes
Obruit, et gelido constringit frigore membra.
Nec nimium Coelo Titan elatus aperto 420
Arentes findit campos, glebasque resolvit.
Sed faciles ventorum animae, levis aura per herbas
Ludit, odoratis zephyrusque immurmurat alis.
Ipsa annum renovata novum Natura sereno
Excipit arridens vultu, frondesque virentes 425
Per nemora, & saltus, per prata nitentia flores
Effundit late, et blandos inspirat amores.

dine, syderum loca designant.

[25] Omnia signa zodiaci illo motu, de quo egimus adn. 21; processerunt in ortum bis mille circiter annis per unum signum ita, ut nunc stellae Arietis sint, ubi olim erant stellae Tauri; et stellae Piscium successerunt in earum locum. Hinc Astronomi distinguunt zodiacum, quem vocant apparentem, ab alio, quem vocant rationalem. Signa zodiaci apparentis sunt partes fasciae coelestis continentes quaedam stellarum fixarum aggregata, contenta quibusdam figuris, quas in Coelo concipimus ad designandas facilius certis nominibus ipsas stellas fixas: signa

O me illo raptum qui tempore propter amoenas
Eridani ripas sistat, vel Thessala Tempe
Carpentem flores, mulcentemque aëra cantu! 430
Progresso crescit Phoebo, flammasque sub imo
Annus alit gremio, & juvenili exaestuat igne.
Tum spicis redimita comas flavescere campos
Imperat alma Ceres, tersa rubigine durus
Exacuit Messor falces, atque horrea complet. 435
Succedit compresso æstu maturior aetas:
Libra dies iterum productis noctibus aequat;
Fundit opes Pomona, uvis turgentibus ardent
Setini colles, et Massica rura, Falernique
Alta juga, ac plenis spumat vindemia labris. 440
Ast ubi jam sedem Capricorni allapsus ad imam
Phoebus humo propior serpit, se tarda senectus
Infert incerto gressu, summoque nivalis
Vertice canities, mentoque per hispida membra
Labitur: adstrictis gelido stat frigore venis 445

vero zodiaci rationalis sunt illa loca, quae occupabantur ab illis fixis tum, cum ejusmodi nomina sunt imposita; incipiendo a sectione verna aequatoris cum ecliptica, quae ipsa sectio verna cum respectu fixarum singulis annis regrediatur in occidentem, aequinoctia annorum sequentium fiunt ante, quam Sol redeat ad eas fixas, cum quibus fuerat annis praecedentibus in ipso aequinoctio, unde factum est etiam, ut ille fixarum motus dictus sit praecessio aequinoctiorum. Porro zodiacus prior dicitur *apparens*, quia oculis ipsis apparent stellae, quibus is constat; hic autem posterior *rationalis*, quia eum ratione tantum concipimus.

Jam vero initium calculorum suorum Astronomi solent accipere ab initio hujus rationalis zodiaci, et loca planetarum designant per ipsum rationalem zodiacum, adeoque in ipso momento aequinoctii verni, a quo annus, apud poetas potissimum, ducit exordium, Sol dicitur esse in principio Arietis.

Humor,

Humor, et effoetae torpent in corpore vires.
Ipse [26] quidem in medio Titan: at qua ampla coruscis
Fascia se hinc signis, atque inde extendit, utraque
Parte suos ineunt errantia sydera gyros,
Jamque meant dextra, laeva jam parte feruntur 450
Libera, sed certos prohibet transcurrere fines
Balteus, et varios cursus, variosque recursus,
Erroresque vagos arcta intra septa coercet.
Illa pater [27] medio Titan resupinus ab axe
Suspiciens, cursumque alto metitus Olympo 455
Haud equidem incertis, ut nos, erroribus acta
Prospicit: Eoas certo nam singula in oras
Calle videt liquidas circa se innare per auras.
Calle, parem qui se non circum flectat in orbem
Aequalis, gremio brevior sed contrahat imo 460
Non nihil, elatoque excurrat longior axe;
Qualem Niliaco qua marmore, sive rigenti
Aere graves vasta surgentem mole columnae

26 Sol peragit motum suum per eclipticam, quae est in medio zodiaco, a qua illum censuerant veteres nunquam egredi, egreditur autem nonnihil ex theoria gravitatis generalis, quae multas in motus planetarum aberrationes inducit; sed id quidem ita est exiguum, ut haberi possit pro nullo. Reliqui planetae liberius evagantur hac, illac, sed nunquam exeunt ex illa fascia, quae dicitur zodiacus, et quae est adhuc satis arcta: ejus latitudinem alii ex Astronomis aliam posuerunt; illam determinat haec ipsa maxima evagatio planetarum in latitudinem: ea maxima est in Venere perigea, in qua adhuc est proxime graduum 9, unde amplitudo zodiaci terminantis evagationem ipsam est proximè graduum 18, quod spatium respectu totius semicirculi graduum 180 interjecti inter polos jure potest hic dici *arctum*, cum sit ejus decima pars.

Nominantur hic autem cursus, et recursus, nimirum progressiones, et retrogradationes Planetarum e Terra visorum.

27 Planetarum motus visi e

Attollunt

Attollunt Coelo frontem, Regumque superba
Sustentant aedes, vel Divûm ardentia templa, 465
Auratasque trabes, et culmina fulgida gemmis;
Vix quidquam obliquo si forte per intima ductu
Viscera dissectam disjungas, praebeat orbem
Forma teres, qui vix aequo discedat ab orbe,
Atque hinc elatis procurrat frontibus, inde 470
Vix quidquam adducto subsidat corpore pressus.
Hinc [28] autem et gressu vix impare singula cernit

Sole sunt admodum regulares, qui e Terra spectantibus apparent perturbatissimi. In primis illorum motus e Sole visi fiunt semper in orientem, et fiunt non in circulo, sed in ea ovali linea, quam Geometrae ellipsim vocant, et quae est una e tribus sectionibus conicis, quae nimirum provenit, ubi conus, vel etiam cylindrus oblique secatur. Si columna vel aeque crassa, vel aequaliter attenuata secetur oblique, provenit haec figura, et si obliquitas sit exigua, obvenit etiam exigua productio secundum alterum axem, et contractio secundum alterum; ac hujusmodi sunt orbitae planetarum circa Solem, qui positus est non quidem in centro, sed in altero ex iis binis punctis singularum orbitarum, quae puncta dicuntur foci, et quae in ellipsibus admodum parum compressis, parum distant a centro; et haec est prima e tribus celeberrimis legibus motuum planetarum a Keplero deprehensis. Porro ita exigua est haec orbitarum compressio, ut axis major in Mercurio, in quo ea est maxima, minorem vix superet quinquagesima sui parte, in Marte quatuor millesimis, in reliquis autem multo minus.

28 Planetae in minore distantia a Sole celerius moventur, quam in majore, et motus ipse ob majorem viciniam apparet adhuc major spectanti e Sole; mutatur nimirum haec apparens velocitas in illa, quam Geometrae vocant rationem reciprocam duplicatam distantiae, quod facile deducitur ex secunda lege Kepleri, quae dicitur arearum aequalium, per quam area trilinei clausi arcu, quem planeta describit dato tempore, et binis rectis ad Solem ductis, est ejusdem semper magnitudinis, unde fit, ut si tempuscula assumantur exigua, anguli in ipso Sole, qui apparentem celeritatem metiun-

Per

Per liquidas se ferre vias; namque aethera in altum
Dum tollunt sese, ac Coelo magis ardua surgunt,
Illa quidem cohibere gradum suspectat; et imum 475
Demissa ad callem contra, ac propiora volatum
Urgere, atque fugam certa contendere lege.
Ast aequo cum vix discedat callis ab orbe;
Et spatia exiguo, & cursus discrimine distant.
Præterea [29] quae se vasto sublimia Coelo 480
Attollunt magis, et gyro majore feruntur,

tur, sint eo majores, quo minor est longitudo areolae ducta in se ipsam, sive quo quadratum distantiae est minus, quae quidem jam et Geometris, et Astronomis sunt notissima. Verum ob hunc ipsum nexum celeritatum apparentium cum distantiis, distantiarum discrimine existente exiguo, etiam velocitatum discrimen exiguum est.

29 Hic innuitur tertia Kepleri lex, qua connectuntur inter se distantiae mediae planetarum a Sole cum temporibus periodicis, quibus nimirum planetae ipsi integras periodos absolvunt: planetae, qui longius distant, longiore tempore integram conversionem perficiunt, atque id tali lege, ut etiam celeritates motuum tam reales, quam apparentes, intuenti e Sole, majores sint in planetis propioribus. Ea Kepleri lex sic exprimitur: quadrata temporum sunt, ut cubi distantiarum: quae autem inde pro celeritatibus theoremata deducuntur, Geometrarum idiomate sic exprimuntur: celeritas realis est in ratione reciproca subduplicata, et apparens in ratione reciproca sesquiplicata distantiae.

Hae leges, cum superioribus binis Kepleri legibus, et earum consectariis ad praesens argumentum minus pertinent, et admodum difficulter possunt exprimi nitido Latino versu potissimum hoc stylo amoeniore aliquanto, ac minus rigido, quem adhibere curavi, et maxime lex tertia, in qua explicandum esset, quid sit quadratum, quid cubus. Id quidem praestitit elegantissime Benedictus Stayus celeberrimus vir in recentiori sua Philosophia, cujus secundum volumen cum meis adnotationibus, et supplementis prodit Romae nunc, dum ego haec Londini scribo: Is autem vir plane summus, qui tantam sibi suis poëmatis comparavit laudem per universam

Lenta

Lenta magis longos cursum producere in annos
Prospicit, at demissa magis, mage concita gressum
Urgere, et brevibus concludere mensibus orbem,
Lege quidem aeterna, et rerum qua Conditor ipse 485
Gaudeat, ac Coelo adspectans sibi plaudat ab alto,
Quam tamen ipse quidem culto depromere versu,
Haud ausim, et Latiis sperem celebrare Camoenis.
Namque mihi haud animo id subeat, nimis impare nisu
Vatibus ut vetita, et Musis impervia quaeram 490
Ire loca, ac Pindum transcurrere: talia tentet
Communis patriae decus, atque aeterna Ragusae
Et breviore via, & cursu mage praepete primus
Gloria Stayades, pronas cui Pegasus alas
Summisit plaudens, quem Pindo eduxit, et alto
Abreptum curru per sydera vexit Apollo. 495
Mi satis ad summi reptare cacumina Pindi.

Europam, in omni alio et sacrae, et profanae eruditionis, ac solidae doctrinae genere ita excellit, ut in admirationem rapiat animos eorum omnium, quibuscum vivit, quos simul et probitate summa, et suavitate morum devincit sibi. In quo quidem me nec amicitiae, quae mihi cum eo intercedit maxima, nec communi patriae, et communibus, quos habemus, consanguineis plus aequo tribuere, novit sane Roma in primis, et Italia universa.

Ex his Keplerianis legibus deduxit Newtonus gravitatem suam generalem decrescentem in ratione, quam dicimus reciprocam duplicatam distantiarum, quam legem Maupertuisius censuit omnium legum perfectissimam, ad quod hic respexeram: verum ego quidem, posteaquam in mea Philosophiae Naturalis Theoria edita Viennae ante hosce duos annos, in eam Maupertuisii opinionem aliquanto diligentius inquisivi, contrarium opinor, et arbitror legem ipsam non accurate, sed proxime, nec in minimis, sed in magnis tantummodo planetarum, et cometarum distantiis habere locum: adhuc tamen tota universa systematis planetarii moles ita est sane admirabilis, ut jure omnino dici potuerit,

Ima

Ima 30 tenens ergo Maja fatus omnibus unus
Antevolat, nexisque Secans talaribus auras
Undecies octo redit ad loca prisca diebus, 500
Mille quater spatiis Phoebi disjunctus ab igne,
Qualibus ampla tumet transverso corpore Tellus.
Alma Venus septem spatiorum in millia surgit,
Septenisque orbem prope complet mensibus: illam
Millibus alta decem Tellus despectat, et aura 505
Innatat in tenui: at Coelum ter quinque per amplum
Millibus assurgit, tristique exaestuat igne
Bellipotens, vultuque ferox, flammaque cruenta
Concitat incautas in mutua funera gentes.

rerum qua Conditor ipse gaudeat.

30 Exprimuntur hic numeris, ut aiunt, rotundis distantiae planetarum a Sole, et tempora periodica. Apponam ex elementis Astronomicis Caillii & tempora periodica, & distantias medias in iis partibus, quarum distantia media Terrae habet 10000, quae quidem partes sunt proximè aequales diametris Terrae, cum adn. 9. habuerimus distantiam Terrae a Sole semidiametrorum terrestrium 19644, adeoque diametrorum proximè decem millium. Sunt autem hujusmodi:

	Tempus periodicum.			Distantia media.
	Dies.	H.	Min.	
Mercurii	87	23	$15\frac{1}{2}$	3872
Veneris	224	16	$48\frac{1}{3}$	7233
Terrae	365	6	$9\frac{1}{4}$	10000
Martis	686	23	$30\frac{1}{2}$	15203
Jovis	4332	12		51980
Saturni	10759	8		95302

Tempus Mercurii expressi per dies undecies octo, nimirum 88, a quo differt per aliquot minuta tantum; reliqua tempora laxius exprimuntur, sed ad rem poeticam satis proxi-

Nam

Nam [31] Venerem, Martemque inter Natura locavit, 510
Et nimium ah! miseros spatiis conclusit iniquis.
Nos unum in pleno circa se insumere gyro
Sol videt, at geminis Mars lentior indiget annis.
Eminet usque magis, quatuorque minora per auras
Jupiter aethereas circumvehit altior astra: 515
Millia namque, quater bissenis millibus, addit
Quattuor, et placido ingreditur gravis ore, hyemesque

me: Veneris per menses septem: sunt autem, computando menses alternos, dierum 31, & 30, menses 7, et dies 10, atque idcirco posui *orbem prope complet*, ut ostenderem, tempus esse paullo longius septem mensibus: Tempus, quo spectatori in Sole posito videtur Terra integram periodum absolvisse, est, uti posui, annus integer; is nimirum, quem Astronomi periodicum vocant: is differt paucis minutis ab illo communi, quo utimur Terricolae, quem Astronomi appellant Tropicum, qui quidem ad spectatorem in Sole positum non pertinet. Martis tempus superat annos duos per 44 dies, qui tamen non ita multi sunt respectu annorum duorum: idcirco dictum est *indiget geminis annis*: Jupiter insumit annos 11, et plusquam 10 menses nimirum proxime annos 12, qui numerus ad veritatem accedit magis, cum pro decem annis ponuntur decem hyemes, quae possunt esse integrae decem in annis decem etiam non integris. Saturnus impendit annos 29 et menses $5\frac{1}{2}$, qui hic habentur pro annis triginta, cum tricesimi habeatur fere dimidium.

Distantiae expressae sunt per numeros proximos integrorum millium diametrorum Solis, nimirum 4, 7, 10, 15, 52, 95: caetera satis patent numerus autem 52 pro Jove exprimitur per *quater bissennis addit quattuor*, nam quater 12 dant 48, cui numero si addantur 4, habetur 52.

31 In hoc argumentum Terrae in planetario systemate constitutae inter Martem, et Venerem, in conventu celeberrimae Romanae Arcadum Academiae epigramma Latinum recitavi olim cum versione Italica: sic autem se habebant:

EPIGRAMMA.

Aspicis, ut varios amor excitet, iraque motus
Partiti humani pectoris imperium?

Bissenas

Biſſenas longo numerans compleſtitur orbe.
Longe ultra gnatum extremis lentiſſimus oris
Conſequitur, claudens agmen, deciesque novenis 520
Millibus adjiciens ſpatiorum millia quinque
Alta tenet, greſſuſque trahit Saturnus anhelos.
Ille [32] quidem triſti ſenio jam fractus, et ampla,
Quam retinet, capitis decus olim inſigne ſuperbi,
Nunc onus annoſae frontis, premiturque corona, 525

Hic gemit ah! durae fraudatus amore puellae,
Ille hoſtem inſequitur torvus, & arma quatit.
Miraris! cerne auricomum quonam ordine Solem
Diſpoſita in gyrum ſydera circumeant.
Mercurius propior Phoebo, Venus axe recedit
Altior, hinc Veneri proxima Terra ſubit:
Tellurem vaſto Mars orbe amplectitur, illum
Jupiter, hunc pigri plumbea ſtella patris.
Quos Venerem, Martemque inter Natura locavit,
His, mirum, ſi Mars imperet, atque Venus?

TRADUZIONE.

Vedi, quai flutti amor ſolleva, ed ira
Nell' uman cuor partendone l'Impero?
Un geme indarno, e pel ſuo ben ſoſpira,
Un arde, e ſmania di furor guerriero.
Strano ti ſembra il rio deſtin? Rimira
Quello, che ſerba ogniora ordin premiero
Lucido ſtuol, che intorno a Febo aggira
Il pie per lo celeſte ampio ſentiero.
Vedrai Mercurio, indi al gran corſo intenta
Venere, Terra, e Marte: il genitore
Vien dietro a Giove colla ſtella lenta.
Tra il Dio dell'armi, e l'alma Dea d'amore
Sta l'uom rinchiuſo, e non ſia poi, che ei ſenta
Tutto ondeggiar d'amor di ſdegno il cuore?

[32] Alluditur hic partim ad communem Veterum Mythologiam, partim ad phyſicam veritatem. Annulus ille Saturni

Ceſſat,

Cessat, et obliquo despectat lumine natum.
Quinque senem famuli frustra comitantur, & ipsum
Ad se quisque trahens levat intolerabile pondus,
Namque et terdenos cursum producit in annos.
Ipsa etiam, 33 ostentant longas quae sydera caudas 530
Aut barbam, aut sparsos circum cava tempora crines,
(Quamquam eadem late Coelo spatiantur aperto,
Atque aliqua in Boream tendunt, nituntur in Austrum
Quaedam alia, et rutilis quaedam contraria signis,
Occiduas longo cursu volvuntur in oras, 535
Plura suos peragunt obliquo tramite gyros,
Liberaque in partes Coeli quascunque feruntur)
Ipsa etiam Phoebus nunquam consistere, nunquam
Flectere cernit iter, sua per vestigia retro
Nec revocare gradum, aut coeptos abrumpere cursus.
Productis longe procul orbibus edita in oras (540
Scilicet immensum aethereas tolluntur, et altis
Mersa diu tenebris sese abdunt, aethere ab alto
Dum redeant, ignesque vagos, socia agmina rursum,

est quaedam velut corona immanis, quam ipse Saturnus in suo motu circumfert. Ipse annulus in Saturnum gravitat juxta Newtonianam theoriam, sed ejusmodi gravitatem minuit gravitas in satellites: quivis satelles auget gravitatem particularum annuli distantium hinc, et inde per quartam partem circuli a suo loco; sed multo magis gravitatem partium jacentium in eadem recta cum ipso hinc, et inde, et si tota actio consideretur, magis minuitur, quam augetur id pondus.

Porro notae sunt poetis irae veteres Saturni regno pulsi a Jove: Saturni autem annullus plerumque obliquus est respectu Jovis, quem idcirco Saturnus idem illo superior *obliquo despectat lumine*. Haec ex communi mythologia, ut adhuc residuum aliquod irarum supersit; sed initio libri v. eosdem ut reconciliatos in vicem considerabimus per mutuam Newtoni attractionem.

33 Cometae orbitas habent admodum oblongas ita, ut se-

Phoebumque

Phoebeumque jubar post saecula longa revisant. 545.
Legibus at parent îsdem, Phoeboque citatos
Accelerant propiora gradus, procul edita tardant,
Quaeque suo servant et debita tempora calli.
Haec medio intentus Titan suspectat ab imo;
Temporaque, et certos confert ex ordine calles. 550
At nos, [34] qui Phoebo longe distamus ab ipso,
Longe alium tuimur cursum, turbataque pulchri
Ordinis est ratio, mentemque, et lumina fallens,
Tenvia vix veri praebet vestigia motus.
Impare nam gressu nobis errantia quinque 555
Sydera Memnonias jam progrediuntur in oras,
Jam longa ceu fessa via cohibere volatum
Paullatim, et dubiis veluti suspendier alis,
Deinde viam sinuare, pedemque referre, videntur,
Et petere occiduas retro radiantia contra 560
Signa plagas, rursum parvo sed tempore turpis
Ceu pertaesa fugae primum consistere, deinde
Flectere iter, veteremque novo conamine cursum
Instaurare iterum, celerique insistere gressu.
Quid vero, [35] ardenti longos quae pectore fumos 565

re ab ellipsibus degenerent in parabolas, quae in infinitum abeunt; sed re vera ellipticae sunt, & cometae ipsi servant easdem leges cum planetis, quod omnibus jam Astronomis persuasum est: hinc respectu Solis nullas habent stationes, aut retrogradationes, ut nec planetae. Eorum tamen orbitae non habent aliquem certum zodiacum, ut planetae, quod falso Cassinus credidit; inveniuntur enim directae in omnes Coeli plagas, ut diximus in adnotatione 12.

34 Nobis procul a Sole positis motus planetarum necessario maxime irregulares sunt; hic innuuntur illae, quas Astronomi dicunt progressiones, stationes, et retrogradationes.

35 Multo magis irregulares

Astra vomunt, caudamque gerunt, barbamve, comamve?
Illa quidem superas sine lege errare per oras,
Quo fortuna ferat, vel mobilis incitet aura,
Credideris: tantis dubios ambagibus orbes
Confundunt, luduntque alta e Tellure tuentem. 570
Conceptum recto producere tramite cursum
Saepe putes, gradibusque aequis se ferre per auras
Concita, qua primo direxerit impetus ortu.
Cum subito sinuare viam, et procul avia calles
Ire per obliquos, diversaque tendere cursu 575
Aspicis, et flamma magis usque ardere minaci,
Fumantesque procul caudas protendere, dum se
Vicinae demum condant in luce diei:
At contra incurvos gressum sinuare per arcus

nobis apparent cometarum motus: aliquando videntur abire per rectas lineas motu aequabili, quando nimirum a Sole magis distant, ubi eorum orbita exiguam curvaturam habet, et idcirco multi Astronomi crediderant, ipsos ferri in recta linea, vel immanibus circulis, quorum omnis pars nobis conspicua assumi possit pro recta, et ex hac suppositione Cassinus futura aliquot cometarum loca cum successu praedixerat; sed eam hypothesim evertit motus aliis temporibus admodum curvilineus, quod accidit circa perihelia: et ea, quae hic primo loco proponuntur, pertinent ad cometas, qui apparent, dum descendunt ad perihelia, caudati, et primo quidem fere rectilinei, tum sinuati, et curvi, ac quotidie magis lucidi, et fumantes magis, donec ad Solem ita accedant, ut videri ultra non possint ob nimiam diei, vel crepusculi lucem. Quanquam aliquos per diem etiam videre licet, quod accidit cometae anni 1744, quem ego prope perihelium vidi aliquoties nudo oculo etiam binis horis post Solis ortum, usque adeo ingenti lumine emicuerat.

Ex opposito, ubi in reditu a Sole apparent barbati, initio quidem maximè & lucidi, et fumosi habent motum curvilineum; tum videntur ad rectilineum motum magis accedere, ac languescere paullatim

Exortu

Exortu primo, densosque e faucibus ignes 580
Evomere, et longos olim praemittere fumos:
Tum recto sensim discedere tramite, et igne
Pallida restincto se condere noctis in umbra:
Saepe fugam interea contendere, saepe citatos
Jam sensim cohibere gradus, jam sistere, jamque 585
Detortis retro ferri in contraria pennis,
Nuper et emensas rursum metirier oras.
Ignibus hinc eadem aeternis adscribere, et alto
Accensere Polo, rudis, atque ignara Vetustas
Abnuit, atque humilem nascentibus invida sedem 590
Attribuit, rapidaeque brevissima tempora vitae:
Sulphure nam pingui, tepidoque exorta vapore,
Quem fervens gremio Tellus effundit ab imo,

ob distantiam auctam et a Sole, et a nobis, donec ob luminis tenuitatem videri desinant per ipsam noctem; quod quidem accidit omnibus tribus cometis superioris anni, quorum posteriores duos Parisiis vidi, primum Romae, in recessu a Sole perpetuo evanescentes magis: primus etiam in descensu ad Solem visus est in Saxonia, et Parisiis.

Porro et velocitatem sui motus mutant plurimum, atque id multo magis respectu Terrae, respectu cujus aliquando motum ipsum jam accelerant, jam retardant, nec vero id semel, ut respectu Solis, respectu cujus mutant solum in ipso perihelio accelerationem in retardationem: aliquando autem respectu Terrae e directis etiam fiunt retrogradi, vel vice versa.

Atque hinc diu habiti sunt pro exhalationibus fortuitis, quod Astronomiae obfuit plurimum, cum idcirco eos veteres astronomi ita neglexerint, ut nullae eorum observationes antiquae supersint, quarum ope determinari possint orbitae, cum orbitis, quas nunc observamus, comparandae, ut periodica tempora eruantur inde, et reditus tuto praenunciентur: atque id quidem huc usque non licet, nisi in binis, quorum alterum habuimus superiore anno, alterum juniores Astronomi videbunt post hosce triginta annos; eorum enim periodi breviores sunt, prioris

Incolere aërios tractus, et proxima terris,
Censuit, incerto se per loca ferre volatu, 595
Dumque volant, flamma sensim consumpta voraci,
Desinere in tenues rursum resoluta vapores.
Ceu subito aestivis crebros in noctibus ignes
Cernimus exortu consurgere, et aëra longos
Per vacuum tractus flamma signare volucri, 600
Deinde brevi tenues iterum vanescere in auras.
Quod superest, [36] quoniam transverso calle feruntur
Errantesque ignes, tristesque edentia fumos
Sydera, et, astriferis ardet qua fascia signis,
Jam laeva excurrunt, dextra jam parte vagantur; 605
Dum mutant latus, et Boreae de parte nivalis
Adversum obliquo declinant tramite in Austrum,

quidem annorum circiter 75, posterioris 130, et idcirco per recentiores observationes inventa est in illo eadem orbita jam quater, in hoc bis.

36 De nodis hic agitur, in quibus planetarum orbitae secant eclipticam, qui quidem nodi maximè ad eclipses pertinent. Neque enim Luna aut ipsa deficit, aut defectum Solis parit, nisi sit nodo proxima; ut nec Mercurius, aut Venus in Sole apparent, nisi eo tempore, quo ipsi conjunguntur, sint in ipsis nodis, aut iis proximi.

Cum orbita planetae cujusvis, et cujusvis e cometis huc usque observatis sit obliqua ad eclipticam, oportet ipsa ejus planum secet, et veluti perforet in binis punctis, in quorum altero transitur ab hemisphaerio australi ad boreale, in altero a boreali ad australe. Ea puncta dicuntur nodi, et prior quidem dicitur nodus adscendens, posterior vero descendens. Cum planum cujusvis orbitae et planetariae, et cometicae transeat per Solem, nodi ipsi e Sole spectari apparebunt in punctis Coeli oppositis; jacebit enim uterque in eadem recta transeunte per Solem inter ipsos situm.

At respectu Terrae nodus idem apparebit in diversis Coeli partibus, pro diversa positione Terrae respectu ipsius. Si nodus jaceat intra orbem magnum, uti jacent nodi Mercurii, et Veneris, et quorun-

Seu

Seu redeunt contra, et glacialia signa revisunt;
Semper iter medium tranent, Phoebique necesse est
Usque secent, resecentque viam: sectae, atque resectae
Illa oculis tibi puncta viae, mentique sagaci (610
Siste vigil: namque usus erit, nec parva sequentur
Commoda quaerentem arcanas cognoscere causas.
Ex re nomen habent. Cum scilicet utraque in illis
Orbita se jungat, nectatque, ut tenvia nodo 615
Necti fila solent; nodos dixere vocantes.
Quaelibet hinc geminis innectitur orbita nodis,
Quos pene immotos Phoebus prospectat, et oras
Disjunctas longe, ac contraria signa notantes.
Nobis pro vario positu Telluris ad ignem 620
Titanis medium variis quoque cursibus errant,

dam Cometarum nodi quidam; tum in motu annuo facto circa ipsum is e Tellure visus apparebit delatus per totum circulum coelestis eclipticae: et bini nodi ad eundem planetam pertinentes apparebunt jam coeuntes, jam admodum a se invicem remoti. Superiorum planetarum nodi non possunt spectari e Terra in eadem Coeli parte: sed possunt, immo singulis annis debent bis, nodi inferiorum, quando nimirum Terra sita est in ipsa nodorum recta: in iis cometis, quorum alter nodus distat a Sole minus, quam Terra, et alter magis, quando ipsa Terra est ex parte nodi propioris, nodus uterque apparet in eodem Coeli puncto; quando jacet ex parte remotioris, apparent in punctis oppositis.

Ex his facile est colligere, quid accidat respectu planetae visi e Terra illo ipso momento temporis, quo per nodum transit, ut illud, quod postremo loco hic dicitur, si Terra, planeta, et Sol jaceant tum in eadem recta, nodum debere spectari e Terra, et e Sole in eodem puncto Coeli, vel in opposito, prout is jacet citra Solem, nimirum inter ipsum, et Terram, vel ultra ipsum.

Haec omnia schematis adjectis facile illustrari possent; sed cum ad argumentum nostrum minus pertineant, satis erit illa indicasse.

Jamque simul coëunt adducti, jamque recedunt,
Semotisque procul respondent aetheris oris.
Ac Venus in primis, et qui talaria plantis
Innectit Maja genitus, fumantiaque astra, 625
Illa, quibus nodi a Phoebo tolluntur in altum
Non mage, Phoebeo quam Tellus distet ab igne,
Incertam objiciunt hinc suspectantibus, atque
Toto nodorum sedem circum undique Coelo
Errantem longe: medium proin finibus orbem 630
Diversis eadem aspicimus transcurrere, jamque hac,
Jamque illa Coeli, aut Boream regione rigentem,
Aut fugere imbriferis horrentem nubibus Austrum.
At rutilo si forte Deo conjuncta, tenacem
Dum superant nodum, tueamur, et aetheris unam 635
Percurrant oram pariter; spectatur eadem
Tum Phoebo, nobisque plaga, contraria nodus
Dirigit aut sese ad signa, ut procul avius ultra
Nectitur, aut citra Phoebae lampadis ignem.
Jam vero leges,[37] quas Phoebum obeuntia servant 640
Sydera, turma Jovis, tardique parentis easdem
Turma tenet, regemque suum comitata per auras
Stipat, et imparibus circumvolat undique gyris.
Ollis, nam Terrae cursum comitatur euntis
Ipsa etiam, stipatque latus, gyroque perenni 645
Circuit, adnumerant Phoeben quoque. Non tamen illam

37 Leges Keplerianas, quas observant planetae primarii respectu Solis, observant et secundarii respectu suorum primariorum, nimirum satellites Jovis, et Saturni.

Inter secundarios planetas numeratur etiam Luna, quae est ipsius Terrae comes, vel satelles: cum tamen ipsa sit pars maxima nostri argumenti, in quo agitur de ipsius, et Solis defectibus, oportet aliquanto diutius in ea immorari, et in-

Innuere

Innuere, atque brevi fas tantum attingere cantu.
Ipsa ciet Pindo Musas, vocat ipsa canentem
Ad sese, nostrae quae pars est maxima curae,
Jam Dea; et implexos ostentat ab aethere gyros 650
Ergo age, fige acies, cursumque tuere vocantis.
Principio [38] aeternis Terram dum motibus ambit
Fida comes, sese ad leges componit easdem,
Atque eadem servat Phoebe communia jura.
Scilicet aethereas paribus nec semper in oras 655
Consurgit spatiis, nec in aequo ducitur orbe:
Illum ipsum, cui nempe latus subsidit utrumque
Pressius, ac medio procurrit longior axis;
Orbem diva terit cursu, quem vasta columna
Exhibeat, ductu obliquo si forte secetur: 660
Hinc quondam in superas sese altior evehit oras;
Et vultu breviore coit: mox prona nitentem
Demittit Coelo currum, Terraeque propinquat,
Ac mage distenti pinguescit imagine vultus.
Nec paribus semper stimulis per inane morantes 665
Urget equos, semperque fuga contendit eadem.
Dum prono ad terras curru delabitur, acres
Sponte volant bijugi: ruit ipso pondere currus,
Acceleratque viam; dum contra acclivis in altum
Semita consurgit, nequidquam undantia collo 670
Lora quatit, longo nequidquam verbere fessos

nuere saltem praecipua capita ejus theoriae.

38 Primo quidem Lunae orbita est elliptica, ut caeterorum planetarum: hinc aliquando est remotior in apogeo, aliquando propior in perigeo: in illo casu apparet minor, in hoc major; et dum ascendit ad apogeum, minuitur ejus celeritas, dum descendit, augetur, gravitate, quam habet in Terram, in primo casu opposita ex parte aliqua directioni ejus

Exagitat, ſtimuliſque acuens, et vocibus urget.
Languefcunt magis atque magis, quaque orbita ſummo
Eminet alta jugo, ceſſant, curſumque morantur.
Scilicet hinc, terras cum ſe demiſit ad imas, 675
Concita praecipiti volat impete Cynthia, at alti
Lentior ingreditur ſublimi in vertice callis.
Sponte Deam ceſſare putes, qua purior aureas
Ventilat aura comas, propiorque affulget Olympus,
Dedignatam humiles ſedes, atque aëra craſſum. 680
Ipſe quidem curſu volat impare currus, at illum
Suſpiciens, magis uſque alto conſiſtere dorſo
Crediderіs, callemque magis properare per imum,
Nam fugiunt oculos ſpatia, et breviora tuenti
Adſtringunt ſeſe, quaecumque abducta recedunt, 685
Percellunt acrem contra, quae proxima, viſum,
Et craſſam ingenti diſtendunt augmine molem.

Quae [39] tamen in ſummo bijugos mora vertice tardat,
Emenſae non illa viae revolubile tempus
Producit nimium laxans; ter namque novenis 690

motus, et in ſecundo conſpirante cum eodem; unde fit, ut in apogeo ejus motus ſit lentiſſimus, in perigeo celerrimus, quod eſt diſcrimen phyſicum ejus celeritatis realis; ſed apparens celeritas variatur adhuc magis ex illuſione optica, qua nobis, quae propiora ſunt, apparent majora, etiamſi aequalia ſint. Ut Geometrarum ſermone utamur, dum celeritas motus realis in perigeo, et apogeo eſt in ratione reciproca diſtantiarum ſimplici, celeritas apparens eſt in eadem duplicata; at cum diameter realis ſit eadem in utroque caſu, diameter apparens eſt in ratione diſtantiarum reciproca ſimplici.

39 Totum coeleſtem circulum, quem Sol percurrit integro anno, Luna abſolvit diebus 27, horis 7, minutis 43, ſecundis 12. Exprimuntur hic dies integri, neglectis horis. Sed Aſtronomi conſiderant quatuor revolutiones Lunae. Prima eſt ea, quam diximus, et ſit reſpectu fixarum, ac appel-

Omnia

Omnia per gyrum radiantia signa diebus
Lustrat, et integro Coelum complectitur orbe
Diva soror, jamque a tergo velocior urget,
Ac lentum assequitur fratrem, jam deinde relinquit
Prograediens, variatque vices, mensesque novatos 695
Integrat, ac solidum alternans discriminat annum,
Interea ipse etiam Titan delatus Olympo
Progreditur, nec mense soror regressa novato
Immotum, Coeli, qua parte reliquerat, illa
Invenit; inde dies geminos impendit, et horas 700
Praeterea plures, dum se olli adjungere possit,
Ac progressa iterum Coelo procurrere aperto;
Quosque Deae cursus menses metitur, in illis
Invenies ter pene dies se evolvere denos,
Dimidius tibi nam deerit, quo tempore rursum 705
Conveniunt, Coeloque iterum spatiantur eodem.

latur *periodica;* secunda fit respectu apogei Lunaris, quod progreditur, et est dierum 27, hor. 13, min. 18, sec. 34, ac dicitur *anomalistica:* tertia fit respectu alterius e suis nodis, quorum uterque regreditur, et est dier. 27, hor. 5, min. 5, sec. 35. Eae omnes habent proxime 27 dies. Quarta est ea, quae fit respectu Solis, quae appellatur *synodica*, qua nimirum digressa a conjunctione cum Sole, ipsum interea progredientem assequitur: haec revolutio est dierum 29, hor. 12, min. 44, sec. 3, et haec est ea, quam vulgo dicimus lunationem, et per quam annum in menses dividebant olim Judaei, et nunc dividunt plures orientales populi. Ea revolutio hic exprimitur per dies 29 cum dimidio, omissis nimirum tantummodo minutis.

Hinc autem nova conjunctio, sive novum novilunium non fit in eadem Coeli plaga, in qua praecedens fuerat, sed in loco fere per integrum signum magis ad orientem sito, quo Sol e Terra spectatus interea progressus est, qui fere per singulos gradus progreditur singulis diebus. Quamobrem ubi hic dicitur *Coeloque iterum spatiantur eodem*, id non significat eodem, ac prius, sed eodem com-

Id

Id tamen [40] hoc Divae in motu super omnia mente
Excipe pervigili, ac memori sub pectore conde.
Scilicet obliquo rapidos per inane jugales
Ductu agitat flectens Phoebe quoque; proinde necesse est
Bis gyro in quovis fraternum permeet orbem, (710
Signiferamque viam: transversa hinc semita nodis
Nectitur in geminis, humili quorum alter ab Austro
Evehit in Boream, contra jubet alter in Austrum
Restitui, pronoque Deam descendere curru. 715
Quod si etiam flexum, [41] quo Divae semita calli
Fraterno inclinat sese, et quantum inde recedat,
Quaesieris, facili evolvens ratione docebo.
Octavae integri partem sibi postulat orbis
Ille quidem nonam, quam cruribus interceptam 720
Occupat, et spatio paullo majore patescit.

muni utrique; nam extra novilunia in diversis apparent Coeli punctis.

40 Maximè notandi sunt hic bini Lunae nodi; nam eclipses non fiunt, nisi Luna in novilunio, vel plenilunio sit proxima nodo alteri.

41 Erit nobis usui in theoria eclipsium evolvenda etiam inclinatio orbitae ad eclipticam, ubi angulus habetur graduum proxime 5. Angulum appello *flexum* et hic, et alibi cum veteribus, qui in sensu geometrico non solebant angulum nominare. Porro quinque gradus hic duplici ratione exprimuntur: primo quidem quod sint pars nona partis octavae totius circuli: nam pars octava circuli continentis gradus 360, sunt gradus 45, et horum pars nona sunt gradus 5; deinde quod sint partes quinque *orbis aetherei*, seu circuli coelestis, quarum partium integer circulus continet *ter decies bissenas*, nimirum 360 juxta adn. 13. Hoc spatio distat Luna ab ecliptica, quando est aequè remota ab utroque nodo: et eo quidem tempore est in maxima elongatione ab ipsa ecliptica, quae elongatio maxima aequatur ipsi inclinationi orbitae. Porro praeter 5 gradus habentur fere semper et minuta aliqua, variatur enim ea inclinatio a gradibus 5, ad gr. 5, min. 18. Idcirco

Atque

Atque ubi jam geminis aeque Latonia nodis
Abfuerit, fpatio paullo majore recedet
Sive alta ad Boream fraterno a tramite, ad Auftrum
Seu contra depreffa humilem, quam partibus orbis 725
Aetherei quinis, quarum omne volubile Coelum
Biffenas decies ter dorfo amplectitur alto.

Atque [42] hoc Tellurem Dea curfu, hoc circuit orbe,
Alternatque vices, jamque hinc, jamque inde recedit.
Interea et motum quo Tellus acta per auras 730
Ingreditur, fi nempe aftris errantibus illam
Annumerare juvet, liquidumque per aethera vectam
Abripere, et circa medium traducere Solem,
Ipfa etiam hunc motum cafus comitata per omnes
Servat, cumque fuo componit Cynthia motu. 735
At fugit hic oculos, Terrae qui curfus, et almae

eft dictum *fpatio paullo majore patefcit*, et *fpatio paullo majore recedet*.

42 Eodem tempore, quo Luna habet hunc motum circa Terram, fimul cum ipfa Terra translata debet transferri itidem motu communi circa Solem, fed is communis motus a nobis non percipitur. Revera autem in Newtoni theoria non eft ipfa Terra, quae defcribit ellipfim circa Solem, fed centrum commune gravitatis Lunae, ac Terrae: quin immo nec ea eft accurata ellipfis, quod id centrum defcribit, nec circa Solem immotum defcribitur ea orbita, fed movetur Sol ipfe interea circa centrum commune gravitatis omnium trium. Immo vero ne id quidem centrum commune quiefcit, fed aliud, quod eft commune planetis omnibus, et cometis. Verum ea omnia funt altioris indaginis, nec huc pertinent, ubi hofce motus exprimimus non penitus accuratè, ut Aftronomi folent, fed proxime, uti decet Poëtam; adhuc tamen aliquanto accuratius, quam communes Poëtae foleant.

Porro ejus motus apparens fit femper in orientem, fine ftationibus, et retrogradationibus, quas habent quandoque cometae, et planetae.

Communis

Communis comiti aethereas utramque per oras,
Nosque rapit pariter; sensumque ille unus, et acrem
Impellit mentem, terras quo circuit, orbis.

Utque olim plenis dantem cava lintea ventis, 740
Et media quisquam navi si forte sedentem
Circum obeat; quamvis celeri tumida aequora prora
Proscindat ratis, et spumas ruat aere recurvo;
Ille tuos, quamquam usque celer, comitisque, tuusque
Communis cursus sensus eludet, et unum 745
Quo te ambit, fas obtutu deprendere motum,
Jamque tibi celsam puppim leget: ad latus idem
Jam deflectet iter: proram tum deinde subibit;
Alterius lateris dum per vestigia puppim
Rursum adeat, rursum et motu flectatur eodem. 750

Sic et communis Phoebaeque, tibique tuentem
Eludit motus, semperque incedit in ortum
Diva tibi, ac rutilum hirsuti jam velleris aurum,
Jam Cancrum ferventem aestu, Lancesque revinctas,
Jam petit aeterno torpentem frigore Caprum. 755
Nec bijugos usquam interea, currumque volantem,
Errantes imitata ignes, fumantiaque astra,
Aut cohibet sistens, aut in contraria flectit.
Respiciunt [43] ipsi penitus contraria signa

[43] Bini nodi lunares visi e Terra jacent ad partes Coeli oppositas e diametro, cum nimirum planum orbitae lunaris transeat per Terram ipsam. Hinc, et ex iis, quae superius sunt dicta, facile colligitur id, quod hic enunciatur, et quod erit usui infra, ubi ad eclipses ipsas deventum fuerit; nimirum si una quaedam conjunctio Lunae cum Sole facta fuerit in aliquo nodo, in quo ea fuerit simul cum Sole in ecliptica; non posse iterum conjungi cum Sole in nodo, seu potius prope nodum, nisi in septima Lunatione, incipiendo numerationem ab illa prima. Nam secunda conjunctio fit in Coeli

Nectantes

Nectentes callem nodi, nec Diva per orbem 760
Signiferum, mediamque viam cum fratre nitenti
Acta semel, rursum in nodo conjungitur ante,
Septima in adversis quam surgant cornua signis.
Non tamen 44 et nodis penitus per mutua nexis
Se Gemini adstringunt calles fratrisque, sororisque, 765
Immotique manent nexus, et semper easdem
Respiciunt oras, eademque ardentia signa.
Excurrunt faciles Coelo, ambiguisque feruntur
Motibus, et Phoeben quondam, Phoebumque sequuntur
Progressi astrifero calle, ac nituntur in ortum, 770
Occiduas, quondam, et magè longo tempore in oras
Retracti contra referuntur, et aethera totum
Perlustrant motu trepido, ac loca prisca revisunt,
Primus ter senis dum evolvitur annus ab annis.
Hinc ubi fraternum transgressa est Cynthia callem 775
Progrediens, nodo rursum se Diva relicto
Restituit, Phoebique viam transcurrit eadem
Parte prius, plenum quam cursu absolverit orbem.
Sic et, qui medium per callem ducitur axis
Longior, atque Deam seu vertice tardat in alto, 780
Ima humilis celerat contra seu marginis ora
Allapsam, trepidis agitatur motibus, atque

puncto remoto ab illo priore circiter per unum signum, tertia per alterum, et ita porro; ut idcirco septima fiat in loco remoto a loco primae fere per 6 signa, sive per semicirculum, ubi occurrit nodus oppositus.

44 Innuuntur hic jam inaequalitates nonnullae motuum Lunae, qui sunt admodum perturbati potissimum extra novilunia, et plenilunia, quae ab Astronomis dicuntur syzygiae, nimirum in quadraturis, et in octantibus.

Nodi orbitae lunaris jam progrediuntur, jam regrediuntur; sed in singulis conversionibus magis regrediuntur ita, ut in fine singularum conversionum

Jam

Jam ſequitur Divae curſum, et procurrit in Eurum;
Jam Zephyri ad ſedes refluit, ſed vincitur ipſo
Procurſu reditus, longoque per aethera gyro 785
Memnonias vertex oras ſectatur, et orbem
Abſolvit claudens, nonus dum deſinit annus.
Unde tamen curſus dubii diſcrimina tanta,
Erroreſque Deae, trepiduſque per aethera motus?
Accipe, temporibus quae longum ignota vetuſtis 790
Dî dederunt tandem, et noſtri labor extudit aevi.
Principio 45 immenſum quidquid per inane natantis
Materiae varias compactum in corpora maſſas
Exhibuit primo Mundi naſcentis in ortu,

ſint aliquanto occidentaliores, et idcirco evagentur per totam eclipticam motu, qui reſpectu principii Arietis abſolvitur annis 18, dieb. 224, hor. 5. Id exprimitur per illud *primus ter ſenis dum evolvitur annus ab annis*, quod ſignificat abſolvi motum intra annum decimum nonum. Patet autem id, quod additur, Lunam ad eundem nodum redire ante, quam abſolvat integram periodum; occurrit enim nodo regredienti.

Linea omnium longiſſima in ellipſi, dicitur axis major, ſeu axis tranſverſus, et ejus extrema puncta, quorum alterum eſt apogeum, alterum perigeum, dicuntur apſides, illa quidem apſis ſumma, haec apſis ima; hinc ille axis dicitur linea apſidum. Haec linea motum itidem habet varium; jam enim progreditur in orientem, jam in occidentem redit; ſed hic e contrario in ſingulis converſionibus progreſſus eſt major regreſſu, et idcirco promoventur apſides, integram autem converſionem reſpectu principii Arietis abſolvunt annis 8, diebus 309, horis 8, min. 20. nimirum ſub finem anni noni, quod hic exprimitur.

45 Innuitur hic cauſa perturbationum Lunae, quae nimirum eſt gravitas generalis Newtoniana, quam appellant mutuam generalem attractionem, cujus hae ſunt leges: omnia puncta materiae in ſe mutuo tendunt; hic niſus, non eſt aliqua phyſica actio unius puncti in punctum diſtans, uti videtur exprimere vox *attractionis*, et ut hic, ad rem poëtico lepore aſpergendam, effertur, ſed vel eſt naturalis quaedam tendentia puncti in punctum,

Arcano

Arcano sese ducit per mutua nexu 795
Usque trahens,retrahensque,atque uno foedere quamvis
Pars vocat ad sese partem, atque adducere tentat.
Ast eadem dum se circum vis omnia fundit
Per spatia expandens, sensim languescit eundo,
Quoque magis vasto late distenditur orbe, 800
Hoc minus intenti pollet conamine nisus.
Hinc paribus circum spatiis vis aequa trahentis
Et positum, & sequitur mensuram materiaï:
Ducuntur propiora magis, distantia contra
Usque minus:dat juncta simul causa utraque nisum. 805

vel est libera lex Auctoris Naturae ita pro libito suo decernentis, quod recidit in systema causarum occasionalium.

Haec vis in majoribus distantiis est minor in ea ratione, quam dicunt reciprocam duplicatam distantiae, sive reciprocam quadrati distantiae; ut nimirum in dupla distantia sit bis duplo, sive quadruplo minor; in tripla ter triplo, sive noncuplo; in decupla decies decuplo, sive centuplo. Ut id exprimatur, concipitur hic ea vis tanquam virtus quaedam egressa e singulis particulis, et progrediens motu uniformi, quo casu eo minor debet esse ejus intensitas, quo per majorem sphaerae superficiem circumquaque diffunditur; superficies autem sphaerarum, uti Geometrae demonstrant, crescunt in illa ipsa ratione duplicata distantiae, vel ratione simplici quadrati distantiae. Id revera lumini accidit diffuso a puncto radiante, quod motu uniformi progreditur, et ob eam physicam rationem in ipso progressu debilitatur; hic autem adhibetur ut imago quaedam poëtica is progressus vis attractivae, sed ea imago est idonea ad veram proportionem exprimendam, qua ejusmodi vis in majoribus distantiis minuitur.

Hinc mensura ejusdem vis desumitur et a quantitate materiae, in quam tenditur, quae quantitas dicitur massa, et a distantia; ac habetur hujusmodi theorema generale: *vis attractiva Newtoniana est in ratione composita, ex directa massae attrahentis, et reciproca duplicata distantiae ab ipsa massa.*

Scilicet

Scilicet [46] hinc celsis e montibus horrida in ima
Saxa ruunt valles abrupta: hinc volvitur acri
Impete, et objectas alte ab radicibus imis
Convellit sylvas torrens; armentaque, et ipsos
Custodes campis, et diruta tecta furenti 810
Raptat agens fluctu, ac rivis turgentibus auctus
Praecipiti undarum se mole effundit in aequor.
Terraï namque in gremium, quae proxima Terrae,
Tracta cadunt, nec dissimili, quae proxima Lunae,
In Lunam gravitate ruunt, Martemque cruentum 815
Et rutilam Venerem, & Maja genitrice creatum,
Saturnique, Jovisque orbem, et quaecunque per auras
Astra meant, eadem circum compegit, et unam
Usque jubet retinere globi vis mutua formam.
Ergo idem [47] Terrarum orbem, fidumq; sequentis 820

46 Ex hac generali attractione deducitur gravitas terrestrium corporum in Terram, quae tamen corpora si essent in ea distantia a Luna, ut quadratum distantiae a Terra magis superaret quadratum distantiae a Luna, quam massa Terrae superat massam Lunae; caderent in Lunam, non in Terram. Sic pariter corpora planetis, qui hic enumerantur, et cometis proxima, in ipsa gravitant, et ex hac mutua generali vi petitur ratio figurae ad sensum sphaericae omnium planetarum.

47 Ab hac mutua gravitate proveniunt perturbationes omnes motuum Lunae. Si Terra, et Luna essent in Natura solae, moverentur in orbibus ellipticis circa commune gravitatis centrum immobile, et planum commune binarum orbitarum, ac linea apsidum quiescerent, et motus esset admodum regularis. Sed gravitas utriusque in Solem perturbat hosce motus: movetur hoc systema binorum corporum circa ipsum Solem; in quo motu, si Terra, et Luna urgerentur viribus aequalibus, et eandem directionem habentibus; eorum positio respectiva nihil omnino turbaretur; nam motus communis statum respectivum non turbat. Sed vires, quibus in Solem gravitant, nunquam simul et aequales sunt, et cum eadem directione. In noviluniis Luna posita inter Solem, et Terram

Lunaï

Lunaï fydus Phoebi radiantis ad ignem
Disjunctum procul, aft immenfa mole tumentem
Nifus agit, jamque hinc, jamque inde impulfibus urget
Affiduis, turbatque vias; nec viribus aequis
Pro vario ad Solem pofitu, nec tramite eodem, 825
Namque urget pulfans, Divamque errare vagantem
Et refluo cogit nodos trepidare meatu.
Si vis aequa foret, fi tramite pelleret uno
Telluris, Lunaeque globum; deduceret ambas
Et paribus fpatiis, et eafdem femper in oras, 830
Nec quidquam alternos pofitus turbaret, et orbem,
Quo circum aethereas hinc cernitur ire per oras
Cynthia, et affiduo terras circumdare gyro.
At varii ductus, et vis non aequa, recurvi
Et formam, et pofitum callis, curfumque per auras 835
Alternis mutat vicibus: jam 48 fcilicet orbem

eft propior Soli, quam ipfa Terra, et e contrario in pleniluniis remotior; hinc in iis cafibus directio virium eft eadem, fed vires ipfae funt inaequales: circa quadraturas diftantia eft eadem, fed directiones convergunt ad Solem, et idcirco diverfae funt: in reliquis locis omnibus et directiones diverfae funt, et diftantiae inaequales. Ea inaequalitas inducit perturbationes plurimas, quarum aliquae hic innuuntur. Ea omnia multo fufius pertractavit Stayus in eo fecundo volumine, cujus mentio eft facta in adnot. 29, ubi ego etiam in adnotationibus, et fupplementis rem omnem evolvi pluribus; hic fatis eft eadem tantummodo innuere.

48 Orbis lunaris plures mutationes fubit: nam primo quidem magnitudinem mutat jam magis expanfus, jam magis contractus: tum mutat etiam formam, mutando illam, quam appellant Aftronomi eccentricitatem; qua crefcente refpectu axis tranfverfi, recedit magis a forma circuli; decrefcente vero eadem, accedit ad eam formam: praeterea mutat orbita et pofitionem fuam, cum axis moveatur, uti diximus in adn. fuperiore, atque id *vertigine trepida*, nimirum jam progrediendo, jam regrediendo, fed magis progrediendo. Cele-

Distendit longe laxans, jam contrahit; alto
Jam pandit gremio, et formae magis usque rotundae
Assimilat, pressum jam contra obliquat, et ima
Adducit latera, ac frontem producit utramque. 840
Quin etiam, qua se Eoas rutilantia in oras
Signa ferunt, frontes ipsas, mediumque revolvit
Convertens axem, ac trepida vertigine torquet:
Ipsum etiam Divae cursum jam concitat, et jam
Sistit equos, ipsum a medio jam abducit Olympo 845
Declinans inflexum orbem, jamque admovet, ipsos
Ire jubet, retro trepida vertigine nodos.
Scilicet hinc olim incertis ambagibus alto
Visa Polo aethereas sine lege errare per auras
Cynthia, divina magnus dum mente Britannus 850

ritas quoque Lunae mutatur ob eas vires perturbatrices, et a quadraturis ad syzygias perpetuo augetur, ab his ad quadraturas minuitur per easdem. Ipsum tempus periodicum majus est, quando Luna est in aphelio, quam quando est in perihelio: orbita inclinatur ad eclipticam jam magis, jam minus, et nodi jam progrediuntur, jam regrediuntur, sed magis regrediuntur, ut pariter diximus.

Haec indicata sunt tantummodo: sunt autem admodum multae inaequalitates singulae, et pendent a positione mutua Solis, Terrae, Lunae, lineae nodorum, ac lineae apsidum: Cleraucius in sua theoria Lunae proponit circiter 40 correctiones diversas ex theoria mutuae gravitatis deductas, et adhuc aliae minores supersunt plures, quae ad calculum non sunt reductae: alii alium proponunt numerum, sed apud omnes occurrunt admodum multae.

Haec tanta multitudo inaequalitatum id effecit, ut per observationes sine gravitatis theoria nullo modo potuerint ad certas leges reduci motus lunares, potissimum extra syzygias: Newtonus omnium primus rem cum aliquo successu per suam gravitatem generalem effecit: id praestatur, quaerendo motum trium corporum, quae in se mutuo gravitent vi decrescente in ratione reciproca duplicata distantiarum; et

Intima

Intima Naturae pervasit in abdita, et alto
Arcanas demum causas, secretaque jura
Extudit ingenio, ac Divûm deprendit amores,
Et Vestae, et Phoebes, et mutua vincula Phoebi,
Erroresque Deae, variosque per aethera motus, 855
Eruit arte nova evolvens, numerisque notavit.
Hactenus immensi lustravimus aetheris oras,
Astrorum et positus, variosque ex ordine motus
Diximus: unde jubar nunc accipe, quaeque remittant
Affusos radiorum imbres, ignemque receptum, 860
Conceptos gremio radios quae sydera fundant.
Haec etiam noscenda prius, si nosse latentes
Est animus rerum causas, Lunaeque labores,
Et subita Phoebi vultus ferrugine tinctos.

projiciantur utcumque: id appellatur problema trium corporum, quod ipsa ingenti sua difficultate celeberrimum est per haec tempora, et in eo resolvendo desudarunt, ac adhuc desudant primi hujus aevi Geometrae; nec ulla adhuc habetur accurata, et generalis solutio. Newtonus approximatione usus edidit elementa, ex quibus prodierunt tabulae, quae omnium primae ad veras positiones Lunae plurimum accesserunt, sed adhuc supererant identidem plura minuta discriminis. Approximationem provexerunt multo ulterius tabulis inde computatis, et editis, Clerautius, D'Alembertus, et Eulerus: et Clerautius quidem novam suarum editionem parat, in qua post correctiones nonnullas, quas adhibuit, omnino credit, errores nunquam ultra unum minutum progressuros, uti ex ipso accepi. Bradlejus quoque eandem exactitudinem invenit in aliis tabulis ex theoria computatis, et per observationes correctis.

Ubi omnes illae positiones horum trium corporum, et orbitae lunaris eodem deveniunt, inaequalitatum ordo idem regreditur, quod quidem non accuratè, sed proxime accidit post lunationes 223, post annos 18, et aliquot dies, quam periodum Hallejus idcirco coepit observare primus: de ea occurret sermo inferius in lib. II ad n. 70.

Porro mutuam attractionem Terrae, Lunae, et Solis ex-

Principio 49 certas quae sydera in aethere sedes 865
Fixa tenent, flammis fervent ardentibus, atque
Aeternos patulis effundunt faucibus ignes,
Omniaque immenso late loca lumine complent.
Cum tamen illa adeo vastas disjuncta per oras
Tollantur Coelo, atque humili à Tellure recedant, 870
Distracti languent radii, intentamque tuentûm
Vix aciem sera percellunt nocte per umbram.
Non ita Phoebeum languet jubar: ardet et ipse,
Ac pariter gremio Titan exaestuat imo,
Aetheraque, aëriasque auras, terrasque patentes 875
Irrorat radiis propioribus, atque fugata
Nocte diem curru victor deducit. Ab illo
Fonte petunt radios errantia sydera, Majae
Progenies, pulchri pulcherrima mater Amoris,
Sanguineus Mavors, et Jupiter, et procul alto 880
Postremum claudens agmen Saturnus Olympo,
Nocturnasque nitent aliena luce per umbras.
Illo etiam diri repetunt e fonte Cometae
Sanguineum jubar, ac Phoebeo lumine crines,
Phoeboeque trucem perfundunt lumine caudam, 885
Ni faciant, fuscis horrescant atra tenebris.
Nec non et curru qua Cynthia fulget in alto
Aurea, fraternis frontem, vultusque decoros

pressi per amorem mutuum Vestae, Phoebes, et Phoebi mythologia veteri usus de more: artem autem novam NeWtoni appellavi methodum infinitesimalem, uti ab ipso adhibetur, potissimum cum calculo directo, et inverso fluxionum ab illo invento, cum quo coincidit differentialis, et integralis calculus Leibnitianus; sed haec innuisse sit satis.

49 Certum jam est apud omnes astronomos, fixas, et Solem habere suum lumen proprium, planetas omnes, et cometas reflectere lumen a Sole acceptum.

Perfundit

Perfundit radiis, ac non ſua lumina vibrat,
Diſcutit et foedam fraterno munere noctem. 890
Ac veluti Tellus, quo Solis reſpicit ignes
Laeta nitet vultu, radioſque remittit in auras,
At non et manes lucem tranſmittere ad imos
Averſamque licet frontem: nox horrida vultum
Turpat ibi, atque intra nigrantia viſcera regnat. 895
Sic alii, ſic Phoebe etiam, qua parte nitenti
Objicitur fratri, fulget, lucemque remittit,
Altera luce caret facies, et corpus opacum eſt.
Nonne [50] vides, poſitos cum ſenſim menſe novato
Inſtaurat progreſſa ignes, ſummoque videndam 900
Margine vix prima noctis ſe prodit in umbra,
Nonne vides, Phoebo averſas ut cornua in oras
Flectat, et occiduas penitus ſinuetur ad undas?
Scilicet aethereas cum tam ſublimis in auras
Aſſurgat Titan, imis at proxima Terris 905
Accedat contra Phoebe, et ſub fratre feratur;
Ille Deam, ſuperas qua ſe hinc avertit in oras,
Aetheraque, et rutilae ſuſpectat lampadis ignes,
Irrorat radiis, ac multo lumine veſtit
Averſam à terris frontem, et ſupera alta tuentem: 910
Horror habet, denſaeque aliam, quam cernimus, umbrae.
Hinc oculos frons atra fugit, tenuique nitentem

50 Inde facile derivantur omnes tam variae phaſes Lunae. Sol multo altior ipſa Luna, uti diximus, et ab ipſa admodum remotus, illuminat dimidium circiter ejus ſuperficiei, quod idcirco eſt lucidum; alio dimidio obſcuro, niſi quatenus ipſa ejuſmodi obſcura pars circa novilunia illuſtratur tenui lumine e Terra reflexo, quod appellatur lumen ſecundarium Lunae. Ipſa autem Luna ſita in plenilunio ad partes Soli oppoſitas obvertit Terrae eam ipſam faciem lucidam; in novilunio, ſita Solem verſus, obvertit obſcuram; in reliquis

Margine vix limbum rutilae ſub imagine falcis
Conſpicimus, geminoſque apices, dorſumque recurvum.
Aſt ubi Memnonium rapidas deflexit ad orbem 915
Diva rotas, toto fratri contraria Coelo,
Tum vero illa eadem facies, quam luce coruſca
Irradiat Phoebus, Terras quoque deſpicit: inde
Plena nitet, fratremque refert, et diſcutit umbras;
Non quod clara magis mage denſo effulgeat igne, 920
Sed quia, qua clara eſt, terris ſpectatur ab imis.

Quis prior,[51] Uranie, rem tantam, hominumve, Deûmve
Protulerit, memorare libet: tu numine Vatem, (ve
Diva, tuo dubium firma; remque ordine pande:
Nôſti etenim. Primum vidiſſe Promethea fama eſt, 925
Pennigeris dum vectus equis curruque Minervae
Scanderet aethereas ſedes, haud tenvia Phoebo
Furta parans, vitalem ignem rapturus ab axe,
Vidiſſe, et ſeros olim docuiſſe nepotes.

poſitionibus partem obſcurae, et partem lucidae, a quo pendent omnia phaſium phaenomena. Quando pars lucida nobis obverſa eſt exigua, Luna apparet falcata, nimirum in principio et fine lunationis; actum falcis lucidae dorſum ſemper reſpicit ipſum Solem, cornibus directis ad plagam oppoſitam. Statim poſt novilunium, ſive initio lunationis, Luna eſt orientalior ipſo Sole, ac idcirco occidentem reſpicit convexitas ipſius falcis, cornibus orientem ſpectantibus: contrarium accidit in fine lunationis, cum Luna eſt occidentalior ipſo Sole. Hinc Italicum proverbium: *gobba a ponente, Luna creſcente; gobba a levante, Luna calante.*

51 Epiſodii loco hic deſcribitur iter Promethei in Coelum, novilunii tempore, cum phaenomenis, quae videre debuiſſet: Terra, quae nobis apparet plana, et immenſa, e propinquo ſpectantibus, debuiſſet paullatim apparere magis, ac magis rotunda, et exigua: ſi Mercurius, et Venus fuiſſent inter Terram, et Solem, ac extra planum eclipti-

Tempus

Tempus erat, totum quo Luna vagata per orbem
Deponit ſolitos tenuatis cornibus ignes. (930
Illa alto, comitante Deâ, ſublimis Olympo
Impoſitam denſis ſcindebat nubibus auram
Attonitus parteſque oculos vertebat in omnes.
Hinc maris immenſos tractus, terraſque patentes 935
Adſtringi ad latera, atque in parvum inflectier orbem;
Inde ſtupet Maja genitum, Veneremque ſuperbam
Signiferi certis egreſſos finibus orbis
Errare, ac vetito late diſcurrere Coelo:
Tum Phoebi jubar, et pulchros,(quis crederet?) atris 940
Sordentes maculis vultus, frontemque nigranti
Obductam fumo, et foedam caligine triſti
Aſſiduo ſeſe inſtabilem torquere rotatu,
Crinitoſque ignes, et formidata tyrannis
Aſtra procul, longos fundentia pectore fumos, 945
Huc ruere, et grandes circum exercere choreas.
Nil tamen uſque adeo ſtupidum percellit, et ambas

I

cae, Prometheo per id planum aſcendenti ad Solem debuiſſent apparere ſiti extra zodiacum longiſſime, eo magis recedentes ab ipſo zodiaco, quo ipſe magis ad eorum poſitionem accederet: debuiſſet et Solis maculas deprehendere, quae eo majores apparere debent, quo propius acceditur, ac obſcuram quandam velut caliginem, quae aliquando totum occupat Solis diſcum, et in qua intercapedines quaedam lucidiores obſervantur quandoque, quas plures Aſtronomi appellarunt faculas. Porro per ipſas maculas, et faculas deprehenditur etiam motus Solis circa proprium axem, de quo agendum nobis erit libro III. Poterat cometas etiam plures ſimul invenire, ut ſuperiore anno vidimus ſimul duos, ac notare curvaturam orbitae circa Solem, quae nimirum in perihelio citiſſime, et plurimum incurvatur; appellantur autem hic eorum motus *choreae longae* ob immanem orbitarum productionem.

Praeter haec phaenomena debuiſſet obſervare in aſcenſu omnem ſeriem phaſium Lunae, deprehendendo paullatim ſemper

Ad ſe acies rapit, atque obtutu figit in uno,
Ut ſubitus Phoebes fulgor, mutataque forma.
Ad laevam vultus converterat: aethere puro 950
Tum forte obliquos laeva de parte jugales
Nonnihil inflexo ducebat Cynthia curru.
Ecce, novo ceu prima ſolent conſurgere menſe,
Aſpicit adverſae ſurgentia cornua Lunae;
Dumque volat, Coelo et propior jam deſpicit ipſam 955
Paullatim coiïſſe ſtupet, plenoque nitentem,
Ore per aethereas radios diffundere ſedes.
Tum vero, quae monſtra, inquit, tam inſueta per Axem
Cernimus? Amiſſos ſubito queis viribus ignes
Collegit Phoebe, et pleno nitet aurea vultu? 960
Cui Dea: mirari jam deſine: nulla per Axem
Monſtra vides: ſolitos nec pridem amiſerat ignes,
Nec ſubito excitis effulget Cynthia flammis.
Illa quidem terras vultu cum ſemper eodem
Deſpiciat, Phoebum nunc hoc, nunc ſuſpicit illo 965
Ore procul, luſtrans totum ut circum undique Coelum
Fertur in Eoas Phoebo velocior oras.
Quamquam igitur fratris radiis pars altera ſemper
Objicitur, lumenque trahit, pars altera denſis
Obruitur tenebris, et caeca conditur umbra; 970
Ille tamen terras vultus qui deſpicit, idem
Nec tenebris ſqualet ſemper, nec lumina reddit.
Nunc caecam terris obvertit Cynthia frontem,

majorem partem hemiſphaerii Lunae illuſtrati, ut patet: ſed id quidem debuiſſet accidere paullatim Luna ad latus ſitâ, ſi enim aſcendiſſet rectâ Lunam verſus, vidiſſet ſemper faciem obſcuram; tum perquam exiguo tempore mutationes omnes ipſi accidiſſent, dum eam ſuperaret, tranſeundo aliqua ex parte ad latus.

Nos

Nos contra nitidam Coelo ſpectamus ab alto;
Aſt olim, terras vultu cum plena nitenti 975
Deſpiciet, caecos obvertet in aethera vultus.
Dixerat. Ille memor, ſummo regreſſus Olympo,
Attonito late, quae viderat, edidit Orbi;
Quem pater omnipotens non tantum ex aethere raptas
Iratus flammas, animataque corpora flammis, 980
Verum etiam ſecreta Deum vulgata per Orbem,
Caucaſeos intra montes, horrentiaque antra
Abdidit includens, ubi roſtro vultur adunco
Tunderet aeternum jecur, aſſiduiſque renatam
Morſibus appeteret, ſed non conſumeret eſcam. 985

Cum in Arcadia [52] *recitanti adeſſent Cardinales Ampliſſimi* Franciscus Landius, *ac* Joannes Franciscus Albanus, *poſt Syderum enumerationem haec adjecta ad verſum* 207.

SED quid ego aethereis ardentia ſydera campis
Perſequor, et ſylvas inter, pecorumque magiſtros
Tam longiqua cano, atque oculis tam proxima noſtris
Praetereo; Arcadicis geminum dum nuper in oris
Emicuit jubar, ac ſummi capita ardua montis, 5
Et ſacrum nemus, et campos, valleſque profundas

52 Arcadia dicitur celeberrima Academia Romae ad poëſim potiſſimum exercendam inſtituta circa initium hujuſce ſaeculi, quae ab ipſa prima origine plurimum ſtatim inclaruit. Extant autem jam multa ejus Academiae volumina typis impreſſa tam Italicae, quam Latinae poëſeos plena. Eſt autem ibi perpetua quaedam allegoria, qua nomen paſtorum Ar-

Colluſtrat

Colluſtrat late, ac radianti lumine complet?
Magnanimi Heroes, quos nobilitatis avitae
Grande decus, mentis vigor, et ſuper omnia mores
Ingenui, atque ardens evexit ad aethera virtus, 10
Sanctaque Relligio Coelo meliore locavit,
Nequidquam Latio ſaturatas murice veſtes
Agreſti tunica, atque humili mutaſtis amictu;
Nequidquam vittas, frontiſque inſigne decorum
Conditis; et famûlum turba fluitante relicta, 15
Soli inopem ſubiiſſe caſam, incultumque mapale
Dignati, et duro praerupta ſedilia ſaxo,
Paſtorum in medio conſiditis, agreſtemque
Excipitis cantum faciles, et ruſtica plectra.
Prodit divini majeſtas oris, et illud 20
Aeternum auguſtae frontis decus; ipſa oculorum
Iſta acies, totoque erumpens aurea vultu
Flamma vel invitos prodit, Coeloque receptos
Commonſtrat longe humanos tranſcendere fines.
Sic olim Admeti tauros, armentaque Phoebus 25
Depoſitis pavit radiis, lauroque virenti
Divinam obduxit frontem, villoſaque dorſo

cadiae accipiunt Academici, et campum, quem excolant; ac in ipſis poëmatis ſaepe ad id alluditur. Ipſe locus, in quo convenitur, appellatur Italicè *il boſco parraſio*; inſigne Academiae eſt ſiſtula, praeſes dicitur Cuſtos; tempora numerantur per Olympiades.

Partes plurimas hujuſce operis legi in conventibus, qui ſolent celebrari ſingulis hebdomadis Jovis die: patet autem aditus omnibus, ſed ſoli Academici a Praeſide rogati recitant, et potiſſimum carmina; ſolum enim initio ipſius conventus habetur aliquando oratio, ſeu diſſertatio aliqua ſoluta oratione conſcripta.

Cum aliquando exordium legerem in uno ex ejuſmodi conventibus, adfuerunt ii duo Cardinales ampliſſimi, qui ambo erant inter Academicos adſcripti, de quorum futuro adven-

Indu-

Indumenta tulit paſtor; ſed novit agreſtis
Turba Deum, nôrunt Satyri, Dryadeſque puellae,
Intonſaſque comas, tantoque os numine dignum 30
Mirati, pharetramque rudes, citharamque bubulci,
Dona Deo arboreis figebant ruſtica truncis.

Ergo agite, et noſtris jam nunc aſſueſcite votis,
Incolumen ſervate locum, ſervate perennem
Fontis aquam, ac virides praeſenti numine lauros 35
Aeterno nemori, et laetis date paſcua campis.

Tuque 53 prior, cui ſaepe Tybris, cui ſaepe canenti
Excipiens meritos geminavit Sequana plauſus,
Quem dudum queſta abſentem, nunc Roma receptum
Oſtentat populis gaudens, venturaque ſignat 40
Tempora, et aeterni jus irrevocabile fati
Pervolvens animo, deſcriptaque nomina luſtrans
Spem fovet, et tacito jam nunc ſub pectore geſtit
Tu quando Aonias etiam iſto in culmine Divas,
Magne, colis, digitiſque fides pulſare ſonoras 45
Pergis adhuc ſenior, vocemque in carmina flectis
Digna Deo, noſtros propiori numine coetus
Reſpice, et hanc tantis curam bonus adjice curis.

tu cum mane certior eſſem factus, ea adjeci, quae hic ſubjicio: rarius autem ad hebdomadarios hoſce conventus Cardinales adveniunt; ſed publici conventus aliquoties per annum, certo argumento propoſito, fiunt cum ingenti et purpuratorum Patrum, et Legatorum, ac primariae nobilitatis frequentia.

53 Cardinalis Landius tam Romae, quam Pariſiis, ubi aliquandiu eſt commoratus, poëſim excoluit ſumma cum laude, quorum ejus ſtudiorum et publica aliquot ſpecimina typis edita proſtant; ac licet tum quidem aetate provectior eſſet, et in ampliſſimum eum ordinem cooptatus, adhuc Muſas, et Muſarum cultores fovebat. Eum, abdicato paullo ante Beneventano Archiepiſcopatu, Roma cum ſumma omnium ordinum, litteratorum hominum in

Nam

Nam quid ego viridi vernantem flore juventae
Extimulem dictis comitem, 54 quem magnus ab alto 50
Frater avi primis sua per vestigia ab annis
Duxit agens, patriumque altis in montibus astrum
Designans digito, et supremi culmen honoris
Scandendum longos tandem post Nestoris annos
Ingenuas animum docuit formare per artes, 55
Virtutemque sequi? Se nostros auspice coetus
Ille monet natos olim, se Principe in arvis
Crevisse Arcadiam Latiis, famaque perenni
Exortu à primo terras viguisse per omnes.

Illa igitur quid non ad carmina pronior aetas, 60
Acre quid integro ingenium non spondeat aevo?
Quid monita, o comites, quid tanta exempla secutus
Abnuat? Oh nostrae felicia stamina vitae
Producant Parcae, atque illos servemur in annos,
Arcadicis tam laeta ferent qui tempora terris! 65
Nam Lupus inter oves fontem properabit ad unum
Mitis, et insontes per florea rura colubri

primis, gratulatione recuperaverat. Hic ipsi summum Pontificatum augurabar de more, cum ei proximus crederetur. Benedicto quarto decimo decumbente ex eo morbo, ex quo is tum quidem brevi moriturus credebatur, nec vero unquam satis convaluit, cum plurimus esset de Landio successore sermo per totam Urbem, fato praereptus est ante ipsum Pontificis obitum.

54 Jo. Franciscus Albanus Clementi XI. P. M. avi sui fratri egregiis naturae donis sane non impar, in ipso primo juventutis flore in amplissimum Purpuratorum Patrum senatum adlectus, quam non immature eum honorem adeptus sit, satis constat ex Oratione Latina P. Nicolai Galeotti publici eo tempore Professoris eloquentiae in nostro Romano Collegio, cui Orationi est titulus *De juventute honoribus tempestiva*. Ac ex quidem tam celeri in eum ordinem cooptatione nobilissimus juvenis avi fratrem imitatus, qui annum agens 52 ad summum supremae dignitatis api-

Torquebunt

Torquebunt agiles ſpiras: nova gramina campis
Effundent tepidi zephyro adſpirante Decembres:
Lacte fluent rivi, ſudabunt roſcida quercus 70
Mella, atque effuſo ſolventur nectare nubes.
Quin etiam, nullo nervos pulſante canoros,
Mulcebunt auras citharae, ſuſpenſaque trunco
Fiſtula facundum dulcis modulamen avenae
Sponte dabit, laurique ſacrae jam fronde loquaci 75
Carmina, et illabens pro muto lympha ſuſurro
Carmina docta dabit, reſonabunt carmina colles,
Et cedent noſtris Saturnia tempora ſaeclis.

cem, tanto maturius, quam fieri ſoleat, evectus eſt, pari futurae dignitati, quam ei hic itidem auguratus ſum, quodammodo velut proluſit. Sed adjeci longos poſt Neſtoris annos, ut et Benedicto XIV. longioris vitae tempus, et Landio diuturnus ante Pontificatus relinqueretur.

Gentilitium Albanorum ſtemma continet ſtellam tribus montibus imminentem, quam etiam multis in locis et domi, et per Urbem, triplici corona contectam Clemens ipſe XI. commonſtrat quodammodo, validiſſimum ad virtutes omnes incitamentum.

Idem vero ſummus Pontifex inter primos Arcades paullo poſt ejus Academiae inſtitutionem admiſſus; eam tum quidem fovit, atque haud ita multo poſt, ſupremam dignitatem adeptus, ad hunc tantum ſplendorem adduxit.

FINIS LIBRI I.

DE

DE
SOLIS AC LVNAE
DEFECTIBVS.
LIBER II.

AERIAM quisquis molem, atque ingentia tecta
Extruit, educens Coelo, primum ardua sylvis
Robora, frondentesque ornos, teretesque cupressos
Dejicit, ac densis montes quatit ictibus altos,
Marmoreasque sinu moles educit, et igne 5
Aera liquat, rigidumque argenti pondus, et auri,
Ac lateres, calcemque vehit; tum condit opaco
Fundamenta solo, muros ad nubila tollit,
Auratasque trabes locat, immanesque columnas,
Signaque spirantes Divûm referentia vultus, 10
Ac summum aurato concludit culmine tectum.
Sic ego [1] velati nigrantem lampada Solis,
Atque laborantem dicturus carmine Lunam,
Materiem satis aptam operi, tantoque labori
Congessi primum, teque astra per ardua vexi, 15
Nominaque, et positus, variosque per aethera motus

[1] Innuuntur hic ea, quae ex primo Libro futura sunt majori usui: Solis admodum remoti motus annuus in orientem per eclipticam, et lumen proprium: motus Lunae multo propioris itidem in orientem, sed per orbitam obliquam, et celerior, ac uno tantummodo ejus hemisphaerio illuminato a So-

Evolvit

Evolvi enumerans: terris procul altus ab imis.
Signiferum medio Titan ut calle per orbem
Tendat, et eoas curſu nitatur in oras,
Perluſtrans totum biſſenis menſibus Axem: 20
Interea medio conceptas pectore flammas
Evomat, aethereaſque ardenti lumine ſedes,
Aëraque irroret craſſum, terraſque patentes:
Ut parili curſu ſe Diva triformis in Eurum,
Obliquo ſed calle, ferat, ſed proxima terris, 25
Perque dies novies ternos velocior orbem
Integret, et Coelo rurſum ſe reddat eodem:
Fraternum interea curru diffundat ab alto
Illa fronte jubar, Phoebum qua ſuſpicit, atque
Averſo vultu, et gremio nigreſcat opaco: 30
Scilicet inde novo nova ſurgere cornua menſe,
Cum fratrem tranſgreſſa recens, jam deſerit; at cum
Oppoſita contra bijugos agit aetheris ora,
Nocturnas pleno vultu rutilare per umbras:
Tum geminos geminis calles ſe innectere nodis, 35
Queis Dea bis medium Phoebi pertranſeat orbem:
His animadverſis, age jam, cauſaſque latentes
Contemplare vigil mecum, reſque ordine diſce:
Ac primum, ſudo quondam cur Phoebus Olympo
Deficiat, triſtique tegat ferrugine vultum, 40
Accipe; nam coeptis praeſens aſpirat Apollo,
Et faciles ultro veniunt ad carmina Muſae.
Principio [2] ſubitis Titan dum mergitur umbris,

le, cum phaſibus inde deductis: nodi demum orbitae lunaris eclipticam ſecantis in binis punctis, per quae Luna in ſingulis converſionibus tranſeat bis.

[2] Primo loco proponitur, Solem, etiam cum totus deficit, revera non amittere ſuum lumen, ſed lucem, ut prius, emittere.

Et

Et nitidos puro vultus obducit Olympo,
Haud ille ardentes imo sub pectore flammas 45
Restinguit, cohibetve emissos faucibus ignes.
Ardet inextinctus, radiosque emittere pergit,
Et solito rutilas nisu vibrare sagittas,
Omniaque immenso circum loca lumine complet.

Ac tibi [3] ne dubiam teneat sententia mentem, 50
Perlege, si tenebris Titan fors totus obortis
Deficiat, rutilosque atra ferrugine vultus
Condat, ab externis venient quae nuncia terris;
Nam veniunt, et quae regione geruntur in una,
Impressis vulgata notis narrantur ubique. 55
Invenies dextra populos, laevaque jacentes
Vidisse aut penitus totam, aut in margine summo
Phoebeam assueto fulgentem lumine frontem
Ingenitum vibrare jubar: loca proxima limbum
Aspiciunt tenuem radios effundere, et alto 60
Curvari dorso, falcemque imitarier, atque
Surgentis primo Phoebes nova cornua mense.
Quae disjuncta magis, majorem e fronte nitenti
Suspectant partem, pleno. postrema fruuntur
Lumine, et intactae fulgent in luce diei. 65

3 Primum ejus rei argumentum: cum Sol deficit in uno Terrae loco totus, in locis proximis apparet falcatus eodem momento temporis; et quo remotiora sunt loca, eo minor ejus pars deficit ita, ut in locis satis remotis totus appareat lucidus de more: facile est ex astronomicis principiis demonstrare illud, nunquam posse in toto hemisphaerio Terrae simul apparere eclipsim Solis, ne partialem quidem; sed hic provocatur ad observationem, et quidem ad ipsa nova publica, in quibus saepe imprimitur id etiam, quod ad ejusmodi phaenomena pertinet, ex quibus idcirco potest rei veritas innotescere.

Eois

Eois 4 rutilum Titan caput altus ab undis
Extulerat dudum, ac medium properabat ad orbem,
Cum fubito prima obductum nigrefcere fronte,
Tum condi magis, atque magis, penitufque tenebris
Involvi demum, et caeca latitare fub umbra, 70
Haud ignara, tamen mirata Britannia, luftri
Tertius octavi jam volvitur annus ab illo
Tempore: nigranti foedaverat omnia velo
Lurida nox: pallens aftris radiantibus aether
Ardebat latè: attonitae pecudefque, feraeque 75
Urgebant celeres ad nota cubilia greffus,
Ad fylvas pennata cohors properabat opacas,
Captura affuetos alieno tempore fomnos.

At partem rutilae frontis videre corufcum
Vibrantem jubar, extremi qui margine regni, 80
Hinc, atque inde jacent populi; quafque alluit aureo
Amne Tagus gentes, quas et Rhodanufve, Tibrifve,
Quaeque tenent gelidas boreali frigore terras,
Gaudebant multo perfufae lumine: arenas
Qui Libycas procul, aeternis ac torrida flammis 85
Regna colunt, pleno ore Deum videre nitentem,
Igneaque affueto vibrantem fpicula nifu.
Ufque adeo illaefo Titan fervefcit ab igne

4 Affertur in eam rem exemplum eclipfis Solis anni 1715, quae fuit totalis in Anglia die 3 menfis Maii. Haec fcribebantur anno 1752 magis adulto, adeoque jam coeperat annus trigefimus octavus, nimirum tertius Luftri octavi. Porro id phaenomenum admodum rarum cultiores etiam populos, et rem ipfam expectantes in admirationem rapit, cum nox intempeftiva diem interrumpat, et reducat fydera, ac brutis animantibus imponat, quae veram noctem adveniffe arbitrantur, cujus rei plura paffim exempla proftant apud hiftoricos, et in academiarum monumentis.

Tum quoque, et intactum diffundit ab aethere lumen.
Sed [5] quid opus longinqua sequi, famamque volantem
Sectari, et terris exquirere visa remotis? (90
Tolle acies, ac dum Phoebus latet, aetheris ignes
Suspice, et obscuro late rutilantia Coelo
Sydera. Percellent acres errantia saepe
Astra oculos, tardum Saturni sydus, et igne 95
Felici gnatus, dirique immite Gradivi
Astrum atrox, et pulchra Venus, quique aethere in imo
Mane novo fulgere solet, seu vespere sero,
Progenies Majae, Divûmque interpres, et alta
Se Coeli haud unquam radiantem ostendit ab arce, 100
Velatus medio latitet nisi Phoebus Olympo.
Olim etiam nondum visos ardere cometas
Aspicies, densosque effundere pectore fumos,
Et caudam trahere, aut longam promittere barbam,
Pallentesve comas vastum componere in orbem. 105
Ast ea, nôsti equidem, nullas sub pectore flammas
Astra fovent, nullos emittunt faucibus ignes.
Accipiunt, redduntque jubar, quod Phoebus ab alto
Effundit curru, perque aethera spargit apertum.
Ipse ergo aeternis illo quoque tempore flammis 110
Aestuat, ardentesque jacit per inane sagittas,
Et superas Titan radiis fulgentibus auras
Imbuit, illaesumque jubar diffundit ab alto;

[5] Secundum rei ejusdem argumentum: cum Sol deficit etiam totus, apparent planetae omnes, qui sunt supra horizontem, et aliquando cometa etiam, qui Soli proximus, et ejus luce obrutus delitescebat, tum primum detectus est. Jam vero omnes Planetae, et Cometae fulgent Luce Solis, uti vidimus in adn. 49, lib. I. Igitur Sol pergit tum etiam illos illustrare, adeoque retinet lucem suam; et idcirco debet aliquid interjectum praeripere nobis ipsius aspectum.

Ac

Ac tibi si latitat, puroque nigrescit Olympo,
Est aliquid medium, quod sese opponat, et umbram
Corpore nigrantem longe protendat opaco, (115
Atque alios tenebris populos involvat, et alma
Luce alios, tenuesque auras, errantiaque astra
Posse frui, plenoque sinat perfundier igne. (120
Non secus ac multa procerum comitante caterva
Per medias si forte vias insignis in ostro
Ingreditur Princeps, dum fervet in aethere Phoebus,
Ardentes olli aurato suspensa bacillo
Purpura defendit radios, Solemque recondit:
Ad circumfusam non pertinet umbra coronam. 125
Quis [6] tamen, Aonides, quis tantum immanibus ausis
Tollitur, et rutilae vitales lampadis ignes
Praeripit heu! miseris mortalibus, atque nitentes
Confundit caeca involvens caligine Terras?
Principio ne fixa alte, aut errantia credas 130
Sydera posse Dei nitidos obducere vultus.
Fixa [7] procul vastas distant disjuncta per oras,
Et rutilant splendore pari, nosque inter, et ignem
Phoebeum subeunt nunquam, ac si forte subirent,
Haud fusco ardentem celarent lampada velo. 135
Luce quidem [8] Phoebi fulgent errantia, dium

6 Transitur hic ad quaerendum istud aliquid, quod Solem tegit, et ante, quam deveniatur ad Lunam, quae id praestet, excluduntur omnia alia coelestia corpora, ac primo quidem excluduntur fixae, et planetae.

7 Fixas excludit distantia illa ingens, de qua lib. I. num. 6, et quod Lumen habent proprium juxta eumdem numerum, nam ob distantiam interponi non possunt, et cum habeant lumen suum, si forte interponerentur, non deficeret lumen in parte Solis obtecta, supplente earum lumine vices luminis solaris.

8 Planetae nec suum habent

Suspectant qua fronte jubar, gremioque sub imo,
Aversoque horrent penitus nigrantia dorso.
Nec vero aethereum usque adeo tolluntur in Axem
Ardua, sed tenues errant propiora per auras: 140
At senior pater, et natus regnator Olympi,
Quique ciet rabidas in mutua funera gentes,
Sanguineus Mavors, Terras, Titanis et ignem
Circumeunt gyro immani, nec proinde subire,
Ac dorsum rutilae possunt praetendere fronti. 145
Inferiora tenent Maja satus, et Venus alma;
Proin subeunt sæpe, et nexis loca proxima nodis
Si teneant simul, ardentem tum lampada fusco
Praetexant velo; at primum sub margine Eoo
Irrumpant, limbumque cavent, frontemque nitentem
Occidua demum fugientes parte relinquant: 150

lumen, nec ita distant, quas ob caussas videntur esse apti ad id præstandum. At Saturnus, Jupiter, et Mars, juxta num. 21, lib. I. orbita sua amplectuntur ipsam Terram, adeoque non possunt interponi inter Solem, et Terram.

Venus, et Mercurius, planetae inferiores juxta num. 11. lib. I. possunt subire inter Solem, et Terram, et subeunt saepe, nimirum in singulis conjunctionibus inferioribus, in quibus citra Solem jacent: saepe quidem, nam in Venere id accidit post menses circiter 19. et in Mercurio post menses circiter quatuor. Si eo tempore sint ii planetae proximi nodis, debent itidem apparere in ipso Sole; nam ubi sunt remotiores aliquanto a nodis, distant a plano eclipticae, adeoque respondent puncto Coeli distanti ab ecliptica ipsa, in qua est Sol, et recta ducta e Terra per ipsos evitat Solem.

Possunt igitur tum apparere in Sole; sed plures sunt rationes, ob quas non possunt ipsis tribui eclipses illae vulgo cognitae, de quibus hic agimus: duae hic proferuntur: primo quidem, quod si hi planetae transeant sub disco Solis, debeant ingredi ex parte ejus orientali, et egredi ex occidentali, dum umbra in eclipsibus Solis e contrario incipit ex occidentali, et desinit in orientali; secundo, quod ipsorum

Non

Non ita, quae vultus, dum Titan deficit, umbra
Occulit ardentes fenfim, involvitque tenebris.
Illa quidem occidua contra de parte nitentem
Obducit primum frontem, ac difcedit, Eous 155
Memnonias Phoebi margo qua profpicit oras.
Praeterea vel fe Maja genitrice creatus
Nos, Phoebumque inter, vel pulchri Mater Amoris
Opponat mediam, fpecies quid tantula demum
Occupet, et vafta Phoebi de mole recondat? 160
Mercurius fronte e rutila minus occulit abdens,
Quam fi vicenis rurfum de partibus unam
Particulas in mille feces: Venus amplior, atque
Telluri propior plus occupat, at radiantis
Mille aequis condit vix unam e partibus orbis. 165
Non ergo et tenebras inducere fulgida, fed vix

apparens difcus eft perquam exiguus refpectu difci Solaris, cujus idcirco non poteft occulere nifi particulam perquam exiguam, nimirum Mercurius minus, quam unam e vicies mille ejus partibus, Venus paullo plus, quam unam millefimam.

Primum ex hifce duobus patet, quia juxta num. 29, lib. I. Planetae inferiores moventur celerius, quam Terra; quamobrem ipforum motus fpectanti e Terra apparebit factus in eadem directione, in qua revera fit, quae directio apparebit contraria illi, quae apparet fpectanti e Sole; uti fi duo homines fpectent motum, qui fiat inter ipfos, is refpectu alterius fiet ad dexteram, et refpectu alterius ad finiftram. At is motus refpectu Solis fit in orientem, juxta num. 27, lib. I. igitur fpectanti e Terra debet fieri in occidentem: nimirum ii planetae tum funt retrogadi refpectu Terrae. Solis autem motus propius fpectanti e Terra fit in orientem; igitur ubi occurrat planeta inferior Soli, debet incurrere in ejus limbum orientalem, et egredi ex occidentali. Oppofitum autem accidere in eclipfibus Solis, de quibus hic agimus, patet ex obfervatione.

Secundum colligitur facile ex diametris apparentibus. Diameter apparens Solis fuperat 30 minuta, diameter apparens Veneris in conjunctione invenitur

Ora Dei possunt tenui distinguere naevo.
Vidi equidem ardenti Solis sub imagine Maja
Progenitum [9], neque enim adrepit tam rarus, acutos
Lusisset tamen ille oculos, nisi vitrea longis 170
Altera Lens inserta tubis, atque altera, pandens
Ingenti exilem protenderet augmine formam.
At Venerem [10] bini e cunctis mortalibus olim
Viderunt Phoebi sub frontem irrepere; ab illo
Ter septem lustra, et ferme bis quattuor anni 175
Tempore jam fluxere, ac mersit in aequore currum
Sol prius, atra Venus nitidum quam linqueret orbem,
Viderunt soli; longos nam Diva per annos
Juncta Deo a nodis distat procul, altaque currum
Erigit in Boream, vel prona inclinat ad Austrum. 180
Illa olim octonis bis sese interserit annis

proxime unius minuti, diameter apparens Mercurii proxime est quinta minuti pars. Quare diameter apparens Solis est ad diametrum apparentem Veneris in ratione majore; quam 30 ad 1, et ad diametrum Mercurii circiter ut 150 ad 1. Disci autem apparentes sunt, ut quadrata diametrorum apparentium, et quadratum 30 est 900, ac quadratum 150 est 22500, quorum primum est paullo minus, quam mille; et secundum aliquanto plus, quam viginti millia; adeoque discus Veneris teget paullo plus, quam millesimam disci Solaris partem, et discus Mercurii non teget unam e viginti millibus partium. Quoniam autem tam Veneris, quam Mercurii discus in Sole est exigua quaedam nigricans, et rotunda macula, idcirco eam appellavi naevum.

9 Mercurius non tam raro ita sub Sole transit, ut in ejus disco apparere debeat. Id enim intra hoc saeculum habetur vicibus sexdecim; plures autem ejusmodi transitus observavi ego ipse, sed eos non nisi per telescopia videre licet ob exiguitatem disci apparentis, qui tantulam solaris disci partem occupat.

10 Rarissimum est phaenomenum Veneris sub Sole; id toto hoc millenario accidit vicibus tantummodo 13, ad alterum e nodis mense Decembri annorum 1161, 1396, 1631, 1639,

Praetexens

Praetexens Phoebi frontem, tum tempore longo
Effugit, atque ubi jam plus saeclo effluxerit, orbi
Vix iterum ardenti supponitur, adversumque
Transcurrit nodum, Solis dum jungitur igni. 185
Hinc post quam primo inventum per vitra, tubosque
Sydera scrutari, ac terris adducere Olympum,
Diva semel tantum ante annos bis quattuor, ora
Inficiens tenui Titania laeserat umbra.
Haud etenim vitreis deducere lentibus astra, 190
Et teretes tractare tubos annosa vetustas
Edocuit mortale genus: vix tempore ab illo,
Quo primum armatam vitris ad sydera molem
Extulit Hetruscis heros prognatus in oris,
Bis tersептenos, centum numeramus et annos. 195
At prius, Uranie tantum mortalibus aegris

1874; ad alterum mense Junio annorum 1048, 1283, 1291, 1518, 1526, 1761, 1769, 1996; rarius quidem ad priorem nodum, quia tum Terra, sita in perihelio, est propior Veneri, cum Sole conjunctae, quae idcirco minore indiget ibidem distantia a nodo, ut e Tellure visa in Solem incurrat.

Semel autem huc usque id phaenomenum est observatum a binis tantummodo Mortalibus hic in Anglia, Horoccio, et ejus amico Crabtrio, nimirum anno 1639, die quae ipsis stylo vetere usis erat 24 Novembris, sed juxta receptam jam etiam hic in Anglia Romanam Calendarii correctionem, erat 4 Decembris. Et Crabtrius quidem adverso usus Coelo vix ipsam in Sole Venerem aspexit, fere sine ullo fructu; Horoccius autem puriore aëre diutius aliquanto eandem est contemplatus, verum brevi et ipse tempore, nimirum per semihoram, determinatis tribus tantummodo, et admodum proximis positionibus Veneris in Sole, cum Solis occasus brevi consecutus observationem abruperit.

Sine telescopiis ne Venus quidem in Sole observari potest ob exiguitatem diametri apparentis, de qua supra num. 8. Porro ex quo telescopia inventa sunt, id phaenomenum huc usque bis contigit, annis nimirum 1631, et 1639. Nam telescopia inventa sunt, et a Ga-

Quam munus daret, et terris adduceret astra,
Fugerat aspectus oculis impervia nostris,
Ora Venus nigro praetexens aurea dorso.
Cum primum rutila potuit sub fronte videri, 200
Nemo tubum in Solem direxerat: altera cum se
Spectandae Divae sors obtulit, unus, et alter
Vix hominum numero e tanto direxit, et orbe
Sordentem Veneris Phoebum suspexit opaco.
Nec dum etenim Uranie, minus illo tempore culta, 205
Arcanos Divae positus patefecerat, atque

lileo in Coelum directa circa annum 1610, quem annum expressi per illud: *vix tempore ab illo Bis ter septenos, centum numeramus et annos* (nimirum 142, cum 2 x 3 x 7 sint 42;) nam hos ego versus conscripsi anno 1752 mense Octobri.

De iis quae pertinent ad hosce transitus Veneris sub Sole, plurima quidem dici possent scitu dignissima; sed ego hic proponam tantummodo nonnulla magis necessaria, et quae facilius possint intelligi Conjunctiones inferiores Veneris cum Sole, sive occursus Veneris, ac Terrae in eadem Coeli plaga respectu Solis, sunt admodum frequentes; habentur enim quinquies intervallo annorum octo, quo Terra absolvit octo conversiones circa Solem, et Venus parum admodum plus, quam tredecim. At ad hoc, ut Venus appareat in ipso Sole, requiritur, ut aliquis ex hisce occursibus fiat prope nodum orbitae Veneris; nam si is fiat in distantia aliquanto majore a nodo, debebit Venus ibi ita distare ab Ecliptica, in qua Sol e Terra cernitur, vel in Boream, vel in Austrum, (quam distantiam ab ecliptica appellant Astronomi latitudinem Borealem, vel Australem) ut respectu observatoris positi in ipsa Terra, effugiat solarem discum. Si post quosvis octo annos accurate rediret Venus, et Terra ad eandem positionem; occursus omnes celebrarentur in iisdem quinque punctis: et si praeterea nodi Veneris accurate quiescerent; vel nunquam, vel semper post quosvis octo annos Venus appareret in Sole. Verum cum id non accurate accidat; fiunt aliquando bini occursus hinc, et inde ab altero e binis nodis in distantia ita exigua ab ipso, ut Venus eclipticae satis proxima in Solem incurrat respectu Terrae: posteriores autem

Nodorum

Nodorum nexus, certosque per aethera motus.
Nec dum, congressu e tanto quae commoda possint
Profluere, et quanti Coeli mensoribus usus,
Prodiderat Diva, atque animos exciverat acres. 210
Scilicet [11] aversis Terrae de partibus, alter,
Qua coit aeterno glacialis frigore pontus,
Alter, qua summo Coeli de Vertice Titan
Subjectos findit campos, et adurit arenas,
Hinc gelido, atque inde a Telluris cardine, Coeli 215
Mensores bini fulgenti in Sole nigrantem

occursus post reliquos octo annos fiunt in distantia paullo majore ab eodem nodo, nec nisi post plures, quam centum annos, tertius ex illis quinque occursibus annorum octo perpetuo regrediens advenit ad nodum oppositum, et Venus incurrit in Solem vel bis, vel saltem semel.

Jam vero nondum ita tum quidem Astronomia exculta erat, ut satis certo, et accurate praesciri posset, ac praenunciari hoc phaenomenum; unde factum est, ut anno 1631 nemo Venerem viderit in Sole, anno autem 1639 viderit Horoccius tantummodo, et Crabtrius ab ipso admonitus. Et quidem Horoccius ipse calculis secundum plures tabulas institutis invenerat, juxta nonnullas Venerem eo anno non debere in Solem incurrere, juxta alias debere, sed ita, ut ingens esset discrimen in temporre; nam id phaenomenum aliae exhibebant pro die 3, aliae pro 4, aliae pro 6. Hinc ipse observare coepit die secunda, et ita obstinato animo perrexit, fere continuo labore Solis imaginem contemplatus, ubi per nubes liceret, ut demum die 4, hora 3, min. 25. Venerem viderit ita jam ingressam Solis discum, ut ipsius limbum interiore contactu adhuc contingeret.

Ex iis observationibus et diametrum apparentem Veneris determinavit, et correxit tabulas motuum ipsius; sed colligere omnino non potuit uberiores illos fructus, quos exhibuisset integra observatio, et multo magis comparatio observationum institutarum in partibus Terrae satis remotis, et ad rem idoneis, de qua in sequenti adnotatione.

11 Proponitur hic methodus, quam Hallejus proposuerat in Transactionibus philosophicis ad annum 1715, capien-

Suspiciant

Pronior, illud idem discrimen temporis aeque
Arctius obveniet pariter, vel latius aeque.
Namque [12] vices Solis sequitur Venus, errantumque
Turba omnis, Phoebe dempta, fumantiaque astra;
Et magis hinc Titan distat si forte, minusve,
Tantundem illa etiam magis, aut minus omnia distant.
Proin visum hinc Veneris motum sub Sole diurnus
Terraï motus tantos minus, aut mage turbat.
Ergo ubi se primum fulgenti in Sole videndam
Reddiderit Venus, ac dorsum supponet opacum, 250
Jam dabitur certa demum metirier arte,
Quam celsus summo Titan se tollat Olympo,
Quam surgat Coelo Venus ipsa, et Jupiter, et Mars,
Saturnusque piger, Majaque creatus, et imo
Quae gremio longos effundunt sydera fumos. 255

qui conformem habent, lentior illi, cujus motus conformis minus differt a motu ipsius Veneris.

Harum rationum posteriorem hanc tantum expressi, constituendo binos observatores *Hinc gelido, atque inde a Telluris cardine*; nemo autem ignorat, cardinem, seu polum, esse in media ipsa glaciali zona, et extremas illas Americae septentrionalis oras esse rigidissimas, calidissimam autem eam Indiae orientalis plagam.

12 Respectivae distantiae, tam Planetarum, quam eorum Cometarum, quorum observationes rite institutas habemus, jam a longo tempore innotescunt Astronomis, adeoque absolutae distantiae mutandae sunt omnes in eadem ratione, in qua mutetur distantia Solis; sed adjeci, *Phoebe dempta*, nam ejus distantia a reliquis non pendet, quam satis certo, et satis accurate jam novimus. Quare inventa absoluta distantia Solis, inveniuntur reliquae omnes: ex distantia autem absoluta cognita, et diametro apparentes observata habetur diameter vera, et inde superficies, ac moles, quae omnia hic exprimuntur; sed posui, nos certos fore de iis omnibus intra centesimam eorum partem; censebam enim, cum haec scriberem ad summum intra quinque secunda posse definiri durationem phaenomeni, nunc autem

Quin

Quin et, quam crasso tendantur corpore, quantum
Se late circum effundat revolubile dorsum,
Extima quam facies molem sub pectore claudat,
Constabit tandem, nec centum e partibus una
Jam fugiet, dubiave animus formidine pendens 260
Ambiget, et cura incertus torquebitur acri.
Scilicet 13 haec nobis servant bona numina, nobis
Uranie spondet jam nunc: ubi denique nonus
Annus ab hoc, fausto intulerit sese omine, longum
Expectata dies roseis emerget ab undis: 265
Ardenti sub Sole Venus sese inferet, atque
Ora means fusco distinguet fulgida naevo:
Nec fugiet visum, et curas eludet inanes.
Credo equidem 14 densae circum se quaque cohortes
Effundent late terris, quaque horrida tristi 270

puto, eandem intra limites unius, vel saltem duorum secundorum, certam fore, si satis apta instrumenta adhibeantur: sed nihil immutandum censui, ut ea exprimerem sensa, quae habui eo tempore, quod tempus ipsis versibus exprimitur.

13 De transitu hic agitur, quem habebimus sequenti anno 1761, die sexta Junii, ad quem a fine anni 1752, quo haec scribebam, debebant effluere octo anni, et pars anni noni. Porro id ejus anni phaenomenum, ab Hallejo praenunciatum, jamdiu ab Astronomis avidissimè expectatur.

14 Id quod tum praedixeram, compleri jam video. Unus ex Academicis Parisiensibus, cum adhuc ego Parisiis essem, profectus est in Indiam Orientalem Pondicerium, cum instrumentis ad eam observationem idoneis, alter ab Academia Petropolitana expetitus parabat se ad iter suscipiendum Tobolskam principem Siberiae urbem: de tertio mittendo in Africam agebatur eodem die, quo Parisiis discessi, quod deinde audio etiam omnino decretum esse; quartus autem se offerebat ad navigandum in Cyprum insulam. Post meum adventum huc Societas Regia decrevit discessum binorum Astronomorum, ad Insulam Sanctae Helenae, et aliorum binorum ad Sumatram insulam, ad quas expeditiones meos quoque im-

Squalet

Squalet humus glacie, quaque ustis ardet arenis;
Nec tantas imo nubes alit Aeolus antro,
Ventorumque ciet gens improba, possit ut omnes
Obruere immensos tractus, atque omnibus Axem
Aethereum velare locis, et condere Divam. 275
Fors et ego Irroquium sedes, et inhospita regna,
Si tantum fortuna sinet, si vita superstes,
(Namque quid hae vires, quid non haec spondeat aetas,
Dum [15] bis vicenis alter vix additur annus?)
Transcurram procul, et doctis comes ibo catervis. 280
Spero equidem, nec me pontus turgentibus undis
Audentem terret; glaciesque, nivesque perennes: (usus
Mecum [16] aderunt; namque hos jam nunc servantur in

pulsus, quos et voce iteravi, et scripto, non inutiles fuisse arbitror; Regis autem munificentia ad eas binas expeditiones 1600 Anglicanas libras persolvit. Erit fortasse aliquis in Pacifico mari, quod esset optandum maxime; et ego qui tum de Septentrionali America cogitabam, spero, me futurum satis maturè Constantinopoli, quo nimirum brevi iturus sum in Veneti Legati comitatu, et ibidem observationem eandem initurum, ad quam ea urbs est satis idonea. Si his addantur Astronomi, qui per totam Angliam, Galliam, Italiam, Germaniam, ac apud Sinas observationem instituent; habebuntur profecto densae Observatorum catervae.

Porro tanto Observatorum numero est opus, ut si alicubi nubes Observationem turbaverint, alibi serenum sit Coelum, quod ubique simul esse nubilum aut vix potest, aut ne vix quidem.

15 Anno 1742, quo haec scripsi Octobri mense, inchoaveram tantummodo annum 42, natus 18 Maji anni 1711. Est autem quadragesimus secundus annus is, qui additur alter, sive secundus, bis vicenis, sive 40.

16 Est mihi egregium sane telescopium dioptricum palmorum 20, cujus objectivum vitrum a Christiano Hugenio elaboratum est anno 1682, quo tempore, ut ex ejus vita constat, ipse optima perfecit objectiva vitra, quod quidem ad ejusmodi observationem est satis idoneum. Verum aptiora sunt multo telescopia catadio-

Oblongis

Oblongis inserta tubis puriſſima vitra,
Rarum opus Hugenidae magni; cui Diva terenti 285
Adſtitit Uranie, ac dextram deduxit, et ambas
Pulvere poſtremo ſubigens, tenuique papyro,
Ipſa ſuis tritae frontes Dea ſedula maſſae
Adſpirans terſit digitis, vittaque polivit.
Non illis fluvio certet Peneus amoeno, 290
Theſſala qua placidus Tempe ſecat, atque beatos
Foecundat late campos, herbaſque virentes,
Ac vitrea irrorat teneros aſpergine flores.
Non fons Blanduſiæ, non Pegaſis unda, novato
Aonidum qua mane chorus, qua pulcher Apollo 295
Ipſe ſuos viva mirari in imagine vultus,

ptrica, vel etiam dioptrica Dolloniana, et ea etiam fortaſſe mecum habebo ad hanc obſervationem. Vitrum ad formam lentis ſphaericae reducitur ope patinae aereae, et arenae, quae vitrum terat: ad poſtremam polituram adhibetur pulviſculus tenuiſſimus, et patinae illi agglutinatur vel charta laevis, vel tela tenuiſſima, et uniformis.

Praeter teleſcopium requiritur ad eandem obſervationem etiam egregium horologium oſcillatorium, cum tota obſervatio conſiſtat in notando initio, et fine tam immerſionis, quam emerſionis, ſed potiſſimum fine illius, et initio hujus, quae momenta, ego quidem nunc arbitror, definiri poſſe intra unum vel alterum ſecundum. Porro horologia primus perfecit, et ad ſummam aequabilitatem perduxit Grahamus, celeberrimus Londinenſis et Artifex, et Obſervator, uti diximus in adnot. 4. libri I.

Superiores verſus conſcripſeram Arquatae in oppido ſito ad Truenti ripam, quod ad radices Appenini jugi occurrit iter facienti Nurſia Aſculum, ibidem triduo detentus a perenni pluvia, uti narravi in primo opuſculo mei voluminis De Literaria expeditione per Pontificiam ditionem. Cum equo veherer ſecundum ipſius Truenti ripam Aſculum verſus, ipſe fluvius ſuggeſſit mihi Peneum, Blanduſiam, Hippocrenem, quibus hic ad carmen adornandum, et demulcendum Lectoris animum ſum uſus; et ipſi equo inſidens hoc epiſodiolum elucubravi, ut ſaepe alias inter equitandum ipſa locorum

Et

Et ſolet effuſos lauro vincire capillos:
Non ipſe, adverſum ad Solem qui roſcidus humor
Ardentem imbriferis pingit ſub nubibus Irim.
Accedent et, qui certiſſima tempora ſignent, 300
Dentibus aeratis orbes, atque aureus index,
Regalem propter Thameſim quos arte Grahamus
Diſpoſuit mira, et Phoebo, Uraniaeque ſacravit.
Fultus ego his opibus Divam ſub lampade Solis
Suſpiciam, nec me fallent fugientia inertem 305
Tempora, cum primum rutilae dabit oſcula fronti,
Incurrens, limbumque cavans, cumque ultima dorſi
Immerget puncta, et cum primum appellet ad oram
Marginis adverſam, et cum toto evadet ab orbe.

Non tamen [17] et tenebris Phoebus nigreſcet opacis,
Nec caeca turbata dies mergetur in umbra; 310
Ora Dei tenuis diſtinguet fulgida naevus.
Proin ſudo obductus cum Titan deficit Axe,
Non illum irrepens Maja ſatus, atra nigranti
Non abdit dorſo Venus, affunditque tenebras. 315

Sed nec ſanguineos [18] fundunt quae ſydera fumos;

indoles ſive hilaris, ſeu triſtis imagines mihi ſibi ipſi conformes exhibuit, et carmina, quae ſaepe in ipſo conſcripſi itinere, ac ipſum locorum ingenium ſatis redolent.

17 Hic jam ad argumentum regredior, et concludo Eclipſes illas, de quibus hic agitur, nec a Mercurio, nec a Venere provenire.

18 Progredior jam ad excludendos cometas etiam: ſunt nimirum cometae, qui ſubeant inter Solem, et Terram, cujuſmodi plures obſervati ſunt; poſſet eorum aliquis eo tempore etiam tranſire per alterum e binis ſuis nodis, & tunc appareret in ipſo Sole: poſſet aliquis eſſe tum ita proximus Terrae, ut ejus apparens magnitudo apparentem Solis magnitudinem ſuperaret, quo caſu ipſum Solem totum contegeret: verum multae ſunt rationes, quae probent, eclipſes Solis vulgo cognitas, de qui-

Obductum

Obductum subitis rapiunt Titana tenebris.
unt, quae se possint media interponere, dumque
Junguntur Phoebo, nodos transcurrere: sunt, quae
Fors etiam terris tunc tantum accedere possint, 320
In genti totum obducant ut corpore Phoebum.
At rara adveniunt, et summi à finibus Orbis
Demittunt sese ad Solem, rarissima nodos
Attingunt simul; et fors prima ab origine Mundi
Tempora ad haec nullum simul attigit, atque nitenti,
Quod sequitur, nullum subiit fortasse sub orbe. 325
Quin et si subeat, totumque obducat; opaca
Non ideo Titan penitus nigresceret umbra.
Affusi circum crines, fumosaque longe
Pandens aethereas tanta se mole per auras 330
Materies fractum torquet jubar, atque per omnes
Dispergit late inflexum circum undique partes.
Scilicet hinc longis trans vitrea septa tuborum
Molibus ardenti horrentes si crine cometas
Suspicias, nulla nigrescere parte videbis. 335
Illâ etenim, Phoebum fugiunt qua fronte nitentem

bus hic agimus, non esse tribuendas ipsis cometis.

Primo quidem raro admodum cometae adveniunt ad partes inferiores orbitarum, quae se ad ingentia intervalla sursum protendunt, juxta adn. 12. lib. I, deinde nullus fortasse adhuc extitit simul in conjunctione inferiore cum Sole; et simul satis prope nodum: saltem nullam ejusmodi observationem habemus huc usque, sed omnium cometarum, quorum orbitam novimus, conjunctio ejusmodi est celebrata, cum admodum procul distarent a nobis.

Verum, quod caput est; si id etiam accideret, non idcirco Sol deficeret, et nigranti quodam tanquam velo obtegeretur, uti in ejus eclipsibus fieri cernimus; nam cometae habent ingentes atmosphaeras, et caudas, in quibus refractum, et reflexum lumen id efficit; ut pars etiam cometae a Sole

Aversi, illâ etiam fulgent, nec nocte nigranti
Ut Phoebe, ut Tellus, ut quinque obeuntia Phoebum
Sydera, et obscura mergunt ferrugine vultum.
Proin Phoebum turpi possent caligine tantum 340
Foedare, horrenti non et celare sub umbra,
Nec vitale jubar Terris arcere, diemque.

Ergo [19] soror Phoebi, nam sola ex omnibus astris
Jam superest, ac parte nitet, qua suspicit ignem
Phoebeum, parte aversâ nigrescit, et orbis 345
Aequat fraterni speciem, mensesque per omnes
Assequitur lentum, ac Coelo decurrit eodem,
Sola soror tanti miseris est unica Terris
Causa mali, soror una atro Titania dorso
Ora tegit, nobisque datos intercipit ignes. 350
Scilicet averso quoties jubar exuit ore
Extremo jam mense latens, tenuataque fronte
Cornua deposuit, seque alta condidit umbra;

aversa multo plus habeat luminis, quam superficies Terrae in primo vespertino, et ultimo matutino crepusculo. Et ea est ratio, cur in cometis etiam interjectis inter Solem, ac Terram, non appareant intuenti etiam per egregia telescopia phases illae, quas in Venere, et Mercurio intuemur, non illud, quod ipsi cometarum nuclei sint perspicui, cui causae id phaenomenum perperam tribuerunt nonnulli nobiles etiam Astronomi. De his fusius egi in mea Dissertatione de Cometis edita anno 1744.

19 Exclusis reliquis omnibus astris relinquitur sola Luna, cui idcirco tribuenda est causa defectus solaris. Illa nimirum, quae, uti diximus in adn. 51. lib. I, habet dimidiam superficiem illustratam a Sole, dimidiam vero penitus obscuram, et nigram, et quae habet apparentem magnitudinem aequalem magnitudini Solis juxta adn. 13. lib. I subit autem singulis mensibus in novilunio inter Solem, et Terram, respondens eidem parti zodiaci, quae quidem omnia eodem primo libro praemisimus, debet nobis tegere, et occultare Solem, si in ipso plenilunio non habeat latitudinem,

Terram inter, Solemque ſubit, Terramque nigranti
Deſpectat vultu, radiantem obvertit Olympo. 355
Tunc igitur, ſi ſe penitus mediam inſerat, atque
A recto poſitu nihil hinc, nihil inde recedat
Avia, Phoebeos vultus tegat, exceptumque
Praeripiat Terris jubar, atque avertat; oportet.
Non 20 tamen et ſemper mediam ſeſe inſerit, atque
Fraternos celat vultus ſoror: illa per auras (360
Scilicet aethereas, veluti memoravimus ante,
Urget equos ductu obliquo, mediumque per orbem
Signiferum, et callem Titanis non niſi punctis
Tranſilit in geminis, geminos nectentibus orbes, 365
Ac procul oppoſitas Coeli ſpectantibus oras.
Ergo ſi, Soli dum jungitur, atque novatis
Cornibus ordiri menſem parat, abſit ab ipſis
Nodorum punctis, et nexi tramitis ora;
Orbis et à medio radiantia ſigna ferentis, 370

ſive diſtantiam ab ecliptica vel borealem, vel auſtralem ſatis magnam.

Porro novilunium accidit in fine menſis lunaris, poſteaquam Luna ipſa decreſcens attenuavit cornua, et evanuit ex oculis, obvertens nimirum Tellu- ri partem Soli averſam, et idcirco penitus obſcuram, ac proinde ex oculis evaneſcens; quod hiſce verſibus exprimitur.

20 Hic jam clarius, et directè oſtenditur, cur non ſemper in noviluniis habeatur eclipſis, licet tum ſemper Luna jaceat inter Terram, et Solem; quia nimirum, uti itidem primo libro diximus in adn. 41, ejus orbita eſt obliqua ad planum eclipticae, quod veluti perforat in binis punctis, quae dicuntur nodi, et diriguntur reſpectu Terrae ad partes Coeli oppoſitas. Si igitur in ipſo novilunio ſatis diſtet a nodis, diſtabit et ab ecliptica hinc, vel inde, ac effugiet Solem; quem e contrario omnino teget vel penitus, vel ex parte aliqua, ſi tum fuerit in ipſo nodo, vel ipſi ſatis proxima.

Non autem ſemper totum Solem tegit, ſi in plenilunio ſit in ipſo nodo, ſed ad id requiritur, ut ejus diameter apparens non ſit minor, quam diameter apparens Solis, et ut ja-

Titanisque a calle aberit simul, atque rigentem
In Boream assurget, vel se demittet ad Austrum;
Nec fratrem teget, aut fraudabit lumine terras.
Ast illo nodum si tempore Diva tenacem
Attigerit, nodo fuerit vel proxima, opacum 375
Subjiciat dorsum, et rutili fulgentia, oportet,
Aut penitus tota, aut saltem sub margine summo,
Ora Dei condat, lucemque objecta moretur.
Atque [21] age, dum puro Titan velatus Olympo
Deficit, aethereas longe, lateque per oras 380
Flecte acies, totumque vigil circumspice Coelum.
Haud usquam Divae vultum effulgere triformis,
Ac nitidos cernes volitare per aethera currus.
Sed nec, dum tenebris emergunt clara fugatis 385
Ora Dei, pergitque dies effulgere, nec, dum
Succedit nox atra Polo, terrasque tenebris
Obruit, et nova converso se prodit Olympo
Astrorum facies, atque omne volubile Coelum
Ante oculos sensim tibi sistitur, exeret undis
Fulgentem Eois frontem, et se ostendet ab Axe. 390
Obductos igitur Coeli qua parte jugales

ceant fere in directum centra Solis, et Lunae cum oculo observatoris, qua de re iterum infra, ubi agemus de eclipsibus totalibus, et annularibus.

21 Quae diximus huc usque, ostendunt, posse Solem a Luna tegi, atque id debere accidere sub conditione hac, ut Luna in novilunio sit simul proxima nodo alteri; hic vero incipiunt jam proferri argumenta, quae positive evincant, revera ex interpositione Lunae oriri absolute Solis defectum.

Primo quidem eo die, quo eclipsis Solis accidit, Luna nusquam apparet, licet singulis diebus fiat integra Coeli conversio, adeoque omnia loca, in quibus Luna esse posset, veniant sub aspectum. Inde consequitur Lunam eo tempore respondere eidem parti zodiaci, cui respondet Sol.

Phoebus

Phoebus agit, curruque volat velatus in alto,
Ipsa etiam, ipsa illac cursum contendit, et acres
Urget equos, fratremque soror comitatur, et una
Progreditur: Coelo pariter spatiantur aperto. 395
Quin [22] et, si partes anni, bissenaque Lunae
Tempora rite notes numerans, mensesque novatos;
Invenies, nunquam subita ferrugine Phoebum
Involvi, et medio obductum nigrescere Olympo;
Elabens pleno mensis nisi concidat orbe, 400
Expectentque polo reducem nova tempora Phoeben:
At mensem tum Diva novat, tum cornua fronti
Rursum aptat, primamque parat prodire per umbram;
Cum Phoebum assequitur, Coeloque excurrit eodem,
Una acres urgens bijugos, currumque volantem: 405
Usque adeo Titan cum deficit, illa latenti
It comes, atque una pariter volat aetheris ora.
Hinc tibi jam Divae subeuntis prima patebunt
Indicia, et tanti auctorem cognoscere damni
Incipies, frontemque Dei velante sorore 410
Obductam, ac rutilae praereptos lampadis ignes:
At [23] si praeterea Coelum, Divaeque vagantis

[22] Confirmatur idem ex eo, quod nunquam eclipses habeantur, nisi in fine mensis lunaris, quo tempore Luna e Terra visa, uti primo libro est dictum in adn. 39, jacet ad eandem Coeli plagam cum Sole.

[23] Ea duo argumenta probant, tempore eclipseos Lunam habere eandem longitudinem cum Sole, sive respondere eidem puncto eclipticae; sed ad rem conficiendam oportet ostendere, tunc ipsam carere latitudine satis magna, nimirum esse proximam nodo alteri: id vero sequentibus argumentis evincitur.

Primo quidem pridie ejus diei, quo habetur eclipsis, sub ipsam Auroram observari poterit Luna jam admodum tenuis, ut et postride in ipso vespertino crepusculo Luna conspicietur cornibus jam novatis. Si autem rite determinetur ejus locus in Coelo, invenietur in

Et motum, et vigili positum scrutabere cura,
Tum vero manifesta fides, nec jam ulla timenti
Suspicio incertos agitabit pectore fluctus. 415
Scilicet ante diem, Phoebus quo deficit, atque
Ardentes puro vultus obducit Olympo,
Mane vigil primo tenuatae cornua Lunae
Aspicies tumidis postrema exurgere ab undis,
Excitos dum nectit equos Aurora, diemque 420
Sollicitat, noctemque fugat, pallentiaque astra
Restinguit late, & gremio foecunda rubenti
Perfundit rutila teneros aspergine flores.
Ergo locum, superas quo Diva emergit in auras
Observa, ac signis confer fulgentibus, et si 425
Haud pigeat, radio metire, atque aere rigenti,
Incisisque notis: inclusas dentibus horas
Ferratis adhibe simul, et sua tempora nosce.
Quod si etiam nota numeros versaveris arte;
Invenies, Boreae Divam torpentis ad oras 430
Vix quidquam à medio se tollere, seu ferventem
Ignibus aestivis vix se demittere ad Austrum,
Signifero vicinam orbi, fratrisque viaï.
Praeterea cum jam se evolverit altera puro

utroque casu satis proxima eclipticae, sed cum binis latitudinibus contrariis; nimirum distabit ab ecliptica in Boream, si prius distabat in Austrum, et vice versa. Constabit inde, inter eos dies, nimirum in ipso novilunio, vel prope ipsum, transiisse per nodum.

Porro ad definiendum locum Lunae, potissimum, ubi stellae nondum apparent, ut in satis vivido crepusculo, requiruntur instrumenta astronomica, quae hic innuuntur; nimirum quadrans aliquis cum divisionibus graduum, et minutorum; ac alidada cum diopτris, quo respiciunt illa *radio metire, atque aere rigenti, incisisque notis*; et horologium, quod satis clare exprimitur.

Axe

Axe dies, jamque occiduas ſe Phoebus in undas 435
Merſerit, et primis Coelum praefulſerit aſtris,
Se vigili prodent oculo nova cornua, et acrem
Tenvia fulgenti percellent cuſpide viſum,
Deinde brevi occiduo ſe merſa ſub aequore condent.
Hic loca ſi pariter, certaſque notaveris horas, 440
Signifero vicinam orbi, Phoebique videbis
Tum quoque vicinam calli, ſed parte meantem
Oppoſita mutâſſe latus: ſi forte rigentem
Elata in Boream ſeſe ante erexerat; imum, (445
Praetergreſſa viam Phoebi, jam accedet ad Auſtrum:
Contra humiles Auſtri ſi ſe inclinârat in oras,
Altior in Boream ſeſe eriget, atque rigentem
Cornua deflectens radiantia tollet ad Urſam.
Ergo etiam, interea nodum tranarit, oportet,
Et rutilo conjuncta Deo ſat proxima nodo 450
Extiterit, fratriſque viae; cumque ille feratur
Altus in immenſum, et contra tam proxima terris
Diva ſuos humilis currus agat, atque nigrantem
Telluri frontem, nitidamque obvertat Olympo,
Inſerta obſcuro Phoebum velaverit ore, 455
Eſt opus, atque datos terris exceperit ignes.

Quod [24] ſi ſeptenis curſum obſervare diebus

[24] Superior obſervatio requirebat inſtrumenta aſtronomica: hic docetur, quo pacto idem obtineri poſſit ſine ullis inſtrumentis; ſi nimirum per ſeptem circiter dies ante, et poſt plenilunium eclipticum obſervetur Luna a ſecunda quadratura menſis praecedentis ad primam ſequentis: licebit ope fixarum definire oculis eclipticam, ſive viam Solis, et in priore illa quadratura Luna diſtabit maximè ab ecliptica ipſa, nimirum per totos illos quinque circiter gradus, quos exigit inclinatio ejus orbitae ad eclipticam, et quibus debet diſtare ab eclipti-

Ante diem, ſubita quo Sol nigreſcit ab umbra,
Malueris, ſeptemque aliis iterare laborem;
Inciſi nihil aeris opus, nil tempore certo 460
Tunc erit, atque oculo rem nôſſe licebit inermi.
Sydera ſuſpiciens, qua ſe diſtincta coruſcis
Faſcia protendat ſignis, et dividat Axem,
Invenies, mediumque orbem, Phoebique licebit
Obtutu ſignare viam: primum inde remotam 465
Ergo Deam, medium cum jam rapit horrida vultum
Umbra tegens, mediuſque nitet, quantum avia Coelo
Unquam errare poteſt, fratriſque relinquere callem,
In latus, aſpicies, curru ſe ferre vaganti;
Per reliquos tum deinde dies jam cornua fronte 470
Exeret, atque apices ſinuans tenuabit acutos,
Titaniſque ſimul calli magis, ac magis aureos
Adducet currus, mediumque accedet ad orbem;
Tum Phoebum tranſgreſſa iterum nova cornua fronti
Induet, atque ſinu ſenſim pingueſcet, et ultra 475
Fratris iter jam flectet equos, orbemque relinquet
Signiferum; ſeſe puro cum ſeptima reddet
Axe dies, medioque nitens Dea fulſerit ore,
A medio rurſum diſtet dum tramite, quantum
Deflexam obliquus dat poſſe recedere callis. 480

ca tum, cum aeque diſtat ab utroque nodo juxta adn. 41. lib. I. tum ſingulis diebus decreſcet magis, et magis ad eclipticam accedet; ac ubi poſt id novilunium jam creſcentem intueri licebit per noctem, obſervabitur ex oppoſita eclipticae parte, a qua ita perpetuo recedet, ut circa poſteriores illas quadraturas iterum habeat diſtantiam ab ecliptica illam maximam, et oppoſitam. Dico autem circa, nam dimidium menſis ſynodici, quod intercedit inter binas quadraturas, eſt paullo longius, quam dimidia revolutio conſiderata reſpectu

Atque

Atque adeo vultum cum Phoebo juncta nigrantem
Verterat ad terras, nec se prodebat Olympo,
Transgressam nodum disces, fratrisque nitentem
Sub currum flexisse rotas, ardentiaque ora
Texisse, et rutilas dorso fregisse sagittas. 485
Nec te [25] dum nitidos Phoebi rapit invida vultus,
Spectantem eludet fallens, licet usque dolosam
Aversa aethereas frontem Dea vertat in oras;
Si modo velatae subeuntem lampadis umbram
Suspicias, motumque notes, formamque, locumque. 490
Ne tamen ardentes Phoebeae lampadis ignes
Suspiciens oculo demens tuearis inermi,
Prima licet primis jam sordeat ora tenebris.
Incautas oculorum acies praestinguet, et omnes
Exsuget tantum succos jubar, audentemque 495
Indignans jaculis Phoebus configet acutis.
Quin etiam medium cum se jam condidit, et cum
Tertia vix superat rutili pars, quartave vultus,
Haud impune extanti oculos defixeris ori,
Et vincas tanta vultum se luce tuentem. 500
Sunt qui reflexum placida tueantur in unda,
Nam jubaris pars magna subit, perque intima aquaï
Viscera distractum, et fundo restinguitur imo.

ejusdem nodi, quae intercedit inter binas maximas elongationes ab ecliptica. Deinde tempus a quadratura ad novilunium, et viceversa, variatur pro varia positione apogei: sed ista subtiliora in carmine non moror.

Quamobrem inde consequitur, eam transiisse per nodum circa ipsum novilunium, adeoque in ipso novilunio, in quo subit inter Terram, et Solem debuisse esse proximam nodo; et proinde debuisse Solem obtegere dorso illo obscuro, quod tum nobis obvertit.

[25] Superius argumentum de-

Pro

Pro puris alii lymphis, et fonte quieto
Nigrantes adhibent fuccos, quibus alba papyrus 505
Tingitur, et calamos fentit perarata difertos,
Orandasque foro caufas, plenove theatro
Cum fremitu, et refono recitanda poëmata plaufu
Excipit, et longos fervat confcripta per annos.
Nam plures bibit ore, et plures atra fub imo 510
Materies gremio radios reftinguit; in auras
Vix ulli aërias revolant, oculosque laceffunt.
Tu tamen aut violae faturo fucata colore
Vitra cape adjungens, aut pingui perlita fumo,
Nec femel ardenti, nec longum admota lucernae. 515
His tutare oculos, hoc tela ardentia Phoebi
Excipe protectus clypeo, flammafque volucres
Securus ride, et radiantem tranfpice vultum.

fumptum eft a loco Lunae, quae tempore eclipfeos folaris femper eft in novilunio, adeoque fubit inter Terram, et Solem, et femper eft fatis proxima nodo, adeoque et eclipticae; unde fit, ut Solem nequaquam evitet. Jam ad alia argumenta fit gradus defumpta a forma, loco, et motu illius umbrae, quae in ipfa eclipfi Solem paullatim tegit, cujus obfervatione diligenti fatis manifefto depreheuditur; ipfam nihil effe aliud, nifi faciem Lunae averfam a Sole.

Sed hic in anteceffum illud cavendum proponitur, ne umbra ipfa obfervetur nudo oculo, dum extat pars aliqua folaris difci, cujus nimia lux oculorum aciem praeftingueret: obfervant alii imaginem Solis reflexam in aqua; fed ea adhuc lumen habet nimis vividum: atramentum eft ad id aptius; fed multo aptiora funt vitra colorata, vel fumo illita, quod fit, admovendo ipfa e fuperiore parte ad flammam lucernae, non diu ibi retinendo, ne nimio calore difrumpantur, adeoque pluribus vicibus idem repetendo, ne nimis tenuis fit fuligo, quae adhaeret, et fatis retundendis folaribus radiis impar. Ea vitra et telefcopiis aptantur, ac eorum ope tuto, et impune ipfum Solem contemplamur.

Ac

Ac primum [26] formamque umbrae, molemque tueri
Proderit. Illa, quidem, nisi forte in margine summam
Vix radat Phoebi frontem, qua curvus ad undas 520
Prominet occiduas, curvato limite limbum
Irrepens cavat, et dorso convexa recurvo
Flectitur, Eoasque tumens sinuatur ad oras.
Dumque subit, viden, ut formam progressa rotundam
Exhibeat, teretemque globi se inflectat in orbem? (525
At teretem ipsa etiam virgo Latonia formam
Prae se fert, curvumque tumens sinuatur in orbem.
Nec verò et moles non convenit: umbra, nitentem
Quae tristi irrepens condit ferrugine vultum, 530
Tanta patet, quanta aetherias se mole per auras
Cynthia fert, cum tota ardet, plenoque nitentem
Ore refert fratrem, ac nocturnas discutit umbras.

26 Primo quidem forma circularis, et magnitudo sunt ejusmodi, cujusmodi apparent in Luna plena. Quin immo si tunc Luna sit prope perigeum, sive Terrae proxima, quod an accidat, constare potest, cum constet, ad quam quovis tempore Coeli plagam dirigatur apogeum Lunae, et perigeum ipsi oppositum; discus Lunae superat discum Solis, quem idcirco potest totum tegere; ac efficit tum quidem eclipsim totalem, si centra Solis, et Lunae jaceant satis proximè in directum cum Observatore; et si satis magnum sit diametrorum apparentium discrimen, per plura minuta durat aliquando eclipsis totalis. Sed si Luna sit propior apogeo, tum ejus diameter apparens est minor, quam solaris, et si ea centra jacent in directum cum Observatore, habetur eclipsis annularis. Remanet nimirum annulus lucidissimus solaris disci extantis ultra nigrum Lunae discum.

Diameter horizontalis maxima Lunae perigae in eclipsibus est ex Halleyo min. 33. sec. 36. minima Lunae apogae min. 29. sec. 25; utraque autem crescit nonnihil, si altitudo Lunae supra horizontem sit major ita, ut, Luna existente in ipso zenith, illa augeatur secundis circiter 36, haec 28. Ex Com-

Quin

Quin etiam, si tunc imo Dea tramite, terris
Proxima, distento latescat pinguior ore, 535
Latior ipse quoque umbrosus distenditur orbis,
Et vincit crasso Phoebeos augmine vultus.
Hinc medium si forte Deum media occupet umbra,
Prominet, ac rapit omne jubar circum undique, et ignes
Occulit, ac penitus radiantia contegit ora. 540
At Dea sublimi si forte in vertice callis
Adstringat frontem brevior, breviore figura
Ipsa etiam coit, et Phoebeos arctior umbra
Haud potis est penitus tegere, ac subducere vultus.
Hinc medio sedet atra sinu: circum undique limbus 545
Extat, et ardenti fervens micat annulus igne.

Qualis [27] quae rutilo cum Divûm effingimus ora
Aut auro, aut aere, et festis imponimus aris,
Divinam frontem, ac vultum, crinesque corona
Ambit, et aetherei cives designat Olympi. 550

mentariis Acad. Paris. ad annum 1752. diameter apparens maxima Solis est min. 32. sec. 39, minima min. 31. sec. 34, nec ad sensum mutatur, mutata Solis altitudine supra horizontem. Inde constat illud, si recta, quae transit per centra Solis, et Lunae, incurrat in Terram Luna perigea, eclipsim fore ibi semper totalem; si apogea, annularem, ubicumque sit Sol; cum diameter apparens Lunae perigeae superet omnes diametros apparentes Solis, et diameter apparens Lunae apogeae ab iis omnibus superetur. In majore distantia Lunae ab utroque extremo erit eclipsis totalis, vel annularis, prout diameter apparens Lunae fuerit major, vel minor diametro apparente Solis.

27 Solent eorum imagines, quos in Ecclesia Catholica sanctos dicimus, ita pingi, vel sculpi, ut fasciola lucida circularis caput ambiat, ab ipso nonnihil disjuncta. Memini autem me alicubi legere de eclipsi quadam annulari a Monachis, ni fallor, quibusdam olim visa haec verba, vel hisce similia; quidam etiam dicunt, se gloriam Dei vidisse in Coelo, quemadmodum a pictoribus depingi solet.

Nil

Nil tamen [28] usque adeo Divam tibi prodet opacam,
Ut sedes umbrae, et rutila sub lampade motus.
Si satis humentem bijugos deflectat ad Austrum
Cynthia, cum Phoebo conjungitur; ille boreis
Fulgebit late regnis, et lumine terras 555
Perfundet pleno: non illo tempore tellus
Itala, ferventes non qui terit ustus arenas
Ardentis Libyae, tenebras formidet opacas,
Atque insperata tinctum ferrugine Solem.
Astrifer algenti quas sydere despicit Indus, 560
Quas Junonis avis gentes, aut igne quaterno
Fulgida crux, alio torpentes cardine terras
Umbra teget condens, Phoebumque obducet, et atram
Inferet attonitis alieno tempore noctem.
At contra in Boream si curru obliqua nigranti 565
Tantundem se diva ferat; borealibus oris
Non expectatas minitabitur umbra tenebras.
Cum vero aetherio divae tibi visa sub Axe
Ad medium Phoebi sese via diriget; umbra
Ipsa etiam Phoebi medium contendet ad orbem. 570
Si quidquam arctoas se curru inclinet ad oras
Cynthia, ab arctoo perstringet margine Phoebum

28 Consequuntur argumenta a situ illius umbrae, a locis Terrae, quibus eclipsis accidit, et a situ, ac motu umbrosi circuli Solem tegentis. Nam si tempore conjunctionis Lunae cum Sole Luna ipsa habuerit latitudinem exiguam borealem, eclipsim habebunt regiones boreales; si vero australem, australes: eae autem regiones indicantur hic per constellationes coelestes, quae ipsis imminent.
Rursus si Lunae locus computatus pro dato quovis Terrae loco ad tempus mediae eclipseos congruat cum loco Solis; via umbrae visa in eo loco dirigetur in illa eclipsi ad medium Solem: quod si is locus Lunae fuerit borealior, vel australior loco Solis, Luna teget tantumodo partem borealem, vel australem ipsius.

Umbra,

Umbra, ſed oppoſitum fuſcas cum flectet ad Auſtrum
Diva rotas, premet oppoſitum latus umbra tenebris.
  Convenit [29] et motus, certuſque per aethera greſſus.
Adverſum bijugos Phoebi ſoror urget in ortum, (575
Et fratri occiduis velocior inſtat ab oris
Invadens, pigrumque volans praevertit, eoaſque
Ad ſedes fugit, ac longe progreſſa relinquit.
Umbra quoque eoas curſum contendit in oras, 580
Ac Phoebi ad medium cum nititur; umbrifer arcus
Occidua de parte ſubit, limbumque nitentem
Irrumpens cavat, atque Eoo in margine demum
Erumpit fugiens, rutiloque evadit ab orbe.
  Dum fratrem [30] ſequitur fugientem Diva, fugitve 585

29 Directio motus hic conſideratur: et Luna, et Sol, ut vidimus libro I. moventur in orientem, ſed Luna celerius, adeoque in noviluniis ipſum aſſequitur ex parte occidentis, et in orientem tranſit; umbra autem itidem, cum abit per medium Solem, progreditur ſub Sole ab occidente in orientem.

30 Accedit hic celeritas. Luna cum diebus circiter 27 percurrat totum Coelum, ſingulis diebus percurrit gradus circiter 13, Sol autem unum circiter gradum; adeoque motus diurnus Lunae reſpectu Solis eſt duodecim circiter graduum: procurrit igitur ſingulis horis circiter per dimidium gradum, et dimidii circiter gradus eſt diameter apparens Lunae. Quare Luna ſingulis horis accedit ad Solem ante conjunctionem, vel recedit poſt ipſam circiter tanto ſpatio, quanta eſt ejus apparens diameter, quod hic exprimitur: eadem vero eſt velocitas apparens illius nigri circuli ſub Sole.

Haec quidem craſſo calculo hic proponuntur: caeterum et diameter apparens Lunae, et velocitas ejus motus horarii viſi e centro Terrae, et multo magis haec velocitas viſa e ſuperficie, et turbata per parallaxim, pro diverſis ipſius Lunae poſitionibus diverſa eſt, ut et ipſe horarius motus Solis eſt diverſus pro diverſa ipſius diſtantia a Terra. Satis eſt hic illud innuere in genere per tabulas aſtronomicas computari accurate pro quavis eclipſi haec omnia, et inveniri jam admodum conformes calculis obſervationes.

Sectantem

Sectantem à tergo, tantum olli accedit in horas,
Discedit tantum, quantum se corpore crasso
Porrigit, aethereasque patet distenta per auras:
Progreditur tantundem etiam sub Sole nigrantis
Umbraï species, sive impetat atra nitentem 590
Irrumpens primum, seu praetergressa relinquat.

Cum Dea jam summo procul avia tramite fessis
Tardat iter bijugis, tardat quoque lentior umbra:
Illa imo terris in tramite proxima cursum
Cum celerat, pronusque immani pondere currus 595
Volvitur; ipsa etiam velocior umbra sub igne
Phoebeo volat, et densis se passibus infert.
Quid vero, [31] male visa tibi quem semita divae

[31] Exprimitur hic effectus parallaxeos de qua egimus lib. I. adn. 22; est autem in umbra Solem occulente idem ille, qui debet esse in Luna. Ea deprimit astrum removendo ipsum à zenith, si aliquam habeat distantiam ab ipso zenith. Quare Luna sive recens orta ascendat, sive ad occasum vergens descendat, apparet horizonti propior ob ipsam parallaxim, quam revera sit. Haec parallaxis in primo casu in ascensu Lunae decrescit, in secundo in ejus descensu crescit, cum sit major in minore distantia ab horizonte, ac mutatio ipsius parallaxeos eo est major, quo magis Luna distat ab horizonte. In utroque casu oritur ex hac mutatione parallaxeos motus quidam Lunae apparens in occidentem, qui tardat ejus motum in orientem. Nam ipsa parallaxis conspirat cum motu Lunae in orientem ex parte orientali, opponitur ex parte occidentali: porro tam diminutio parallaxeos promoventis in orientem, quam incrementum ejusdem retrahentis in occidentem, est quidam motus in occidentem, quo fit, ut Luna lentius in utroque casu appareat promota motu proprio in orientem. Quamobrem quo ipsa est horizonti propior, eo lentius accedit ad Solem ex parte altera, et ex altera recedit ab ipso; circa meridianum vero, nobis zonam incolentibus temperatam borealem, apparet propior australi cardini horizontis.

Idem autem accidit et umbrae tegenti Solem, ac idcirco eclipses Solis eo diutius du-

Ostentat

Oſtentat motum? Dorſo Telluris ab alto
Quae tuimur, ſummo nam ſi minus ardua olympo 600
Attollant ſeſe, veluti memoravimus olim,
Deſpicimus depreſſa magis: ſeu calle diurno
Aſſurgat, ſummamque Poli nitatur ad arcem,
Seu contra occiduas prono ſe Cynthia ad undas
Demittat curru, magis alto a vertice Coeli 605
Crediderìs diſtantem, ac viſi tramitis error
Hìc creſcit, decreſcit ibi: at Dea parte in utraque
In Zephyri ſedes agitur, propriumque retracta
Tardat iter, quóque ad medium ſublimior orbem
Accedit magis, hoc paritèr mutatur et error 610
Uſque magis, proin et fratrem ſequiturque, fugitque
Lentior; ac medio cum jam eminet ardua in ipſo,
Dixeris, et bijugos humentem flectere in Auſtrum
Depreſſam, illuſus conſpectae errore viaï.

Ipſa autem errores umbrae tibi ſemita eoſdem 615
Viſa ſubit, primoque Deum ſi mane recondit,
Veſpere vel ſero, celeri magis incita curſu
Evolat, ereptos citiuſque redintegrat ignes.
At medio cum forte die Sol deficit; umbra
Lentior ingreditur, longumque moratur inhaerens: 620
Praeterea adverſum ſe prona inclinat ad Auſtrum
Tunc eadem: ac Divae quidquid contingit eunti,
Et forma, et moles ſedesque, et motus, et error,
Omnia ſunt umbrae communia. Diva nigranti

rant caeteris paribus, quo accidunt propius reſpectu horizontis, et in meridianis eclipſibus umbra ipſa nonnihil deprimitur. Haec tanta conformitas horum omnium abunde evincit, Solis eclipſim oriri ab interpoſitione Lunae inter Solem, et Terram, quod demonſtraudum ſuſceperamus.

Ergo

Ergo ſubit curru, Phoebique intercipit ignes, 625
Quaeque Deum triſti ferrugine contegit umbra,
Eſt ipſa averſae frons atra ſororis, Olympum
Et rutilo ardentem ſpectantis lampada vultu.
Sic illa [32] et fixos, errantesque aetheris ignes
Saepe tegit dorſo inferior, ſeu laeta coruſcum 630
Ore jubar fundat, plenoque effulgeat orbe,
Seu tenebris alter limbus nigreſcat opacis.
Sic tegere et fixos quaevis errantia poſſunt
Sydera, Saturnum ſic gnatus, utrumque Gradivus,
At Venus, et Maja genitus Martemque cruentum; 635
Saturnique, Jovisque ignem, ac per mutua ſeſe
Vel penitus, magna poſſunt vel condere parte,
Suppoſitoque jubar tegere, atque avertere dorſo.
Scilicet ante oculos quidquid ſe ſiſtat opacum,
Ulteriora tegit: gremio res ferveat imo 640
Uſque licet, plenoque jubar diffundat ab ore,
Haud ferit obtutum, et mentis pervadit ad arcem,
Ni ſubeant oculos radii, fibrasque laceſſant,
Et parva expreſſam pingant ſub imagine formam.
Dum ſubita ſenſim Titan velatur ab umbra, 645
Ipſius ora Dei nigreſcere dixeris; ille
Ardenti aeternas ſervat ſub pectore flammas,
Quosque ſolet, mittit radios: ſoror invida curſum
Interjecta negat, miſſosque intercipit ignes.

32 Luna et fixas ſaepe tegit, et Planetas non raro, ſub ipſis tranſiens, quod multo manifeſtius apparet ibi, quam in Sole; tum enim Luna ipſa ſub aſpectum cadit; et quidem ante plenilunium ſolent ea aſtra immergi ſub Lunam ex parte limbi ejus obſcuri, et poſt plenilunium ex parte limbi lucidi; nam Luna appellit ad ea limbo orientali, qui praecedit, in motu proprio Lunae (is enim fit in orientem, et eſt

Non tamen 33 et, tenebris cum se Dea condit opacis,
Assuetum vultu servat jubar: umbra nitentes 650
Inficit atra genas, turpi caligine vultus
Obruitur, foedoque omnis decor excidit ore.
Namque memor damni Tellus, et lucis ademptae
Occupat, oppositas Phoebo pervadere ad oras, 655
Tentantem, ac rutila penitus se ostendere fronte,
Parque pari referens mediam se opponit, et ignes
Fraternos rapit, ac tenebras affundit opacas.
Scilicet 34 ingentem nigranti corpore Tellus
Umbraï conum longe protendit: acuto 660
Ille apice appositas Phoebo se vertit ad oras,
Atque quater tantum procurrit in aethera, quantum
Ardua se terris Latonia tollit ab imis:
Et qua Diva meat, ter crassior illius orbe
Tenditur, ac late aetherias circum inficit auras. 665

celerior quovis alio motu astri cujusvis), limbus vero orientalis est obscurus ante plenilunium, et occidentalis post ipsum. Possunt autem quaecunque astra nobis inferiora tegere ea, quae sunt superiora, adeoque fixae possunt tegi ab omnibus planetis, Saturnus a reliquis omnibus, Jupiter a tribus ipso inferioribus, Mars a duobus, Venus autem, et Mercurius possunt etiam se mutuo tegere, cum et Mercurius situs in parte superiore suae orbitae possit esse remotior a Terra quam Venus sita in inferiore, et jacere in directum cum ipsa. Sed hae mutae planetarum eclipses vix unquam accidunt ob diametrum apparentem ita exiguam, ut quaevis exigua centrorum apparens distantia occursum impediat.

33 Fit jam transitus ad eclipses Lunae, quae accidunt ex incursu Lunae ipsius in umbram Terrae. Hic innuitur tantummodo poëtica idea Terrae ulciscentis injuriam sibi illatam a Luna in eclipsi solari; sed ea postremo postremi libri episodio occasionem praebet, ubi multo magis excolitur.

34 Umbra Terrae habet figuram ad sensum conicam, cum terminetur a radiis tangentibus Solem, et Terram;

Ergo

Ergo [35] cum medio Soli contraria menſe
Invehitur Diva, et nocturnas diſcutit umbras,
Si ſimul ad nodos acceſſerit, aſtriferumque
Solis iter motu obliquo tranſcurrere tentet;
Continuo triſtem bijugos, currumque nitentem 670
Cogitur in conum irrumpens demergere, fruſtra
Illa quidem rapidos tentans avertere, fruſtra
Retrahere adducto fraeno, aut cohibere jugales.
Procurrunt, rectique volant: fert ipſe volantes
Impetus, ac denſam indociles imittit in umbram. 675
Quid dubitas? [36] Divae frontem, dum parte nigreſcit
Sordida, parte nitet, fraternaque ſpicula reddit,
Suſpice, et umbraï formam, qua limite curvo
Tenditur, intuitor, molemque inde erue, et omnem
Circum oculis tractum metire, ac mentis acutas 680
In medium defige acies, poſitumque ſub aſtris

quae ambo ſunt corpora ſaltem ad ſenſum ſphaerica. Is conus protenditur ad diſtantiam a Terra circiter quadruplam diſtantiae Lunae, et ubi per eam Luna tranſit, ejus craſſitudo eſt circiter tripla diametri Lunaris. Eae dimenſiones non ſunt accuratae, nec conſtantes. Longitudo coni variatur pro varia diſtantia Solis a Terra, et craſſitudo coni in regione Lunae pro varia ipſius Longitudine, et varia diſtantia Lunae a Terra; ſed pro carmine numeros adhibeo craſſius determinatos, et, ut ajunt, rotundos, qui tamen ipſi aliquando inveniuntur exacti.

35 In plenilunio Luna eſt Soli oppoſita, ubi ſi ſit prope alterum e nodis, tendit motu obliquo ad viam Solis, ſive ad eclipticam, cum ibi eam ſecet lunaris orbita. Diſtat autem parum ab ecliptica, ſi diſtet parum a nodo, qui eſt in ipſa ecliptica, et idcirco incurrit in conum illum umbroſum, cujus nimirum axis jacet in ipſo eclipticae plano.

36 Ea eclipſeos lunaris cauſa probatur itidem ex eo, quod et forma, et magnitudo et locus, et motus umbrae, quam cernimus in Luna, congruunt penitus cum iis, quae debet habere ſectio coni umbroſi Ter-

 Deſigna

Designa observans, et lentos collige motus.
Umbrifero Terrae cono simul omnia cernes
Congruere, et formam, et molem, motumque, locumque.
Primum igitur [37] teretem si conum in imagine plana
Excipias, mediumque seces, nec recta secantis 685
Planities ductus se quidquam inclinet ad axem,
Orbis forma aequi sese offeret, atque rotundo
Excurrens circum se margine flectet imago.
Ergo cum plana nobis sub imagine Phoebe 690
Exhibeat, quanquam incurvam, nec flectat in ullum
Inclinata latus frontem; qua parte nigrantis
Subjicitur coni limbo, atque intercipit umbram,
Ipse aequum illusis se flectere debet in orbem
Limbus, et aequalem praebere tuentibus arcum. 695
At flectit sese sinuans, formamque rotundam
Marginis umbriferi spectantibus exhibet ora,
Qua se cumque ferat, Boreae de parte nivalis
Sive meet Diva, oppositum seu flectat ad Austrum
Alipedes contra, aut medio se tramite in ortum 700
Urgeat, occidua et subiens de parte nitentes

rae in eo situ, in quo est Luna, dum deficit, quae omnia evolvuntur hic deinde per partes.

37 Incipiendo a figura, si conus, quem Geometrae dicunt rectum, qui est vere teres, et non compressus, secetur plano perpendiculari ad axem, sectio, ut patet, est orbis aequus, sive circulus. Quare illud planum, in quo nobis apparet discus Lunae, ubi incurrit in conum umbrae terrestris, cui est ad sensum perpendicularis (obvertitur enim ad perpendiculum Telluri, per cujus centrum transit axis ejus coni), debet exhibere formam ejus umbrae circularem. Revera terminus umbrae, quam videmus, non est in quopiam disco plano, sed in superficie Lunae sphaerica, et idcirco non est circularis, sed duplicis curvature, et admodum difformis: at is terminus projectus in discum planum, in quo tota hemis-

Obducat

Obducat vultus umbraque evadat ad Eurum.

Quid[38] moles? neque enim Divae squalentis in ore
Umbra coit, plenoque arcus conjungitur orbe.
Ille quidem sinuat sese, sed tramite recto, 705
Et chorda jungente apices vix distat, opaco
Vel mediam cum distinguit jam limite frontem
Maximus: exiguam ut magni, perque aethera gyri
Pandentis gremium possis cognoscere partem.
Gyrum ipsum metire oculis, ductumque secutus 710
Marginis umbriferi vacuum discurre per Axem,
Obtutu spatium signans, orbemque rotundans.
Invenies vacuo ter tantum excurrere crassum
Aethere, Diva suo ferme quantum occupat ore,
Si rectos medio tendentes tramite ductus 715
Contuleris; molemque sinu concludere in imo
Majorem novies spatio, quo Cynthia turget.
Scilicet umbriferi quantum se diximus illa
Distendi gyrum coni in regione nigrantem.

phaetii superficies nobis apparet, debet habere eam formam ad sensum, quam haberet, si ea ipsa superficies esset discus planus. Idcirco dixi, *atquum illusis se flectere debet in orbem Limbus*; forma enim illa circularis ejus limbi est quaedam illusio optica.

Porro in quacunque positione Lunae eclipsis accidat, limbus umbrae apparet revera ad sensum circularis. Congruit igitur forma

38 Jam ad magnitudinem: ea est tanta, ut solum arcus exiguus umbrae in Lunam incurrat: curvatura autem est talis, ut si rite oculo compleatur, satis appareat, fore diametrum circuli umbrae circiter triplam diametri Lunae, adeoque aream noncuplam, seu ter triplam sinam areae circulorum, immo et omnium superficierum similium, sunt inter se, ut quadrata diametrorum.

Porro diximus, circiter triplam esse crassitudinem coni umbrosi in regione Lunae, adeoque tripla debet ibidem esse et diameter sectionis coni umbrosi. Congruit igitur et magnitudo.

Quod 39 si non oculis fidas errantibus Axem 720
Per vacuum, poteris certam explorare per artem,
Et licet haud visi mensuram prendere tractus.

Quo tamen Aoniis nunquam exaudita sub antris
Instrumenta canam versu, qua fila retexam
Arte tibi, formamque abstrusae molis, et usum 725
Multiplicem evolvam pandens, numerisque docebo;
Non illis, vasto quibus ipsa errantia Coelo
Sydera mensores adstringimus, atque potenti
Nequidquam obstantes fraeno parere jubemus;
At quibus adstrictos durus devincit Apollo, 730
Objectoque vetat vates discurrere campo?
Tu, Dea, quae summo fabricatum munus Olympo,

39 Admodum difficile est nudo oculo, et pura imaginatione ita continuare arcum illum umbrae, qui apparet in Luna, ut inde deprehendi possit ratio ejus diametri ad diametrum Lunae, quod primo loco proposuimus; idcirco hic proponitur methodus capiendi accuratius ejus mensuram ope micrometri. Cum haec scriberem, nondum pervulgatum fuerat per Europam micrometrum, quod appellant objectivum, quod Dollondus hic in Anglia vel invenit, vel saltem perfecit, et telescopiis catadioptricis aptavit, quod constat vitro objectivo bifariam secto, et ita aptato, ut ea dimidia possint moveri in partes contrarias, ac ita exhibere binas ejusdem objecti imagines recedentes a se invicem recessu ipsorum vitrorum. Quam ob causam hic egi de alio micrometrorum genere, quae dicuntur ocularia interna, et constant filis quibusdam collocatis intra telescopium.

Hoc argumentum a nullo, quod sciam, huc usque latinis versibus expositum, videtur sane admodum difficile, cum oporteat exhibere constructionem, et usum tam telescopii, quam micrometri inclusi in ipso. Adhuc tamen conatus sum exhibere hic utrumque, quanquam quod ad telescopia pertinet, persequor sola telescopia dioptrica, quibus hoc micrometri genus et primo aptatum est, et communius aptari solet, licet et catadioptricis aptetur nonnunquam.

Uranie,

Uraniȩ, tute ipsa tuae cultoribus artis
Aptâsti, longos demum miserata labores,
Vitra tubo includens laevissima, filaque vitris 735
Inserta adjungens, densis lentissima spiris
Motanda, ac teretis celeri vertigine virgae,
Tu cantum, tu, Diva, rege: haud communia posco
Munera, novi equidem, audaci nimis incitus oestro,
Quando haec Aoniis celanda sororibus arma, 740
Ignotamque tuis voluisti vatibus artem
Jam dudum, ingenuo prohibens concludere versu.
Tentabo tamen, et facili si numine praesens
Adstiteris, Diva, aggrediar, numerisque coërcens
Te duce primus ego tam mira reperta Latinis 745
Adstringam, primus Parnassi in vertice sistam.
Principio 40 ȩ pura moles crystallina massa

40 Primo quidem pro telescopio dioptrico requiritur lens e vitro puro, utrinque redacta ad formam sphaericam politam. Forma sphaericae superficiei inducitur, uti supra etiam innuimus adn. 16. terendo massam vitream ope crassioris pulvisculi, et patinae sphaericae metallicae; ad poliendum autem adhibetur pulvisculus tenuissimus.

Porro debet ea lens esse ejusmodi, ut radios ab unico objecti puncto prodeuntes, quos certa lege refringendo detorquet a recto itinere, colligat in unico itidem puncto. Id praestabit, si fuerit verè lens, nimirum utrinque convexa. Verum idem praestaret, si esset etiam ex altera parte plana, vel cava, et ex altera convexa, sed convexitate haberte curvaturam majorem, sive radium suae sphaericitatis minorem, quo casu appellari solet meniscus; sed plerumque fieri solet utrinque convexa, et quidem aeque convexa. Lentes, quae habent diversas curvaturas, et menisci, habent semper lentem aequalis utrinque convexitatis, quae ipsis respondet ita, ut eundem prorsus, quem ipsae praestant, effectum praestent in ordine ad radios colligendos. Hinc loquemur de illis simplicioribus, quae habent eandem utrinque convexitatem.

Lens autem ejusmodi colligit in unico puncto radios digressos ab unico puncto obje-

Seligitur, tenui geminas cui pulvere frontes,
Aerataque domant patina, laevique papyro,
Aut molli texto lini, subiguntque, teruntque, 750
Margine dum sensim circum conrasa tumescat,
Et pelusiacam referat sub imagine lentem,
Exceptumque jubar pellucida, perque polita
Torqueat, ac certa deflexum lege refringat.
Illae aequi in formam debent tornarier orbis, 755
Et quidquid puncto radiorum effluxit ab uno,
Si satis id punctum distet procul, omne retortum
Undique lens iterum crystallina cogit, et uno
Contrahit in puncto puncti è regione nitentis:

cti, et id punctum, in quo radii colliguntur, appellatur focus. Id tamen praestat, si illud punctum objecti distet satis. Nimirum, si concipiatur ejus distantia infinita, quo casu radii advenientes ad lentem censentur paralleli; focus distat a lente satis proximè per semidiametrum ejus sphaerae, cujus curvaturam habent illae binae ejus superficies. Si autem punctum radians sensim accedat ad lentem; focus ab ea recedit ita, ut ubi illud advenit ad distantiam ad sensum aequalem semidiametro ejusdem sphaericitatis, radii exeant paralleli, foco recedente in infinitum; quod punctum radians si adhuc sit propius ipsi lenti, radii exeunt divergentes, sed minus divergentes, quam advenerint ad lentem, nimirum cum ea divergentia, quam haberent, si fuissent digressi a puncto quodam remotiore, quod Optici appellant focum virtualem.

Focus est positus *puncti e regione nitentis*, nimirum non accurate, verum quam proximè in recta, quae a punto radiante transit per medium ipsius lentis.

Quae huc usque diximus, requiruntur ad rite intelligendum hunc poëmatis locum; illud notandum praeterea, radios provenientes ab unico objecti puncto non colligi in unico punto mathematico accuratè, sed in spatiolo exiguo, quod habetur instar puncti. Prima ratio, cur non colligantur in unico puncto, est figura sphaerica, quae radios etiam homogeneos non collegit accurate in unico puncto, nec per reflexionem, nec per refractionem. Curvas, quae per refra-

Quoque

Quoque magis rutilo lens ipsa à fonte recedit, 760
Hoc citius coëunt radii, et cum maxima demum
Intersunt spatia, ac longe disjungitur aurei
Fons jubaris, vitro vix tantum distat ab ipso
Concursus rutilans radiorum, tollitur orbis
Illius à medio quantum frons extima puncto. 765
Si punctum lenti radians accesserit, et jam
Vix tantum distet, quantum haec frons extima surgit;
Tum vero procul ipse fugit concursus, et aeque
Inter se demum distantes omne recedunt
Per spatium, ac nusquam coëunt radiantia fila. 770
Hinc tibi [41] susceptum res apta reflectere lumen,

ctionem colligerent radios homogeneos in unico puncto, determinavit olim Cartesius; tum methodo multo simpliciore, et elegantiore Newtonus; sed eae non fuêre in usu, tum quia difficulter admodum induci poss'ent, tum quia unica ejusmodi curva non inservit adhuc, nisi pro radiis digressis ex unico puncto axis collocato in certa quadam distantia, pro qua ejus curvae constructio sit facta, qua distantia mutata, deberet mutari etiam illa forma curvae ipsius.

Secunda ratio est diversa natura radiorum lucis, quae constat filis diversorum colorum, et diversae refrangibilitatis, de qua proprietate luminis agemus fusius lib. V. Hinc pro radiis ab unico etiam objecti puncto egressis habetur series quaedam focorum ejusmodi, ut omnium minimè distet a lente focus radiorum violaceorum, omnium maxime focus rubeorum. Id plurimum obfuit telescopiorum dioptricorum perfectioni; et idcirco potissimum telescopia catadioptrica usque adeo perfectiora sunt communibus dioptricis. Verum recentissimum Dollondi inventum hoc malum a dioptricis etiam telescopiis avertit; is enim invenit rationem componendi unicam quasi lentem e binis vitris altero cavo, et altero convexo ita, ut omnes radii etiam heterogenei unicum habeant focum. Conjunxit nimirum vitra e massis speciei ita diversae, ut differentia refractionis radiorum rubeorum, et violaceorum sit in altera multo major, quam in altera. Sed id innuisse sit satis.

41 Hinc lens vitrea polita

Et late circum diffundere si satis amplis
Discedat vitrea spatiis a lente; videbis,
Objectae vitro molis quod singula mittunt
Puncta jubar, sese in totidem conjungere punctis 775
Protinus, atque adeo assimili sub imagine formam
Pingere, nativisque ita quaeque coloribus illic
Reddere distincta, ut nullus tam possit Apelles
In tabula, nullus spectantem ita fallere Zeuxes:
Invertit positus tamen, ut, quae dextera molis 780
Pars est, hanc latere à laevo tibi reddat imago,
In dextrum laevam pellat latus, altaque ad imum
Dejiciat, quaeque ima jacent sublimia tollat.

Hinc [42] oculi in gremio quae lens crystallina pendet,

pingit imaginem objecti satis remoti admodum vividam, et distinctam in foco, in quo singula puncta objecti ipsius pinguntur in totidem punctis: Additur autem illud satis remoti, quia, si objectum non distet magis, quam pro semidiametro sphaericitatis superficiei ipsius lentis, radii, ut diximus, non uniuntur. Ea autem imago pingitur situ prorsus contrario ipsi objecto, quia rectae lineae ductae a diversis objecti punctis per mediam lentem, quae debent determinare locos, sive puncta imaginis respondentia punctis objecti, decussantur in ipsa media lente, et post decussationem abeunt ad partes oppositas iis, quas habebant in ipso objecto.

[42] Intra oculum habetur lens quaedam, quae appellatur humor crystallinus, quae eodem pacto pingit in fundo oculi imaginem admodum distinctam, et inversam objectorum externorum. De forma oculi redibit sermo in lib. III.

Porro si humor crystallinus habet exiguam convexitatem, quod senibus potissimum solet accidere; tum radiis parum detortis, focus nimis distat, adeoque radii ipsi incurrunt in fundum oculi ante, quam uniantur. Ii, qui eo vitio laborant, dicuntur Presbytae, et ejus vitii remedium est lens convexa oculo admota, quae radios jam nonnihil introrsum colligat, et suppleat defectum exiguae illius curvaturae: qui autem opposito vitio laborant humoris crystallini nimis tur-

Transmissos

Transmissos cogit radios, et pingit in imo 785
Invertens fundo quaecumque objecta tuemur.
Quae si forte parum, ut senibus, tumet, aut nimis ipsi
Rem spectandam oculo libet admovisse, ut imago
Tendatur fundo excrescens, partesque minutae
Se mole exhibeant majori, nec tamen acrem 790
Confusae effugiant visum; lens vitrea turgens
Ante oculum solet extrorsum suspendier, ut jam
Incipiant sensim radii se flectere, et ante,
Quam se oculo immittant, ad sese accedere, in ipso
Dum detorti iterum jungant se denique fundo, 795
Nec dubium tristi fallant caligine visum.
Sic veterum monumenta virûm, confusaque scripta
Perlegimus saepe, atque exesa numismata lentem
Trans vitream simul et distincta, et mole videmus
Majore, atque oculo vix non contacta tuemur. 800
Praeterea [43] vitrea quo longius absit imago

gentis, dicuntur Myopes, et oppositum remedium adhibent vitri cavi oculis admoti: Sed hic fit mentio solius lentis convexae adhibitae a Presbytis, quia ejus generis est lens ocularis eorum telescopiorum, de quibus hic agitur, cujus lentis inferius occurrit commemoratio.

Distantia illa nimia foci, quam pro objectis quibusvis inducit exigua carvatura humoris crystallini in Presbytis, habetur in omnibus, vel etiam habetur divergentia radiorum, si objectum nimis admoveatur oculo. Hinc, ut in eo etiam casu haberi possit visio distincta, adhibetur lens convexa, et objectum ex majore illa vicinia visum apparet multo majus, quae est origo microscopiorum simplicium. Verum etiam si non ita multum admoveatur oculus objecto, potest per lentem vitream videri distinctum simul, et auctum; sed immensum esset ea omnia persequi, ad quae hic innuenda tantummodo poëticus me quidam impetus abripuit, ob nexum mutuum horum omnium inter se ita arctum.

43 Imago, quam lens efficit, eo est major, quo longius

A lente,

A lente, hoc etiam mage tenditur, & majores
Particulas rerum, disjunctas et mage pingit.
Ac reliquum 44 si fortè jubar secluditur, atque
Externum à picta removetur imagine lumen, 805
Quod reliquis Terrae deflexum à partibus, atque
Aëriis detortum auris circumvolat; ipsa
Clarior, et longe distinctior extat imago,
Nec caliganti turbantur nube colores.
Inde tubum 45 tendunt, obscuris horreat imam 810
Cui tenebris gremium; summoque in vertice lentem
Infigunt vitream, cui frons vix utraque quidquam
Turgeat, extremoque fere pingatur imago
Amplior in fundo: tubulo lens altera laevi

distat ab ipsa lente: nam rectae lineae, quae se in ipsa decussarunt, eo magis recedunt a se invicem, quo longius progrediuntnr; ac proinde caeteris paribus, eo major est imago, quo semidiameter sphaericitatis, quam habet superficies lentis est major.

44 Imago evadit multo magis distincta, si ab eo loco, in quo excipitur, excludatur omne lumen extraneum reflexum ab atmosphaera, et reliquis objectis circumjacentibus, quod lumen immixtum lumini transeunti per lentem, reddit admodum confusam, & languidam imaginem, quae quidem omnino etiam evanescit, si id lumen externum est satis vividum. Atque idcirco ad videndam ejusmodi imaginem omnino distinctam solet lens applicari ad foramen fenestrae occlusae, et excipi imago in debita distantia intra conclave penitus obscuratum.

45 Haec est potissima ratio, cur ad efformandum telescopium adhibeatur tubus, qui nimirum radios omnes externos excludat. Apponitur autem in tubi vertice lens parum admodum convexa, cujus sphaericitatis semidiameter sit ingens, et tubus sit paullo longior ea semidiametro; unde fit, ut fere in ipso ejus tubi fundo pingatur distincta, et ingens imago objecti, licet situ inverso posita. Ea dicitur lens objectiva, quod obvertatur ipsi objecto. In eo fundo apponitur lens altera multo magis convexa inclusa minore

Jungitur

Jungitur incurvis multo mage frontibus apta, 815
A picta tantum, quae distet imagine, quantum
Curvatura sui poscit turgentior orbis,
Spectantisque oculus, distincta ut forma videri
Possit, et haud dubio finitus limite margo.
Hisce [46] armis oculorum acies pervasit ad ipsum 820
Aethera, sydereosque ignes scrutata, nigrantes
Phoebeo in vultu maculas inspexit, et orbem
Falcatae varium Veneris, gnatique sodales,
Et trabeam, tardique patris socia agmina, et ipsam
Vidit adhuc rutilo cinctam diademate frontem, 825
Et celsos Lunae montes, vallesque profundas.

tubulo, quae dicitur ocularis; per quam oculus intuetur imaginem illam in fundo depictam, quam videt distinctam, et auctam, uti trans lentes satis convexas solemus gemmas insculptas intueri, et vetera numismata distincta, et aucta. Ut autem ea lens id praestet, apponitur in ea distantia ab imagine vitri objectivi, quam poscit ejus curvatura, et oculus spectatoris, nimirum pro iis, qui nec Myopes sunt, nec Presbytae, in distantia, quae citra eam imaginem respectu oculi sit aequalis semidiametro ejus curvaturae, ut ita bini foci lentis objectivae, et ocularis mutuo congruant, inter utramque lentem constituti; pro iis vero, qui sunt Myopes, vel Presbytae, in distantia paullo minore, vel majore.

46 Telescopii ope detecta sunt ea omnia, quae hic innuuntur; nimirum maculae Solis, quas viderunt Scheinerus, et Galileus, omnium primi; Venus falcata, et satellites Jovis, quae vidit Galileus; fasciae Jovis, annulus Saturni, et unus ex ejus satellitibus, quos Hugenius; reliqui quatuor ejus satellites, quos Cassinus deprehendit primus.

Sed Galileus alio telescopii genere est usus, quod quidem primo est inventum, et constat vitro objectivo convexo, et oculari concavo posito respectu oculi ultra locum debitum imagini efformandae a vitro objectivo, quae imago idcirco in eo telescopii genere nusquam habetur intra telescopium ipsum; quod quidem, praeter alia multa incommoda, reddidit ea telescopia multo minus apta ad Astronomiam excolendam, cum

Nec

Nec nocet [47] inversa teretes in imagine formas,
Aequalesque globos scrutarier; at lubet ipsas
Cum recto spectare situ, aut procul aequore in alto
Cui tuimur plenis dantes cava lintea ventis, 830
Scindentesque salum puppes, sive ardua longe
Tecta, vel errantes per pascua laeta capellas,
Aut nemorum frondes, et prata virentia, sive
Pendentes procul horrenti sub vertice rupes;
Adjunctae paribus spatiis, similesque priori 835
Binae iterum invertunt lentes, rectamque figuram
Restituunt, posituque suo dant posse videri.

At minus haec nostris sunt usibus apta; sed illud,
Quod superest, tanti pars et quae maxima Divae
Muneris, expediam, et calamo properante docebo. 840

Imo [48] qua molis gremio se sistit imago
Spectanti usque adeo propior, perque omnia visae
Assimilis formae, tenuissima tendere suerunt
Fila decussatim, et spatium praetexere inane.
Illa quidem primum figebant plurima, quae se 845
Hinc spatiis, atque hinc aequalibus intertexta

idcirco micrometrum, de quo infra, iis aptari non possit.

47 Illo genere telescopiorum, quod hic exposuimus, objecta apparent inversa, quae quidem per telescopia Galileana videntur situ directo. Sed in astris quorum figura est rotunda, id quidem nihil nocet. Adhuc tamen, si libeat restituere objectis suam directionem, adduntur duae aliae lentes vitreae, quae id praestant, quae quidem plerumque solent esse priori similes, et aequales; atque id quidem fieri solet, ubi terrestria objecta intuemur. Sed haec innuisse sit satis, quae ad rem nostram non faciunt, et proposita sunt tantummodo ex occasione agendi de micrometro; quod telescopiis aptatur, ut possit determinari locus, in quo aptantur fila, quibus id constat.

48 Fila, quae micrometrum constituunt, apponuntur in ipso foco lentis objectivae, in quo

Ferratae

Ferratae ut crates: ut retia densa, secarent.
His rerum moles metirier, et spatiorum
Mos erat in picta seriem numerare figura.
At spatii extremi restantes denique partes 850
Indicio incerto prendebant, arte nec ulla
Sat fida in tenues poterant inquirere formas.
Ipsa suis tantum non uno tempore alumnis
Uranie munus prodendum duxit, ut ingens
Ne pretium amoto vilesceret omne labore. 855
Ergo, Dea monstrante viam, nunc denique filis
Immotis, fixisque novum conjugimus, arte
Cogimus et mira lento discurrere passu,
Atque omnem visae molis peragrare figuram,
Et licet incessus lenti momenta notare 860
Singula, quaeque oculos motus tenuissima hiantes
Pars penitus fallat, deprendere, metirique.
Virga teres, tenuisque, incisis undique spiris,
In cochleam se circumagit: propellitur illo
Excipiens aequis virgam cava lamina spiris 865
Retrorsum, antrorsum motu quantumlibet, atque

pingitur imago objecti, cujus cum intercipiant eam partem, quae ipsis respondet, apparent in ipso objecto. Initio fiebat reticulum quoddam e filis pluribus se decussantibus ad angulos rectos, quo pacto totus telescopii, ut vocant, campus erat divisus in plura exigua quadrata, et ubi inter se comparabantur distantiae, vel magnitudines apparentes objectorum, numerabantur quadratula, sive filorum intervalla, quae in ea distantia, vel magnitudine continebantur.

Et quidem si ea distantia, vel magnitudo comprehenderet accurate aliquot ejusmodi intervalla, mensura habebatur accurata; verum plerumque accidebat, ut restaret aliquid ex postremo intervallo; et tum id residuum non nisi incerta oculorum aestimatione definiebatur methodo utique satis crassa. Ad amovendum id incommodum additum est

Affixum

Affixum defert filum, perque omnia pictae
Deducit sensim tenuissima puncta figurae.
Inclusumque quidem filum latet: extima sed qua
Frons educta tubo lamellae prodit, in ipso 870
Margine fixus apex pariter procurrit, et aere
Indicat inciso numeros, vertiginis orbes
Qui referunt plenos; partes cujuslibet orbis
Alter, cum tereti qui virga vertitur index,
Exhibet, et latum cum vix processerit unguem, 875
Quae filum lamella gerit, totum ille per orbem
Flectitur, ac partes signat quotcumque per omnem
Circuitum extremi libuit disponere gyri.

filis immobilibus unum, vel alterum filum mobile, quod ope cochleae promoveatur motu parallello uni e filis fixis. Applicatur enim id filum lamellae perforatae in medio, quae promoveri possit ope cochleae, et ipsum deferat, ac pluribus diversis methodis ea applicatio fieri potest. Verum illud est caput rei, ut filum motu continuo parallelo promoveri possit antrorsum, retrorsum, et percurrere totum telescopii campum; interea lamellae deferenti filum mobile adnexus est indiculus eminens extra machinulam, qua micrometrum constat, et in ipsius machinulae latere apponuntur divisiones respondentes singularum spirarum crassitudinibus, ubi indiculus ille denotat, quot integris conversionibus cochleae promotum sit filum: manubrio autem exteriori ipsius cochleae adnexus est alter indiculus, qui cum ipsa cochlea convertitur, et machinulae circulus immobilis, cujus circumferentia divisa in partes aequales quamplurimas, et denotata ab indiculo gyrante, exhibet partes revolutionum singularum.

Eo pacto exiguum intervallum crassitudinis unius spirae dividitur in tot particulas, in quot tota ejus circuli circumferentia est divisa, quod quidem, si spirae ipsius cochleae sint tenues, exiguum etiam telescopii campum dividit in partes quamplurimas, quae sensu facile percipi possint. Admodum facile cochlea fit, quae in intervallo aequali diametro campi mediocris telescopii habeat 30 spiras, et satis exigui circuli circumferentia faci-

Atque

Atque 49 hic filorum textus, lentusque meatus,
Cum res exiguas quamvis, et mole minutas 880
Prendere mensuris det posse fidelibus, inde
Ille quidem, et nomen grajo sermone recepit.
Illo etiam astrorum positus metimur, aperto
Aethere dum motus exercent acta diurnos,
Immotumque tubi subeunt quamplurima campum 885
Tempore quaeque suo: molem quoque prendimus, atque
Accessum ad Terram, et longos per inane recessus.
Nam quaecumque procul fugiunt, redeuntque, tuenti
Objectam imminuunt primum, tum deinde figuram
Rursum augent, quam si fixum concluseris inter, 890

le dividitur in 200 partes, quo pacto, campus telescopii dividitur in partes 6000, quarum binae plus contineant, quam unum minutum secundum; si campus continet minus, quam 50 minuta prima, cum haec aequentur ter mille secundis.

49 Jam superius est dictum in adn. 4. lib. I, micrometri nomen derivari e Graecis vocabulis, quibus exprimitur parvorum mensura. Porro hujus generis micrometri usus est multiplex, duo autem usus omnium potissimi hic exprimuntur.

Primo quidem ita obvertitur telescopium, ut fixa aliqua dum motu diurno promovetur, percurrat accuratè aliquod e filis fixis parallelis filo mobili, ac in ea positione figitur telescopium omnino immotum, et notatur ope horologii momentum temporis, quo illa fixa appellit ad filum medium priori perpendiculare: tum expectantur alia astra, seu fixa, seu errantia, quae subeant campum telescopii motu itidem diurno, et ad illa adducitur filum mobile ope cochleae, ac notatur momentum temporis, quo ad illud idem immobile perpendiculare appellit id astrum. Adducendo ab hoc situ filum mobile ad filum illud primum immobile, quod prior fixa percurrit, apparet, quantum illud astrum fuerit borealius, vel australius, quam illa fixa, et ex intervallo temporis inter binos appulsus ad idem filum perpendiculare immobile, et intervallo temporis, quo fixa integram conversionem absolvit, invenitur, quanto fuerit orientalius illud astrum, quam illa fixa.

H Ac

Ac filum lentis delatum motibus, omne
Discrimen visae molis, spatiique videbis.
His ergo 50 et, medium cum jam progressa triformis
Umbra Deae ad vultum devenerit, utere filis.
Ac primum, obducens quod Cynthia fronte rotunda 895
Occupat aetherei tractus, intercipe claudens
Immoto, motoque simul: mox ipsa nigrantis

Ut Astronomorum utamur vocabulis, definitur per distantiam inter filum mobile, et immobile differentia declinationis, et per differentiam temporis inter binos appulsus differentia ascensionis rectae; atque eo pacto determinatur admodum facile positio planetarum, vel cometarum, referendo eos ad fixas, quarum loca jam accurate innotescunt.

Secundus usus hic indicatus est is, quo definiuntur magnitudines apparentes eorum syderum, quae non apparent instar puncti, ut fixae, planetarum nimirum, et cometarum. Includitur discus apparens inter aliquod e filis fixis, et filum mobile ita, ut ea perradant limbum hinc, et inde, ac intervallum inter illa fila, quod deprehenditur per indiculos, adducto deinde filo mobili ad fixum, exhibet illam, quam diametrum apparentem appellamus.

Porro, quo objectum est propius, eo ejus diameter apparens est major, et quidem si exigua sit, ut accidit in planetis, est major in eadem ratione distantiae reciproca; adeoque numeri ab indiculis denotati exprimentes eas apparentes diametros, exprimunt etiam rationem inversam distantiarum.

Sunt et alii usus micrometri, sunt et alia micrometrorum filarium genera, ut ubi adhibentur fila obliqua se decussantia ad angulos semirectos: sunt micrometra ocularia, sed quae dicuntur externa, et determinant motum regulae deferentis telescopium, et propulsae exterius ope cochlearum; uti et aliud habetur genus micrometri, quod appellatur objectivum, de quo supra in adn. 40, quod filaribus micrometris praestat plurimum, ubi quaeruntur diametri apparentes, vel exiguae distantiae; sed ista non sunt hujus loci; ubi illud tantummodo versibus est expositum, quod ad rem hic pertractatam sufficit, et erat tum, cum haec scriberentur, maxime cognitum.

50 Hic jam habetur id, in cujus gratiam reliqua praemissa

Per

Per summos apices arcus traducito, et ambos
Excipe nectentem transverso tramite chordam,
Ac demum converte tubum, conclusaque fila, 900
Perque apices ambos hoc transeat, illud opaco
Adductum limbo contradat flexile dorsum,
Atque interceptam chorda metire sagittam,
Nigrantique arcu, qua is prominet, in medioque

sunt, pertinentia ad telescopium, et micrometrum: collocandus est discus Lunae inter aliquod e filis fixis, et filum mobile, ad habendam diametrum apparentem Lunae: tum eodem pacto capiendum est intervallum inter binas illas cuspides, in quibus circulus umbrae secat discum Lunae, quae sunt quaedam velut cornua ejus partis Lunae, quae remanet lucida: id intervallum est illa, quam Geometrae dicunt chordam arcus intercepti inter ea cornua, qui est arcus et Lunae, et umbrae: sed ad illam rite capiendam oportet, ut bina illa fila fixum, et mobile, quae debent transire per illas cuspides, seu per illa extrema puncta hujus chordae, habeant directionem ipsi perpendicularem, quod facile praestatur efficiendo, ut transeat per ipsa filum aliquod perpendiculare filo mobili. Demum converso instrumento per unum quadrantem, ita constitui debet micrometrum, ut e duobus filis parallelis, mobili, et fixo, alterum transeat per ipsa cornua, et alterum contingat circulum umbrae, quem quidem continget ibi, ubi is maxime recedit ab ipsa chorda; ac eo pacto determinabitur illa, quam Geometrae vocant sagittam ejusdem illius arcus circuli umbrae, quam intercipit discus Lunae, et cujus illa secundo loco assumpta erat chorda, quae sagitta metitur spatium, quo arcus ipse ultra suam chordam procurrit.

Hisce observationibus institutis habebitur tota diameter umbrae comparanda cum diametro Lunae. Nam in omni circulari arcu demonstrant Geometrae, esse ut sagittam ad dimidiam chordam, ita hanc ad reliquam diametrum, nimirum toties contineri sagitam in dimidia chorda, quoties haec continetur in ipsa reliqua diametro jacente ultra chordam ipsam. Quare habita sagitta, et dimidia chorda ex observationibus tertia, ac secunda, habebitur per regulam auream reliqua illa pars diametri umbrae, quae addita ipsi sagittae exhibebit totam diametrum; et

H 2 Plusquam

Plusquam alibi à recto sinuatus calle recedit. 905
Haec ubi jam perfecta sient, tum denique certa
Fas erit umbriferi ratione agnoscere coni
Transversus quantum ductus procedat, et orbem
Quae via per medium recto se tramite ducat.
Nam quoties repetita aequarit chorda sagittam 910
Dimidia, haec toties repetita aequabit, opaci
Orbis quod medio latitat de tramite, et ultra
Chordam ipsam oppositas longe pertingit ad oras.
Jam medio calli invento componere mensos
Ni pigeat Divae vultus, manifesta patebunt 915
Omnia, et, umbriferum ter pene extendier orbem,
Percipies, tantum, quantum frons ampla triformis
Excurrit Divae, ac medio se tramite pandit.
Quaeque locis îsdem cono mensura nigrantem
Claudenti Terraï umbram debebitur, illam 920
Praebebunt numeri Phoebes nigrantis in umbra.
Quin 51 et, si propior tum forte accesserit imae
Telluri Titan, vel fugerit altior Axe

cum habeatur ex prima observatione diameter apparens Lunae, innotescet, an ea ad diametrum umbrae habeat eam rationem, quam debet habere ad diametrum sectionis coni umbrosi Terrae, quae ratio est circiter subtripla. Invenietur autem ita esse, ac idcirco inde innotescet, umbram, quam Luna subit in eclipsibus, esse revera umbram Terrae.

Praescribitur autem illud, ut haec observatio fiat, cum jam umbra devenerit ad medium discum Lunae, ut nimirum arcus circuli umbrae, qui in Lunam incurrit, non sit ita exiguus. Maximus is erit, ubi chorda transiens per illa cornua, fuerit ipsa Lunae diameter. Verum haec omnia, quae in hac adnotatione sunt dicta, multo facilius intelligerentur ope schematis geometrici.

51 Ope micrometri non solum invenietur crassa quadam aestimatione ratio fere tripla diametri umbrae ad diametrum Lunae, sed ipsa diameter um-

Cynthia,

Cynthia, comperies nigrantem adstringier orbem:
Contra si Phoebus consurgat in aethera, vel si 925
Telluri propior Phoebe meet; amplior idem
Laxabit gremium, et distento margine crescet.
At citius propiore Deo coit umbrifer ipse
Conus, et adstricto brevior se limite gyrus
Contrahit, ac Terris quo Diva remotior errat; 930
Hoc apici propior summo breviora nigrantis
Per spatia umbraï traducitur, et minus amplum
Permeat, atque arctis conclusum finibus orbem.
Quid, quod 52 et obscuri medium deprendere gyri
Fas erit, ac positum ad radiantes aetheris ignes 935
Exigere, et certa Coeli in regione locare?
Huic medio positus communis habebitur, atque
Umbriferi medio coni, ac regione videbis
Una, eademque simul concurrere semper utrumque.
Scilicet oppositas Phoebo se conus ad oras 940
Dirigit assurgens Coelo, et contraria acuta
Cuspide signa petit, punctum directus in illud;

brae invenietur diversa pro diversis circumstantiis: ea erit minor caeteris paribus, ubi Sol fuerit propior Terrae circa suum perigeum, vel Luna remotior circa suum apogeum, prorsus ut theoria requirit; quo enim Sol est propior Terrae, eo conus umbrae est brevior, adeoque arctior in eadem distantia a Terra; et quo Luna est remotior a Terra, eo est propior apici coni, adeoque pergit per partem ipsius tenuiorem.

52 Poterit ope ejusdem micrometri determinari etiam locus ipse centri illius umbrosi circuli, qui in Luna apparet, cum innotescat, quantum, et in qua directione id punctum distet a media chorda: invenietur autem, eum locum esse illum ipsum, qui debetur puncto axis coni umbrosi Terrae assumpto in ea distantia ab ipsa Terra. Nam is axis dirigitur ad partes oppositas centro Solis, cum jaceat in recta transeunte per centra Solis, et

Quo secat à Phoebi medio per viscera Terrae
Intima productum Titania semita callem:
Ast ipsum et medius punctum tenet umbrifer orbis.
Nonne vides notas ardere per aethera flammas (945
Astrorum, et rutilis fulget quae fascia signis?
Illa viam Phoebi signat tibi. Tempore quovis
Nôsti etiam, qua parte meet Titanius ignis,
Quodque adeo opposita punctum respondeat ora, 950
Designare tuens poteris: quod si ardua Phoebe
Immineat capiti, et dorso Telluris ab alto
Illa ipsa regione Poli spectetur, ab imo
Qua medio spectanda foret, tum prorsus eidem
Congruere invento puncto; at demissior illa 955
Obliquo cum despicitur tibi tramite, et imum
Visae errore viae ad limbum demittere sese
Creditur aetherei tractus, errare videbis
Tantundem pariter, mediam ac demittier umbram.
Ergo 53 etiam certis constat tibi denique signis, 960
Cur subita et Phoebe quondam ferrugine vultum
Inficiat, qua se, dum deficit, abdat in umbra.

Terrae. Licet autem designare oculo viam Solis, sive eclipticam, cum appareant fixae, et nota sit ejus positio ad fixas; cumque constet, in quo puncto eclipticae tum sit Sol, invenietur punctum illi oppositum comparandum cum centro circuli illius umbrosi.

Illud tamen hic additur, in eo puncto eclipticae visum iri illud punctum axis umbrosi Terrae, et illud centrum circuli umbrosi apparentis in disco Lunae, si Luna sit in ipso zenith, ubi videri debet in eadem directione in qua videretur e centro Terrae; sed cum illa distat a zenith, parallaxis deprimet nonnihil utriusque puncti locum apparentem, cum, uti supra etiam diximus, parallaxis objecta deprimat.

53 Exposita jam causa defectus etiam Lunaris, ad ejus confirmationem quandam his

Verum

Verum age, quo, posita penitus formidine, mentem
Firmare, atque fidem possis adhibere canenti
Certius, et causas in aperta luce videre, 965
Contemplare vigil mecum, quae tempora poscant,
Quos nexus inter Phoebi, Divaeque labores
Hae causae, quinam constet defectibus ordo.
Namque ubi cognôris, quidquid deduxerit inde
Judicio mens usa acri, se prodere id ipsum 970
Suspectantûm oculis, fierique illo ordine eodem;
Tum vero manifesta fides, et ponderis ingens
Accedet nostris vis ultima denique dictis.

Principio 54 nunquam fraterno Diva carebit
Lumine, ni fuerit nodo, mediaeque viaï 975
Proxima, dum Phoebo adversa volat aetheris ora;
Nec rapiet terris missas à fratre sagittas,
Et rutilam nigro praetexet lampada velo,
Alterutri propior fuerit nisi Cynthia nodo, (980
Dum fratrem assequitur, Coeloque vagatur eodem.
Inde autem et mediam bijugos cum forte per umbram
Egerit, haud iterum tenebris nigrescet obortis,

additur id, quod attinet ad ea tempora, quibus eclipses debent haberi ex theoria, quae cum inveniantur, observationibus conformia, ipsam theoriam confirmant.

54 Primo quidem nunquam habebitur eclipsis vel Lunae, vel Solis, nisi Luna fuerit satis proxima alterutri e binis suis nodis in plenilunio pro eclipsi ipsius, et in novilunio pro eclipsi Solis. Id quidem patet, cum in majore distantia a nodis debeat distare etiam ab ecliptica, adeoque evitare umbram, vel Solem.

Inde autem deducuntur hic plura, primo quidem illud, si Luna in aliqua eclipsi transeat per mediam umbram Terrae, non posse haberi aliam eclipsim Lunae, nisi post sex menses lunares, ubi nimirum post sex novilunia advenerit novum plenilunium, quod a priore illo

Sexta nisi aptârit fronti jam cornua, jamque
Oppositum pleno prope nodum effulserit orbe.
Praeterea tristi nunquam ipsa nigrescet ab umbra 985
Mense latens medio, primo quin mense vel ante,
Continuo vel post, fratrem vel tempore utroque
Occulat, atque aliqua Terrae pro parte recondat.
Vix etiam plenus fugere, atque evolvier annus
Vix poterit, bis fulgentem quin lampada condat 990
Cynthia, bisque suos vultus demergat in umbra,
Quondam autem ter fratrem uno velabit in anno,
Ter sua vel subitis ipsa obruet ora tenebris.

Atque 55 ea, si fratris cursum, cursumque sororis,
Nodorum et positus, motumque per aethera, quantum
Et calli inclinet Phoebeo se via Phoebes, 995
Qua tumeat tristis conus, qua Cynthia mole,

ecliptico plenilunio distat per sex lunares menses. Deinde illud, nunquam haberi posse eclipsim Lunae in plenilunio, nisi vel in praecedente, vel in sequente novilunio, vel in utroque habeatur eclipsis Solis pro aliqua parte Terrae. Demum, singulis fere annis debere haberi duas eclipses Solis, et duas eclipses Lunae; habebuntur autem aliquando etiam tres eclipses utriusque eodem anno.

55 Proponuntur hic ea, quae inter se comparanda sunt ad demonstranda ea theoremata: sunt autem motus Solis, et Lunae, positio, et motus nodorum orbitae lunaris, inclinatio orbitae lunaris ad eclipticam, diameter apparens sectionis coni umbrosi Lunae, ac Solis. Ea omnia hic comparabuntur aliquanto crassius per numeros rotundos de more. Integrum, ac ingens volumen requireretur ad pertractanda ea omnia, quae huc pertinent, pro dignitate, et omnes casus evolvendos cum accurata determinatione pro singulis.

Hoc autem ordine progredior: propono primum inclinationem orbitae lunaris; tum ab ipsa deduco distantiam, quam Luna habet ab ecliptica pro data quavis sua distantia a nodo: deinde propono illud, haberi eclipsim, si in oppositione cum Sole haec distantia sit minor, quam summa semidiametrorum Lunae, et um-

Titanisque

Titanisque orbis, recolas, et mente revolvas,
Componasque simul, certa ratione patebunt.
In primis [56] tantum Phoebeo se via Divae 1000
Inclinat calli accedens, ut flexus in ipso
Nodorum nexu integri de partibus orbis
Sextam bissenis vix quidquam excedat, et inter
Connexos arcus, curvataque crura receptet.
Inde autem [57] facili poteris deducere pacto, 1005
Quod sequitur, medio fraterni à tramite cursus
Vix mage, bissenis quam parte e partibus una,
Disjungi Phoeben spatii, quo Diva recedit
A nodo propiore sibi, nexuque tenaci.
At si eadem [58] minus a Phobeo tramite distet, 1010
Quam tumeat coni simul, et simul ipsius orbis
Dimidius, cono frontem demerget opaco
Parte aliqua saltem, et tristi nigrescet ab umbra.

brae ; determino hasce semidiametros, unde eruitur distantia a nodo, quae inducit eclipsim Lunae, ut innotescat, quod sit intervallum, in quo si contingat plenilunium, debet haberi eclipsis.

56 Primo loco hic proponitur inclinatio orbitae, quae est paullo major quinque gradibus; continetur enim inter gradus 5, et gradus 5, ac 18 minuta. Exprimuntur gradus 5 per partem sextam unius e duodecim partibus totius circuli ; nam pars duodecima sunt gradus triginta, quorum pars sexta sunt ipsi gradus 5.

57 Inde colligitur, centrum Lunae distare ab ecliptica paullo plus, quam parte duodecima ejus intervalli, quo distat a nodo propiore : nam in angulo graduum quinque distantia laterum a se invicem est paullo plus, quam pars duodecima lateris utriuslibet ; est nimirum quam proximè pars $\frac{1}{11\frac{1}{2}}$.

58 Jam vero si distantia centri Lunae ab ecliptica momento, quo ipsa est in oppositione cum Sole, quo nimirum respondet e regione centri sectionis coni umbrosi, est minor, quam summa binarum semidiametrorum ipsius Lunae, et

Quindecies

Quindecies [59] e bissenis si partibus unam
Aetherei gyri in quatuor discerpseris; illa 1015
Occupat hanc ipsam gremio protensa tumenti.
Ter tantum conus distenditur: accipe utrinque
Dimidium; e tricies bissenis partibus orbis
Una tibi aetherei obveniet, qua [60] parte viaï
Fraternae si forte soror minus absit, in oras 1020
Progressa eoas pleno cum lumine fulgens
Assequitur conum adversa e regione tumentem;
Incurret, tenebrisque genas perfundet opacis.
Ergo minus [61], quam bissenis, si partibus illis,
Seu bis qnindenis parte una e totius orbis, 1025
A nodo Phoebe distet propiore, nigrantis
Dum positum assequitur coni; turpata tenebris
Ardentes merget bijugos, currumque nitentem.
Ast eadem distet si longius, effugit umbram,
Et coni occursum elabens declinat opaci. 1030

umbrae, debet incurrere in umbram ipsam; nam duo circuli, quorum centra distant a se invicem minus, quam per summam suarum semidiametrorum, debent necessario superponi parte sui.

59 Videndum nunc, quanta sit summa harum semidiametrorum. Diameter Lunae est circiter dimidii gradus, quae est pars quarta unius e quindecies bissenis; nam 15×12 sunt 180, adeoque ejusmodi pars totius circuli, sunt duo gradus, et hujus pars quarta est dimidius gradus. Diameter umbrae est circiter tripla. Quare ambae diametri simul sunt duorum graduum, adeoque semidiametri simul sunt unius circiter gradus, qui est pars una e tricies bissenis, cum 30×12 sint 360.

60 Si igitur Luna in plenilunio distet ab ecliptica minus, quam uno gradu, habebitur eclipsis ex adn 58.

61 Habebitur igitur eclipsis, si Luna tum distet a nodo minus, quam 12 gradibus; nam per adn. 57 distantia ab ecliptica est circiter pars duodecima distantiae a nodo. Porro gradus 12 sunt etiam pars una e bis quindenis, sive e trigin-

Mense

Mense novo [62] contra fugientem Cynthia fratrem
Cum demum assequitur, multò si longius ipsis
Distet adhuc nodis, poterit praetexere dorso.
Partem aliquam extremis rutila de lampade terris.
Terraï à medio [63] nam suspectantibus, ignem 1035
Parte aliqua saltem Phoebeum objecta recondet,
Ejus si medium fraterno à tramite tantum
Abfuerit, quantum orbe suo fraterque, sororque
Dimidio latè turgent, quantum aetheris abdunt.
Quod si defectum Terrae tuearis ab ora 1040
Marginis extrema ad Boream vergente, vel Austrum;
Praeterea tantum poterit distare, per auras
Avecta ad Lunam Tellus quantum ampla pateret,
Dimidia qua mole tumet, deque aetheris alti
Obtegeret gyro condens. Nam Cynthia limbum 1045
Phoebei vultus extremo margine tantum
Dum condit, media Coelum è Tellure tuenti,

ta partibus totius circuli, cum 30 x 12 sint 360, et hic erit limes distantiae eclipticae.

Revera is est limes proximus non accuratus, qui quidem nec semper est idem, cum varietur pro varia inclinatione orbitae, et varia magnitudine diametrorum apparentium Lunae, et umbrae; sed hic limes proximus tantummodo, et crasso etiam modo definitus, abunde sanè est pro poësi, quae severiores calculos non admittit.

62 Fit jam hic transitus ad definiendos limites eclipticos pro eclipsi Solis, qui sunt, aliquanto laxiores.

63 Primo quidem si spectator sit in centro Terrae, limes pro eclipsi solari erit ejusmodi distantia Lunae ab ecliptica in conjunctione cum Sole, quae aequetur summae semidiametrorum Lunae, ac Solis.

Quod si is situs sit in extremo Telluris margine; poterit Luna distare adhuc magis ab ecliptica, nimirum adhuc tantum quamproximè, quanta esset semidiameter apparens Terrae elatae ad Lunam. Id quidem ope Geometriae facile perspicitur; hic autem ejus theorematis demonstratio

Si

Si quantum à medio extremas Telluris ad oras
Eſt ſpatii, tantum ſubito percurrat, et inde 1050
In latus ad Boream, aut abducta recedat in Auſtrum,
Quod praeſtat, praeſtabit adhuc, limbumque nitentem
Fraterni vultus, mediis velut ante tegebat,
Extremis pariter terris teget uſque, Boreo
Quae procul hinc, ſive inde Auſtri ſub cardine torpent.
At ſibi [64] biſſenis tricies e partibus orbis 1055
Aetherei prope dimidiam Latonia poſcit,
Tranſverſa qua mole patens tumet integra: Phoebus
Dimidiam pariter, Telluſque, avecta per auras
Ad Lunam, geminas ferme occupat. Omnibus unam
Collectis ergo in ſummam, de partibus illis 1060
Tres fiunt, ſive integri de partibus orbis
Biſſenis decima; ac fraterno à tramite proinde

hoc pacto proponitur.

Concipiamus, Lunam ſpectatori poſito in centro Terrae vix quidquam obtegere ex diſco apparenti Solis, ſive apparere in ejus contactu: ſi ipſa moveatur in latus in eandem plagam in Coelo aeque, ac ſpectator in Terra a centro Terrae ad marginem ipſius Terrae, adhuc illi ſemper apparerет itidem in contactu. Revera deberet moveri ipſa aliquanto minus in eadem ratione, in qua eſt propior Soli, quam Terra; ſed cum diſtantia Solis ſit pluſquam tercentum vicibus major, quam diſtantia Lunae a Terra, illud ſpatium, per quod Luna debet moveri in latus, ut ſervet eandem poſitionem, eſt ad ſenſum aequale illi ſpatio, per quod movetur in latus obſervator, nimirum tantum, quanta eſt ſemidiameter Terrae eo tranſlatae.

Quare diſtantia centri Lunae ab ecliptica pro limite eclipſeos ſolaris eſt ſumma ſemidiametrorum apparentium Solis, ac Lunae, et ſemidiametri apparentis, quam haberet Terra in Lunam tranſlata, et hinc viſa; quae quidem eſt eadem, ac ſemidiameter apparens, quam habet Terra viſa e Luna, quam Aſtronomi dicunt itidem parallaxim horizontalem Lunae.

64 Horum omnium colligi-

Ejuſdem

Ejusdem decimae partis Latonia distet
Particula si dimidia ; Titania condet
Extremis saltem Terraï partibus ora. 1065
Bissenis [65] tum ferme îsdem propiore, necesse est,
Absit ut a nodo spatiis mage, scilicet una
Aetherei decies binis e partibus orbis,
Bisve novem, quarum totus circum arduus aether
Bissenas decies ter vasto amplectitur orbe. 1070

Haec [66] tibi si perspecta fient, jam caetera nullus
Evolvisse labor: sponte inde sequuntur, et acri
Se sistunt animo, ac mentem praesentia pulsant.
Dum nempe à Phoebi congressu Cynthia, sive
Nigrantis coni occursu digressa pererrat 1075
Totum orbem, atque adiens rursum nova cornua sumit,
Vel rursum oppositas pleno nitet ore per auras,

tur jam summa : diameter Lunae, et diameter Solis sunt proximè dimidii gradus singulae, diameter autem Terrae avectae ad Lunam est circiter duorum graduum : hinc omnium ejusmodi diametrorum summa est circiter graduum trium ; adeoque summa semidiametrorum unius gradus cum dimidio.

Fere semper parallaxis illa horizontalis Lunae est aliquanto minor uno gradu, adeoque Terra avecta ad Lunam occupat minus, quam duos gradus; sed diameter Solis est semper, diameter Lunae plerumque, major dimidio gradu. Hinc ea se plerumque satis compensant, et aliquando etiam accuratè.

Porro tres illi gradus sunt pars decima partis duodecimae totius circuli ; nam pars duodecima suut gradus 30.

65 Ex distantia centri Lunae ab ecliptica colligitur distantia a nodo, illam multiplicando per 12 juxta adn. 56, quo pacto habentur gradus 18, qui sunt pars una e decies binis, sive e viginti partibus totius circuli, cum 18 χ 20 exhibeat 360 ; et sunt bis novem ex iis partibus, quarum circulus integer ter continet decies bissenas, sive continet semel 30 χ 12, vel 360.

66 Definitis hoc pacto limitibus distantiae a nodo pro eclipsi tam lunari, quam sola-

Ipse

Ipse etiam interea Titan progressus Olympo
Mutavit sedem, atque una de partibus orbis
Bissenis, signi aut spatio radiantis in ortum 1080
Processit ferme, occiduas et nodus in oras
Vicenis rediit signi de partibus una.

Scilicet [67] hinc, si fors nodo concursus in ipso
Accidat, et fratrem condat soror, ipsa vel umbram
Per mediam curru tendat turpata nigranti, 1085
Alter succedet congressus, cum procul inde
Distabit Phoebe paullo majore, per Axem
Quam quo se spatio bissex fulgentibus unum
Porrigit è signis; tantundem rursus in ortum
Procedet novus, atque novus concursus, eodem 1090
Et spatio occiduas nodus retrahetur in oras.
Ergo congressu in sexto jam denique nodus
Occurret Coeli oppositis in sedibus alter,
Perque viam Phoebi paullo se transferet ante
Cynthia, quam medium fratris, conive nigrantis 1095

ri, progrediendum hic ad demonstranda ea, quae proposita fuerant in adn. 54.

Dum Luna ab uno vel novilunio, vel plenilunio progressa in orientem devenit ad alterum novilunium, vel plenilunium; interea Sol progreditur itidem in orientem fere per duodecimam partem totius eclipticae, sive per unum signum: nam mensis Lunaris est circiter dierum $29\frac{1}{2}$, et Sol, qui diebus $365\frac{1}{4}$ percurrit gradus 360, percurrit singulis diebus fere unum gradum, adeoque mense integro lunari paullo minus, quam 30 gradus, quos continent singula zodiaci signa. Nodus autem interea regreditur juxta adn. 44. lib. I, atque id per unum circiter gradum cum dimidio, quae est pars vigesima unius signi sive graduum 30.

67 Quamobrem si quoddam novilunium, vel plenilunium, sive conjunctio quaedam, vel oppositio acciderit in ipso nodo, sequens novilunium, vel plenilunium accidet in puncto paullo magis remoto ab eodem

Transcurrat

Transcurrat medium, et vel Phoebi conteget ignes,
Ipsa vel horrenti currum demerget in umbra.

Praeterea 68 et coni ad medium si appellit in ipso
Alterius nodi nexu, vel proxima nodo, (1100
Cynthia, per mediamque umbram traducitur; ante
Mense novo, pariterque novo post mense coibit
Cum fratris curru, opposito sat proxima nodo,
Parte aliqua ardentes ut possit condere vultus.
Nam nodum si Diva tenet contraria Phoebo, (1105
Nodum itidem huic nodo oppositum regione tenebit
Phoebus in adversa Coeli simul: illa per orbem
Excurrit prope dimidium ter quinque diebus,
Dum conum assequitur nigrantem, fratre relicto,
Vel cono progressa fugit, fratrique propinquat.
Interea ad nodum accedens, fugiensve relictum 1110
A tergo, Phoebus quindenis partibus illis
Progreditur, quarum senas quater integer orbis
Quindecies habet, ac concursu proinde in utroque

nodo, quam per unum signum, additis nimirum simul arcu, per quem progressus est Sol, et arcu, per quem regressus est nodus: haec distantia a nodo duplicabitur in secundo mense lunari, triplicabitur in tertio, et ita porro. Quare post menses lunares sex fiet conjunctio, vel oppositio in puncto remoto a priore nodo paullo plus, quam per sex signa, adeoque paullo ultra nodum oppositum, qui semper distat a priore nodo per scemicirculum, sive per sex signa, quod congruit cum iis, quae dicta sunt in adn. 43. lib. I. Quamobrem habebitur ibidem altera eclipsis Solis in novilunio, vel Lunae in plenilunio.

68 Quod si plenilunium accidat in ipso altero nodo utrolibet, vel admodum prope ipsum; Luna et in praecedenti, et in sequenti plenilunio erit satis proxima nodo opposito ad inducendam eclipsim alicui Terrae loco. Nam dimidiae Lunationi debentur circiter dies 15, quibus Sol discedit a nodo circiter per 15 gradus, qui sunt

Tantundem

Tantundem à nodo distant fraterque, sororque,
Nempe minus, novies binis quam partibus îsdem, 1115
Queis quando distant, rutilos haec illius ignes
Occulit, atque aliqua Terrae pro parte recondit.
Cum vero 69 novies binis si Cynthia Phoebo
Juncta vel hinc illis, vel partibus inde recedat
A nodo, ardentes vultus tegat: occupat illud 1120
Infestum terris spatium, Phoeboque tegendo
Aptum ter ternas partes quater: atque adeo cum
Per mensem bisquindenis abscedere tantum
A nodis Titan possit; transcurrere utrumvis
Is nodum haud poterit, quin ipsum Cynthia toto 1125
Orbe peragrato adveniens obducat; at ipsam
Quod spatium Phoeben tristi demergat in umbra,
Bissenis tantum cum partibus extet utrinque;
Per nodum poterit sese traducere, in illo
Quin spatio accurrens à tergo Diva ruentes 1130

ejusmodi partes, ut earum quater senas, sive 24, circulus integer contineat quindecies, nam 15 X 24 sunt 360. Hinc tam in praecedenti, quam in sequenti novilunio fiet conjunctio cum Sole in puncto distante a nodo minus, quam 18 gradibus, qui est limes superius constitutus pro eclipsi solari.

Id quidem hic expressum est; addi potest illud, si lunaris eclipsis acciderit satis ante appulsum ad nodum, tum eclipsim solarem debere tantum subsequi; si post appulsum, praecedere; nam in primo casu distantia a nodo proximo, ad quem Sol tendit, debuit esse adhuc major in lunatione praecedenti per alios circiter 15 gradus, et in secundo distantia a nodo, quem jam fugit, debet esse major in lunatione sequenti per alios itidem circiter 15 gradus, adeoque major 18 gradibus.

69 Duo hic deducuntur, primo quidem, circa singulos nodos debere haberi aliquam Solis eclipsim, ubi Sol ad eos appulerit, posse autem nullam haberi eclipsim Lunae. Nam singulis mensibus Lunaribus Solis motus a nodo est circiter 30 graduum, et spatium illud,

Immittat

Immittat bijugos umbrae, et turpata nigrescat.
Atque ubi cum Phoebo concursus habebitur ipso
In nodo, nodive plaga in propiore; nigranti
Tum qui cum cono occursus praecesserit ante,
Tum dein succedet qui mox, distabit ab ora 1135
Oppositi nodi mage, quam spatia illa requirant,
Queis Dea sordenti caput abdere possit in umbra,
Proin poterit Phoebi vultus obducere Diva,
Ipsa licet tristi non se demergat in umbra. 1140

His [70] animadversis, jam quae memoravimus ante
Prona tibi fient, ac debita tempora disces.
Primum etenim semper Titan bis quolibet anno,
Partem aliquam rutilae frontis velante sorore,
Deficiet; neque enim senis congressibus unquam
Esse locus poterit, quin sit, qui proxima nodo 1145
Obtineat, distetque minus, quam infesta requirant
Telluri loca, Phoebeis defectibus apta.

quod inducit aliquam eclipsim, est graduum 36, cum sit graduum 18 hinc, et inde a nodo. Quamobrem non potest Sol per id spatium transire, quin eum alicubi in ipso assequatur Luna; et novilunium celebret eclipticum. Gradus autem 36 exprimuntur per illud *ter ternas partes quater*, nam $3 \times 3 \times 4$ sunt 36. Deinde habetur illud, posse Lunam transilire in plenilunio nodum utrumvis sine sua eclipsi, cum spatium inducens ejus eclipsim sit 24 graduum, nimirum 12 hinc, et totidem inde a nodo, et inter bina pleniluniorum proximorum loca intercedant 30 circiter gradus diversae distantiae a nodo.

Quin immo si eclipsis Solis accidet in ipso nodo, plenilunium praecedens, et sequens accidet in distantia graduum circiter 15 ab eodem nodo, quae distantia est major, quam illa 12 graduum necessaria ad inducendam eclipsim. Inde autem consequitur, circa singulos nodos debere omnino haberi aliquam eclipsim Solis, sed posse non haberi eclipsim Lunae.

70 Hinc autem jam pronum est plura consectaria deducere, quae id evincant, quod supra adn. 54 fuerat propositum.

Bissenos saltem congressus semper in anno
Phoebus habet quovis cum Phoebe: bis soror ergo
Fraternam quovis frontem velabit in anno. 1150
Quod si etiam primus nascentis origine in anni
Congressus fiat, fratrem obducente sorore,
Ante tibi adveniet, post sextum sextus ab illo,
Tertia Phoebeae et referet velamina fronti,
Quam se bissenis evolvat mensibus annus: 1155
Namque soror Coelum bis denis orbibus ambit,
Acceditque dies bisquinis una diebus
Praeterea, Titan uno dum circuit orbem
Signiferum gyro, et perfectum terminat annum.
Quin et, cum geminis possit congressibus idem, 1160
Qui sibi succedant porro, se Phoebus in umbra
Condere parte sui, veluti memoravimus; ille
Quarto etiam, aut quinto primum si mense recondat
Bis sese, se rursum anno celabit eodem,
Cum decimus mensis devenerit, undecimusve, 1165
Terque uno rutilam frontem praetexet in anno.

Primo quidem, saltem bini defectus Solis habebuntur singulis annis. Nunquam enim poterunt haberi 6 novilunia, sine ulla eclipsi; cum nimirum aliquod ex ipsis noviluniis saltem postremum, debeat accidere prope alterum e nodis in distantia minore, quam quae requiritur ad eclipsim. Sunt autem singulis annis saltem duodecim novilunia; adeoque saltem duo erunt ecliptica.

Quod si paullo post anni initium habeatur novilunium eclipticum, habebitur et alterum post sex lunares menses, tum, et tertium post alios sex, quorum postremus finietur ante finem anni, cum singulis annis habeantur lunares menses 12, et praeterea circiter 11 dies. Adeoque habebuntur tum tres eclipses solares in anno, quod quidem potest accidere etiam ex eo, quod in binis noviluniis se immediate consequentibus habeatur eclipsis, cum ni-

Ipsa

Ipsa etiam poterit post senos Cynthia menses
Frontem iterum tenebris involvere, terque in eodem
Quondam anno ipsa etiam poterit se condere in umbra,
Si prima, et media, atque extrema in parte recondat.
At quoniam brevius nodos circumjacet ipsi (1170
Infestum Phoebae spatium; quondam accidet olli,
Occursum fugiat coni nigrantis ut inter
Oppositus geminos, nodum quo tempore conus
Transiliit, perque illa ferat se proxima nodo, 1175
Atque infesta Deae loca, nigrantesque tenebras,
Nec tum, per quinos nec dein Latonia menses,
Oppositas fratri, timeat, dum permeat oras.
Hinc erit, ut geminos Luna squalente per illum
Oppositus annum haud videas. Sed saepe tenebris 1180
Illa etiam inficiet frontem, Phoebusque latebit
Saepe etiam, quin se Divaeque, Deique labores
Exhibeant tibi spectandos; si scilicet infra
Telluris magnae gremium, infra Tartara, et imos
Elysii campos Coeli regione feratur 1185

mirum spatium inducens eclipsim solarem sit majus, quam spatium, quo duo novilunia se continuo excipientia distare possint. Sic si in initio et fine quarti, et quinti novilunii habeatur eclipsis, habebitur etiam omnino in fine decimi, vel undecimi, adeoque habebuntur tres eodem anno.

Deinde lunaris eclipsis haberi poterit initio anni, tum post alios sex menses lunares, ac deinde tertio post alios sex, ante anni finem. Verum cum spatium inducens eclipsim lunarem sit tantummodo graduum 24 minus intervallo inter bina plenilunia, quod est circiter graduum 30; poterit transilire Luna nodum alterum, celebratis binis pleniluniis hinc, et inde ab ipso in distantia majore, quam quae requiritur ad eclipsim, et tum poterit elabi annus integer sine binis Lunae defectibus.

Aversa à nobis, quam suspicit India felix,
Oceanusque patens, et, ditibus aurea venis
Viscera, quae occiduis America ostentat ab oris.
Tum populi aspicient Phoeben, Phoebumque nigrantem
Opponunt nostris sua qui vestigia plantis. 1190
Phoebum etiam et nostra Terraï ex parte videbunt
Deficere hinc variae gentes, aut inde; nitebit
Ille tibi, ut supera monui, exemploque probavi
Principis, ardentem condit cui purpura Solem,
Dum famulos feriunt radii; atque interfita nubes 1195
Quaesiti aspectum rapiet tibi saepe laboris.
Haec reputa, et memori solers sub pectore versa,
Ne, Coelo, ne forte putes contraria quondam
Accidere his ipsis, modo quae deduximus, atque
Quas dedimus causas, ne credas falsus inanes. 1200
  Praeterea [71], has ipsas si mente revolvere causas
Haud pigeat, disces, cur non in partibus isdem
Astriferi callis nigrescat Cynthia semper,
Nec semper vultus fraternos condat in isdem,
Quoque locus motu radiis infestus, in oras 1205
Quasque abeat, priscas repetat quo tempore sedes.

71 Inde patet etiam, cur eclipses tam Solis, quam Lunae non semper celebrentur in iisdem punctis eclipticae, et qui sit punctorum eclipticorum motus, quae periodus.

Eclipsis non fit, nisi prope nodos: nodi autem in singulis lunationibus regrediuntur ita, ut integrum circulum absolvant post annos circiter 18; adeoque, et loca, in quibus eclipses fiunt, regredientur ita, ut post annos 18 eodem redeant. Quin immo post annos 9 celebrabuntur eclipses in eadem Coeli parte, cum post dimidiam periodum motus nodorum alter e nodis eo deveniat, quo prius fuerat alter, adeoque eclipses ad ipsum pertinentes debeant fieri ibi, ubi fiebant eclipses, pertinentes ad nodum praecedentem.

Scilicet

Scilicet alterutri fuerit nisi proxima nodo,
Nec tenebris squalere potest, nec Cynthia fratrem
Abdere: at occiduas nodi retrahuntur in oras,
Nec nisi dum novies binis novus additur annus 1210
Ad veterem redeunt positum, sedesque relictas.
Ergo etiam locus ille, Deam qui mergat in umbra,
Quique tegi vultum Phoebi sinat: ibit in oras
Ipse quoque occiduas, lustris et quattuor annus
Cum deerit, refluae lentum vertiginis orbem 1215
Perficiet, Coeloque iterum se reddet eodem.
Quin et cum medium jam gyrum absolverit, atque
Alterius nodi sedem jam ceperit alter,
Tum quoque nigrantem conum pervadet in isdem
Diva locis, fratremque plaga velabit eadem. 1220
Ast idem [72] sedes repetet cum nodus easdem,
Ipse etiam motu Divae se cursus eodem
Diriget in Boream pariter, vel flexus in Austrum.
Cumque et vecta fuga tum Cynthia tendere eadem
Debeat (emenso post tot discrimina eundem 1225
Bis positum toto Divae nam semita Coelo
Acquiret rursum, quique eminet arduus alto

72 Una periodus motus nodorum, quae est annorum 18, aequatur fere binis periodis motus apogei lunaris, quae requirunt annos plus quam 18, et minus quam 19. Hinc post 18 circiter annos et orbita lunaris, et nodi redeunt fere ad eandem positionem. Verum paullo post absolutos 18 annos, paullo ante, quam nodi redeant ad eandem positionem, et paullo post, quam apogeum ad eandem positionem redeat secunda vice, habentur et novilunia, et plenilunia fere in eadem distantia tam a nodis, quam ab apogeo, unde oritur periodus quaedam paullo longior 18 annis, quae continet lunationes 223, et post eam periodum aberrationes motuum lunarium redeunt fere eaedem; ac ejusmodi periodum obser-

Vertice apex contorti axis, Phoebenque moratur,
Restituet sese, atque eadem prope signa reviset)
Rerum eadem facies consurget, priscus et ordo, 1230
Cum prope tersenis nova jam se adjunxerit aestas.
Ast ubi post denos nonus vix coeperit annus,
Ante suis penitus nodorum vincula quam se
Restituant punctis, pene aeque proxima eidem
Nodo sive jubar plenum induet, atra silebit 1235
Sive Polo latitans, post quam tribus acta per auras,
Et bis centenis, et bis Latonia denis
Jam vicibus, fratrem convenerit, oppositove
Tot pariter vicibus jam plena effulserit Axe.
Hinc eadem fratris defectibus, atque sororis 1240
Tum prope jam series rursum se reddet, eadem
Atque iterum Coeli parti, formaque redibunt.
At quoniam 73 his demum salebris emersimus, illud

vationum lunarium primus omnium aggressus est Halleyus, ex qua pro sequentibus periodis desumi possunt correctiones tabularum ita, ut loca Lunae obtineantur admodum accurata, ingenti et Astronomiae, et Geographiae, et Nauticae bono.

Numerus 223 admodum dilucidè, et vero etiam poetico stylo exprimitur per illud *tribus, et bis centenis, et bis denis.*

Si superiorum motuum desiderentur accuratiores numeri, periodus nodorum est ex elementis Caillii an 18, dier. 224, hor. 5, quod exprimitur per illud, *dum novies binis novus additur annus*: periodus apogei lunaris est an. 8, dier. 309, hor. 8, min. 20 adeoque duo ejusmodi periodi sunt an. 17, dierum 254 proximè, quae cum simul nondum adaequent unam periodum nodorum, idcirco tempore unius nodorum periodi apogeum Lunae non redibit accurate ad idem Coeli punctum, sed ad ulterius quodpiam, et idcircò dictum est *Restituet sese, atque eadem prope signa reviset*, addito illo *prope*. Menses lunares 223 requirunt quam proxime annos Julianos 18, dies 14. Idcirco dictum est *ubi ter sextus se vix evolverit annus*.

73 Exposita causa, et limitibus, ac periodo eclipsium, hic postremo loco proponitur dis-

Accipe

Accipe, quod facili praesentes numine Musae
Expediunt, Pindique pater de vertice Phoebus 1245
Ipse suo pandit plectro, fidibusque canoris.
Scilicet immensi quicunque e partibus orbis
Suspiciunt Phoeben cum deficit, atque nigrantes
Obducit tristi turpans caligine currus,
Unum omnes, et idem spectant simul: omnibus una 1250
Pars tegitur nitidi vultus, et tempore eodem
Incipit obscuro frons prima nigrescere velo
Omnibus, aut penitus perfundi desinit, atque
Incipit educi simul omnibus; et fugit umbram
Progressa, ac pleno rursum nitet ore per auras. 1255
Atque hinc proh quanti Terrae mensoribus, atque
Immensa incerto tranantibus aequora cursu
Proveniunt usus, vento procul acta tumenti
Cum ratis ignotas errat male tuta per undas!

crimen inter eclipses Solis, ac eclipses Lunae, quod sternit viam ad exponendum ingentem ipsarum eclipsium usum in Geographia, et arte nautica. Nimirum singula phaenomena eclipseos lunaris eodem modo fere accuratissime eodem momento temporis apparent spectatoribus omnibus constitutis in toto eo hemisphaerio terrestri, cui Luna est conspicua; at in Solis eclipsi eodem momento temporis alii spectatores longe aliud vident, quin immo aliis eodem momento temporis Sol latet totus, aliis totus cernitur sine ulla eclipsi, ut diximus ad v. 3.

Ratio discriminis est manifesta, quia nimirum eclipsis Lunae est defectus luminis in ipsa Luna immersa in conum umbrosum Terrae, quem idcirco omnes simul vident, qui Lunam vident; at eclipsis Solis est defectus luminis emissi a toto disco Solis, vel ab aliqua ejus parte, et intercepti a Luna interposita, quae visa e diversis punctis superficiei terrestris refertur ad diversa loca regionis solaris.

Incipitur autem hic a Luna, et nominantur initium, ac finis eclipseos, et illae, quas appellant phases, nimirum partes disci lunaris, obscuratae,

Telluris 74 faciem in longum partimur, et oras 1260
Inus in Eoas, totumque absolvimus orbem.
Tendimus in latum à medio circum undique, quartam
Et gyri partem ad Boream, aut numeramus ad Austrum.
A medio in latum si noveris ire., vel ora (1265
Quantum opus in longum a certa, ut pertingere possis

quae definiri solent per partes diametri Lunae, quam astronomi, ut et Solis diametrum, pro hisce phasibus exprimendis dividunt in duodecim digitos.

74 Proponitur, quid sit longitudo, et latitudo geographica: prior excurrit per totum aequatoris circulum in orientem, posterior per quadrantem circuli hinc, et inde in Boream, vel Austrum versus alterum e polis. Nimirum in globo Terrae habentur bini poli, ut in Coelo, circa quos fit motus diurnus, quorum alter dicitur borealis, et alter australis. Ab iis aeque distat circulus ille maximus conversionis diurnae, quem lib. I. adn. 24, diximus appellari aequatorem. Omnes semicirculi, qui abeunt ab altero polo ad alterum, dicuntur meridiani; et eorum aliquem ad arbitrium selectum Geographi appellant primum meridianum, plerumque autem solet esse is, qui transit per insulam Ferri, quod apud Gallos lege statutum est pro Geographis omnibus. Meridianus loci cujuspiam, ut Romae, vel Londini est is, qui transit per ipsos polos, et eum locum, et determinat tam longitudinem, quam latitudinem geographicam ipsius loci; nam longitudo geographica dicitur arcus aequatoris, qui excurrit a primo meridiano in orientem usque ad meridianum loci; latitudo autem geographica dicitur ille arcus ejusdem meridiani, qui jacet inter aequatorem, et ipsum locum, ac est distantia ipsius loci ab aequatore assumpta in superficie Terrae per arcum circuli maximi perpendicularem ipsi aequatori: ipsa latitudo dicitur borealis, vel australis, prout locus respectu aequatoris jacet ad Boream, vel ad Austrum.

Longitudo, et latitudo, quae in Terra assumuntur respectu aequatoris, in Coelo assumuntur respectu eclipticae numerando longitudinem a principio Arietis, et quae ad aequatorem eodem modo referuntur, dicuntur ascensio recta, ac declinatio, quod hic innuo ad indicandam diversam eorumdem nominum significationem hic pro Geographia, et superius adn. 18, pro Astronomia.

Ad

Ad loca Terraï quaevis; qua pingitur omnis
Sive globo tereti Tellus, planave papyro;
Illa etiam dabitur reliquis adjungere, vel si
Jam picta extiterint, radio signare licebit.
In latum 75 a medio quantum locus absit, opacam 1270
Ardua per noctem qui sydera cardinem ad altum,

(Porro cognita longitudine) et latitudine loci facile est invenire punctum in globo geographico, vel mappis, ad quod is locus pertinet, cum in globo habeantur semper delineati aequator, et plures meridiani, et in mappis etiam particularibus habeantur itidem lineae, vel saltem numeri, per quos longitudo, et latitudo determinentur, quae idcirco ibi facile inveniuntur pro quovis loco, qui existat in ipsa mappa.

75 Innuuntur hic methodi determinandi latitudinem loci cujuspiam, quod quidem praestatur admodum facile. Primo loco proponitur illud, latitudinem loci aequalem esse altitudini poli supra horizontem, qui hic appellatur *limes Coeli*, nimirum nobis conspicui; idem autem a latinis dictus est *finitor*, quod visum finiat: Id theorema notum est ipsis Geographiae Tyronibus. Latitudo loci est, uti diximus, distantia loci ab aequatore computata in arcu meridiani terrestris, quae quidem habet eundem graduum numerum, quem in Coelo distantia puncti respondentis ipsi loco ad verticem, sive zenith, ab aequatore coelesti, qui iminet ad perpendiculum aequatori terrestri. Porro tam a zenith ad horizontem, quam a polo ad aequatorem sunt gradus 90, sive quadrans circuli: Hinc ablato communi arcu a zenith ad polum relinquitur distantia poli ipsius ab horizonte aequalis distantiae zenith ab aequatore, adeoque altitudini poli.

Si igitur observetur, quae sit altitudo poli supra horizontem, invenitur latitudo geographica loci. Porro id facile praestatur ope instrumenti astronomici cujuspiam, quo determinetur, quot gradibus et minutis sydus aliquod elevetur supra horizontem, vel distet. Si enim accipiatur aliqua fixa polo proxima, et determinetur ejus altitudo supra horizontem, tam maxima, cum ascendit supra polum, quam minima, cum descendit infra; media inter ipsas erit altitudo poli.

Quin immo facilius praestatur id ipsum per unicam observationem vel stellae cujusvis, vel etiam Solis, qua inveniatur ejus distantia a zenith;

Suscipiat,

Suſpiciat, circa quem ſe convertit Olympus
Aſtrifer, inveniet, ſpatium metitus ab imis
Quo ſydus terris, Coelique à limite diſtet.
Namque idem aetherei cardo quot partibus orbis 1275
Tollitur à media Terrae regione, tot ille
Ipſe locus diſtat terreſtris partibus orbis.
Quin et idem in medio radiantia ſydera Coelo,
Quaelibet, ipſe die medio et Titanius ignis (1280
Praeſtat idem, immoto ſi quantum à cardine, quantum,
Noveris, et Coeli ſupremo à vertice diſtet.
Nam noſces, quantum cardo diſcedat ab alto
Vertice, ſeu Terris quantum conſurgat ab imis.

At quantum 76 in longum certa à regione recedat
Quisque locus; ſubiens umbram, fugiensve docebit
Cynthia; ſi qua ſe mergat pars quaelibet hora, (1285

ipſum autem zenith ego Coeli verticem appello, deſignans polum nomine cardinis, licet Virgilius polum ipſum verticis nomine deſignarit, eſt ſane ipſum zenith Coeli vertex reſpectu loci, qui ſibi id punctum videt ad verticem imminens. Sed oportet aliunde noſſe ex aſtronomicis tabulis diſtantiam ejuſdem aſtri a polo, quae pro fixis vix quidquam mutatur ad ſenſum intra annum, pro Sole mutatur quidem plurimum; ſed ad uſus nauticos habentur pro ſingulis diebus computatae, et in tabulas redactae, declinationes Solis, quarum complementa ad gradus 90 exhibent diſtantias a polo.

Porro diſtantia illa a zenith capienda eſt, ubi aſtrum appellit ad meridianum; tum enim in eodem meridiano computantur omnes ejuſmodi diſtantiae; et cum innoteſcat diſtantia aſtri a zenith per obſervationem, et a polo per tabulas, innoteſcit diſtantia quoque poli a zenith, adeoque ejus reſiduum ad gradus 90, quae eſt altitudo poli, et exhibet latitudinem loci.

Corrigenda eſt etiam obſervatio a refractione, quae omnia objecta coeleſtia elevat, et quidem habentur tabulae ad id ipſum computatae; ſed in ipſis verſibus praecipua tantummodo quaedam capita attigimus.

76 Longitudo geographica loci cujuſpiam facile definitur per

Qua

Qua nitidi vultus pars cono emergat , utroque
Obſervata loco, et deſcripta agnoveris: horas
Namque die à medio numerare ſolemus, et horis
Omne quater ſenis Titan revolubile Coelum 1290
Immani luſtrat gyro: proin Memnonis oris
Qui propior, plures horas numerabit eodem
Tempore, nam citius Phoebeos excipit ignes
E medio viſi curſus , citiusque diei
Principium à medio ponit labentibus horis . 1295
Horarum numeros confer, diſcrimen in illis
Deprenſum ad partes motus transferre diurni
Ne pigeat: partes ipſae dant noſcere, quantum
Is locus in longum abductus mage diſtet ad Eurum,
Qui plures horas numerat, dum Cynthia quavis 1300
Parte ſui triſtem Terrae ſubit, aut fugit umbram.
Idcirco et 77 maculis Divae turpantibus ora,

obſervationem eclipſeos lunaris, ſi ea obſervatio ſimul inſtituta fuerit in eo loco, cujus longitudo quaeritur, et in alio quopiam, cujus longitudo jam innoteſcat. Satis eſt conferre inter ſe horas aſtronomicas eorum locorum, quibus horis obſervatum eſt initium, vel finis, vel certa phaſis eclipſeos. Horae enim ſingulorum locorum numerantur ab Aſtronomis incipiendo a meridie loci ad meridiem: porro meridies citius accidit regionibus orientalioribus, cum Sol ad earum meridianum citius appellat. Hinc eodem momento temporis plures horas numerat locus ſitus in meridiano terreſtri orientaliore; et proinde differentia horarum exhibet differentiam poſitionis meridianorum, adeoque differentiam lugitudinum.

Satis eſt ad id reducere differentiam temporis ad partes aequatoris, quod facile itidem fit. Cum enim Sol 24 horis totum diurno motu abſolvat circulum, nimirum gradus 360; debentur ſingulis horis gradus 15, adeoque unus gradus reſpondet 4 minutis, unum minutum quatuor ſecundis, et ita porro.

77 Initium, et finis eclipſeos, difficilius ſatis accuratè determinari ſolent ob confuſum umbrae terreſtris marginem, qui obſervationem turbat, potiſ-

(Nam

(Nam turpant vultum longe, lateque per omnem
Disperfae hac, illac) seu partibus acrius igne
Phoebeo rutilis, dederunt sua nomina, et ingens 1305
In Lunae vultu Sapientum, protulit aetas
Quos haec nostra recens, quos protulit illa vetusta;
Turba sedet, maria alta fluunt, jacet insula ponto
Plurima, et abrupti procurrunt aequore montes.
Haec tuimur, dum nigranti merguntur in umbra, 1310
Dumque iterum emergunt, ac nomina certa notamus,
Credimus et fidae longum servanda papyro.
Qui vero 78, tumidis errat jactatus ab undis,

mum, ubi non videtur simul ingens arcus ipsius umbrae. Phases etiam difficulter admodum intra satis arctos temporis limites observantur, potissimum si Luna non incedat, nisi per marginem umbrae terrestris, quo casu lente admodum aliquanto post initium, et ante finem phases augentur, et minuuntur. Hinc potius adhibentur immersiones, et emersiones macularum Lunae, per quarum plures cito admodum transit margo umbrae: sunt autem multae ejusmodi maculae in Luna, quae ope telescopii admodum distinctae apparent, sive sint particulae quaedam ejus superficiei obscuriores, sive lucidiores; nam utrumque genus macularum nomine denotatur.

Hae maculae aliis nominibus appellatae sunt ab Hevelio, aliis a Riciolio: sed hujus nomina jam passim ab Astronomis adhibentur, quae fere omnia desumpta sunt ab hominibus, qui doctrinae fama innotuerunt vel apud Veteres, ut *Plato*, *Aristoteles*, *Aristarchus*; vel apud recentiores, ut *Copernicus*, *Tycho*, *Galileus*. Ampliores maculas ipse appellavit maria, ut *Mare serenitatis*, *mare Crisium*; et insulas quoque habet, ut *Insulam sinus medii*; ad quae hic nomina alluditur.

78 Quando non habentur binae observationes institutae in binis locis, sed unica in uno loco ignoto, alterius observationis vices supplet calculus ex tabulis astronomicis initus, cujus ope scire possumus, qua ora loci cujuspiam noti, uti Londini, vel Parisiorum, id Phaenomenum, quod observatur, debeat accidere; conferendo enim horam ejusmodi cum hora loci, in quo observatio instituitur, determinatur longitudo ejus loci, cujus latitudine pariter determinata per me-

Praestat

Ille sibi visam, dum Cynthia deficit, horam
Horarum numero confert, quem tempore eodem 1315
Per loca cognorit numerandum certa (labores
Namque Deae multo edocti jam novimus ante,
Urbibus et certas certis praedicimus horas),
Quoque natet pelago, et pelagi qua parte, latentes
Quos fugere expediat scopulos, quo vertere proram, 1320
Novit, ad optatam et victor delabitur oram.
Praestat idem 79, quae turba Jovem comitatur euntem:
Namque Jovis pariter comites, Dominumque tenebris
Affundunt saepe objecti, et Titana recondunt,

thodos superius expositas, invenitur positio ejus loci ignoti; et eo pacto navis delata per procellam ad partem Oceani quamcumque, si eclipsim aliquam ibi habeat, potest nosse, ubi sit, et reliquum cursum dirigere.

Haec quidem methodus vix ullius usus esse poterat ante perfectam Astronomiam, cum initium, et finis eclipseos notata in ephemeridibus intra dimidium etiam quadrantem, eoque amplius aberrarent a veris, singula autem minuta temporis possint errorem secum trahere 15 milliariorum geographicorum in positione loci. Sed jam lunaris theoria ita perfecta est, quemadmodum diximus libro I. adn. 48, ut intra satis arctos limites loca Lunae determinentur, et proinde eclipsium quoque phaenomena praedicantur.

Binae difficultates remanent, phaenomeni raritas summa, et difficultas summa observandi, potissimum in mari. Sed raritas suppletur per alia phaenomena, quae etiam intra multo arctiores limites, et multo certius observari possunt; ac difficultatem ea observandi in mari nuper sustulit, vir summi ingenii, et industriae summae, Dominus Irwin, per sellam ita in navi suspensam, ut observationes per majora telescopia, et Dollondianum micrometrum, ac per alia instrumenta inter ipsam jactationem aeque facile, et accurate in ipso mari institui possint, ac in terra, teste inter alios Sissono, qui ejus ope plurimas observationes instituit, inter quas diametrum apparentem Solis saepe iteratis vicibus assumpsit sine unius minuti secundi discrimine.

(79 Eclipses Satellitum Jovis multo aptiores sunt ad determinandas longitudines; tum quia sunt frequentiores, tum quia

Saepe

Saepe ipsi opposita Domini conduntur in umbra: 1325
Dumque umbram subeunt, dumque egrediuntur ab um-
Tempora si sua quaeque notes, discrimina certa (bra;
Horarum certos positus dant nôsse locorum.

Phoebum etiam [80] cum Diva tegit, si tempora signes,
Queis oculos pars quaeque fugit, deducere fas est 1330
Inde etiam certos positus, sed longa laborum
Taedia, multum artis ratio haec exposcit, et acre
Ingenium, ac dextram facilem, laevemque papyrum.

multo certius determinantur, potissimum eclipses intimi satellitis, cujus theoria est multo magis perfecta, ut ejus eclipses jam praenunciari possint citra errorem fere unius minuti, et velocitas motus est tanta, ut multo minus incertum observatorem reddat de momento phaenomeni; porro is non solum eclipsim patitur in umbram Jovis incurrens, sed et in ipsum Jovis corpus umbram projicit, quae longioribus telescopiis deprehendi potest; in singulis autem conversionibus defectum patitur, quae conversiones breviores sunt duorum dierum intervallo.

Adhiberi possunt etiam eclipses aliorum satellitum, potissimum secundi, etiam in mari, si calculus e tabulis initus corrigatur per praecedentes observationes; possunt autem adhiberi etiam conjunctiones cum Jove, et conjunctiones intimi satellitis cum reliquis quorum & theoria est minus accurata, motus est lentior; ut idcirco in Jovis satellitibus non rara, sed admodum frequens habeatur occasio longitudinis determinandae, quod ut etiam in mari fieri jam possit, debet Irwino Geographia, ex cujus sella, primo, quod sciam, in mari eclipses satellitum Jovis sunt observatae, et longitudo per illas determinata, quod quidem ipse cum Sissono praestitit pluribus vicibus.

Haec methodus deficit per binos circiter menses singulis annis, per quos Jupiter post Solem latet; at praeterquam quod ingens est sane commodum posse longitudinem determinare in medio mari per decem singulorum annorum menses, habentur et alia observationum genera, quae perpetuo usui esse possunt, de quibus mox agemus.

80 Solis eclipses itidem ad longitudinum determinationem adhibentur, determinando initium, finem, phases; sed eae

Haud

Haud etenim variis eadem ſpectamus ab oris,
Atque loco quondam totus dum conditur uni, 1335
Idem alibi totus Titan, ceu diximus ante,
Emicat, et radiis ardentibus imbuit auras.
Hic ergo[81] terrarum orbem et vaſta aequora, et urbes,
Oppidaque, et montes, ſylvasque, amnesque papyro
Pingunt in laevi, vertiginis atque diurnae 1340
Compreſſos orbes, obliquo et tramite viſos;
Hiſce alios addunt tranſverſos, cardine ab uno

adhiberi non poſſunt, eodem modo, quo eclipſes Lunae, cum non eodem momento ea accidant pro diverſis Terrae locis; quin immo, uti diximus, alicubi totus Sol deficiat, dum alibi ſpectatur totus. Quamobrem plurimae requiruntur reductiones ad eam rem.

81 Innuitur conſtructio generalis eclipſium ſolarium, quam debemus Dominico Caſſino. Delineatur circulus, qui referat peripheriam circuli Terreſtris terminantis hemiſphaerium viſum e centro Solis. In eo deſignantur loca binorum polorum Terrae projectorum in ejus planum, tum projectio circulorum per ipſos tranſeuntium, et deſignantium horas ad quinos ſaltem gradus, ac parallelorum pertinentium ad id hemiſphaerium, quae fere ſemper ſunt ellipſes praeter unicum omnium horariorum medium, qui meridiem deſignat, et abit in rectam lineam. Apponitur recta itidem linea, quae exhibet viam ejus puncti, in quo incurrit in idem planum recta ducta per centrum Solis, et Lunae, in quo puncto centrum Lunae appareret ſpectatori poſito in Sole: id punctum eſt centrum umbrae, vel penumbrae lunaris, in quo qui exiſtit, videt Solis eclipſem centralem; prout autem inde locus quivis magis, vel minus diſtat, minorem, vel majorem videt obtectam Solis partem; ac ex aſtronomico calculo innoteſcit nexus inter determinatas diſtantias ejuſmodi, et partes diametri ſolaris deficientes.

Ei lineae rectae adſcribuntur numeri, qui exprimant horas loci cogniti, pro quo calculus eſt inſtitutus, et concipiuntur loca Terrae motu diurno delata per illas parallelorum ellipſes, quarum quae cuivis loco conveniat, innoteſcit, ſi innoteſcat ejus loci latitudo.

Si jam innoteſcat ipſius loci etiam longitudo, innoteſcet

Cardinem

Cardinem ad oppositum qui tendant, atque fluentes
Indigitent horas: accedit semita, Divae
Qua medium Titan per Terram incedere ab alto. 1345
Prospicit, ac numeri signantes temporis horas.
Quaeque loca obliquos cursu delata per orbes
Cum medio Phoebes descripti ad tramitis oram
Quamlibet appellunt simul, his tum Cynthia dorso
Praetexit medio medium Titana; recedunt 1350
Quae certis illinc spatiis, sub fronte nitenti
Certa parte vident Phoebum sordere nigrantem.
Discimus hic, quo [82] quaeque loco servanda, locisque

differentia ejus meridici a meridie loci, pro quo calculus est institutus, adeoque ejus hora pro quavis data hora loci ejusdem, et idcirco ejus positio in suo parallelo respondens positioni centri umbrae mobilis, et distantia, ac ex ea solaris eclipseos quantitas, quae idcirco praenunciari potest: erit autem centralis in iis locis, quae delata per suos parallelos appellunt simul cum centro umbrae mobilis ad aliquam intersectionem viae rectilineae ejus centri, et paralleli ipsius loci, pro quo loco distantia illa erit nulla.

At si loci longitudo non innotescat, observata autem sit phasis; ex hora observationis innotescit positio ipsius loci in suo parallelo cognito ob cognitam ejus latitudinem; et ex distantia a centro umbrae debita ei phasi invenitur positio ipsius centri umbrae in sua illa semita, quae exhibet horam loci cogniti, pro quo calculus est institutus, et constructio facta, adeoque differentiam horarum loci cogniti, et incogniti, et inde longitudinem loci incogniti.

Sine constructione generali habentur methodi, per quas, data phasi observata, et latitudine loci, ac hora observationis pertinente ad ipsum, et datis elementis eclipseos ex calculo instituto per tabulas astronomicas pro dato quodam loco, invenitur longitudo loci observationis.

82 Hisce methodis perfecta est jam plurimum Geographia; sed multum adhuc itineris superest, ad absolutam ipsius perfectionem. Id autem sperandum jam non ab eclipsibus tantum, sed multo magis a quotidianis Lunae observationibus; nam ejus distantiae a Sole, et a fixis, si satis accurate determinentur, rem prae-

Servata ignotis componimus, eruimusque,
Qua nostri regione globi stent singula: quin et 1355
Contingent quaecumque olim post saecula longa,
Queis Phoebe Terris Titanem, quaque recondet
Parte sui, jam nunc, quaque hora cuilibet urbi,
Novimus, et tanto certi praedicimus ante,
Excutimusque metum monitis, caussasque latentes 1360
Pandimus, atque animi motus cohibemus inanes.
Felices anni, felicia saecula, caussas
Tantarum queis posse datum cognoscere rerum?
Ast [83] olim haud vulgi tantum inscia corda, sed illos

stare possunt: et quidem, si calculus uno minuto non aberret in loco Lunae, quo jam deventum esse diximus libro I, intra triginta geographica miliaria definitur etiam sine correspondente observatione longitudo loci, in quo observatio est instituta.

Hujusmodi distantiae observandae occurrunt, quotiescumque habetur Luna supra horizontem: adsunt instrumenta, quibus eae observari utcumque possint etiam in mari, ut sunt quadrantes reflexionis, sed eorum ope res perficitur intra limites multo laxiores: ex sella Irwiniana commodissimè delicatissimis etiam instrumentis res perficitur. Saepissime autem Luna transit tam prope aliquam e fixis satis lucidis, ut Dolloncíano micrometro discerni possint una cum ipsa Luna, et tunc Irwiniana machina summi erit usus, phaenomenum accuratissimè determinans: quae quidem machina, si et satellitum Jovis, et positionis Lunae ad fixas habeatur ratio, non rarum admodum, sed frequentissimum habebit usum; quanquam in hoc secundo casu pluribus astronomicis calculis opus erit, ut ex observatione eruatur longitudo. Calculos instituere ad praedicendam horam phaenomeni observandi, id quidem pertinet ad Astronomiam; machinam vero invenire, qua observatio accurata fieri possit etiam in mari, ad Mechanicam, nec alterum sine altero ullius est usus pro determinanda longitudine in mari. Qui hoc secundum praestet, dimidium praestat eorum, quae ad tantum artis nauticae bonum requiruntur. Hoc secundum Irwino deberi probant testes observationum institutarum, quos inter Sissonus imprimis.

[83] Absurdas Veterum quo-

Saepe etiam latuere, quibus mens fervida, et acre 1365
Ingenium, qui Naturae secreta latentis
Assueti, caecosque aditus pervadere, et imis
Eruere è latebris verum: nec defuit, aut [84] qui
Diceret, occludi spirantia protinus ora,
Queis emissa solet lux alma erumpere, seu [85] qui, 1370
Extinctos quondam *dimittere*, diceret, *ignes*
Tempore Titanem *certo*, *recreareque lumen*,
Cum loca praeteriit flammis infesta per auras,
Quae faciunt ignes interstingui, *atque perire*.
Sic [86] alii Phoeben puro dixere nitentem 1375
Lumine, parte cava tantum, partique nigrantem
Convexa, et subito hunc Terris obvertere, Coeloque
Ardentem vultum, subitis cum mergitur umbris.
Atque [87] aliquis, gignique novum, veteremque perire,
Censuit, et Phoebi, et Phoebes, cum deficit, orbem. 1380
Quid [88] vero ignarum vulgus? quae turpia monstra

rundam Philosophorum sententias de eclipsibus collegit Ricciolius Almagesti lib. V. cap. 1, quorum nonnullae hic commemorantur.

84 Ita Anaximenes de Luna, Anaximander de Sole.

85 Lucretius lib. V.

86 Heraclitus in ea sententia fuit.

87 Xenophanes id est arbitratus.

88 Nunc etiam in pluribus Asiae partibus idem est mos ingentem ciendi strepitum tempore eclipseos lunaris, ut apud Ricciolium ibidem, putante vulgo, Lunam ab horribili dracone devorandam, nisi is eo strepitu perterrefactus aufugiat. Apud veteres magicis incantationibus eam de curru deducendam, credebatur, nisi fragor ejus aures obtunderet. Plurima suppetunt apud veteres potissimum poëtas loca, quae eo respiciant, quorum sane multa collegit ibidem Ricciolius eruditissimè de more: ejusmodi est illud Tibulli, lib. I. el. 8.

Cantus et e curru Lunam deducere tentat;
Et faciat, si non aera repulsa sonent.

Credidit

Credidit immensum late vulgata per Orbem !
Dum nempe è nitido Lunam deducere curru
Thessala tentat anus cantu, rhombumque potentem
Circumagit, miseram nequidquam tendere contra, 1385
Nequidquam obniti, vacuas nisi pulsa per auras
Aera sonent, cantusque negent audire timendos.
Saepe igitur totas fama evulgata per urbes
Nocte volat media, Lunae nigrescere frontem.
Excurrunt matres tectis, juvenesque, senesque; 1390
Fit clamor, pelves, et tintinnabula tota
Urbe strepunt, montes late, campique resultant.
Illi instant, *surdasque Deae nituntur ad aures*
Thessalicum ne carmen eat, neu cogat Olympo
Delabi invitam, sacris et adesse nefandis. 1395
At Phoebum, subitis cum Terras obruit umbris,
Aspectumque negat populis, scelerata perosum
Consilia, infandas caedes, et mille per Orbem

Martialis, lib. IX. ep. 22.
Quae nunc Thessalica Lunam deducere rhombo,
Quae sciet?

Juvenalis Satyra VI. de muliercula garrula.
Verborum tanta cadit vis,
Tot pariter pelves, et tintinnabula, dicas,
Pulsari. Jam nemo tubas, atque aera fatiget:
Una laboranti poterit succurrere Lunae.

In aestu scribendi adhibui Petrum Apollonium: habentur duo hemistichia, quae ibidem in fine ejus loci Excidii Hierosolymitani. olim legeram, pertinentia ad

Commissus ad astra
Clamor iit, quantum pavidae succurrere Lunae
Certantes populi tinnitibus aeris acuti
Ingeminant, surdasque Deae, nituntur, ad aures
Thessalicum ne carmen eat.

Horrendas labes, infestam avertere frontem,
Et clades, olim et ventura ostendere damna. 1400
Sic quondam *extincto miseratum Caesare Romam*,
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit,
Impiaque aeternam timuerunt saecula noctem.
Non [89] tamen haec semper vanae deliria mentis:
Adfuit illa dies, qua summo ex aethere Titan 1405
Dum videt infami pendens de stipite Numen,
Horrendum scelus, et caedem aversatus iniquam,
Involvit caeca attonitos caligine vultus. (que
Tempore quanquam illo Tellus quoque, et ardua quae-
Culmina terrificis meritum testata dolorem: 1410
Motibus, ipsa etiam vasti tumida aequora ponti,
Atque omnis caesum ingemuit Natura Tonantem.
Oh, caecas hominum mentes! oh pectora dura
Heu nimium, durasque super durissima cautes!
Natura ingemuit: disrupta cacumina summis 1415
Montibus; ipsa altis emissa cadavera bustis:
Ast unum mortale genus nil vulnera curat,
Flagitiis inflicta suis, Numenque peremptum:
Quin etiam scelera ingeminat. Nec terra dehiscit
Abrupta violenter humo! nec fulmina ab alto 1420
Ingeminata ruunt, summosque evertere montes,
Et properant meritis Tellurem involvere flammis!
Quo tamen abripior? non hoc mihi Divus Apollo,
Uranie nec movit opus; pars multa laboris
Restat adhuc: fas interea consistere fessum, 1425
Et vocem reparare, novasque resumere vires.

89 Hujusce libri finis recitatus Romae in Arcadum conventu penultima hebdomada Quadragesimae, hoc episodium accepit tempori idoneum.

FINIS LIBRI II.

DE

DE SOLIS AC LVNAE DEFECTIBVS.

LIBER III.

HACTENUS in medio cur Sol, cur aurea quondam
Deficiat cursu Phoebe, et ferrugine multa
Involvat nitidos puro vel in aethere vultus:
Nunc age [1], velati nigrantem lampada Solis
Quae tenuis circum lux ambiat; unde repente 5
Exiliant toto radiantia sydera Coelo;
Cur penitus merso tenebris Titane, per auras
Nox plena atratis non protinus evolet alis;
Cur, medio Phoebi vultu latitante, serena
Plena dies niteat fronte, intactumque tuenti 10
Exhibeat jubar, expediam, causasque latentes
Protinus evolvam, primaque ab origine pandam.
Phoebe [2], tibi obducta effusi jam fronte capilli

[1] Proponuntur praecipua capita argumenti, quod hoc libro pertractatur; pertinent autem omnia ad eclipses Solis: quid sit lumen quoddam, quod Solem ambit in totalibus eclipsibus penitus delitescentem: cur in eclipsi totali Solis appareant stellae interdiu: cur tum non habeatur nox obscurissima, sed quoddam velut crepusculum: cur dimidio etiam Sole delitescente, vix ullum detrimentum luminis sentiatur, die adhuc admodum clara, fere ut prius.

[2] In invocatione innuuntur eorum phaenomenorum causae.

Si ſpargunt coeleſte jubar, ſi lumine tanto
Sydera, quae condis praeſens, rutilare per umbram 15
Merſus aquis, tectusve Polo permittis, et idem,
Dum procul et campos, et craſſas aëris auras
Irradias, reflua perfundis luce tenebras,
Dimidiaque licet velatus fronte, rigentes,
Quantum fas, oculo fibras diſtendis in imo; 20
Huc ades, et trepidum praeſenti numine vatem
Uſque rege, atque novas in carmina ſuffice vires.

Si quondam Terris [3] propior dum Luna ſub alto
Fratre meat, medium ſubeat, penituſque recondat;
Vix bene Phoebei ſeſe pars ultima vultus 25
Abdidit; aethereas longe, lateque per oras,
Per circumpoſitos tractus maris, ardua perque
Culmina, per valleſque imas, camposque patentes
Protinus incerto mixtae pallore tenebrae
Funduntur, rapiuntque diem: ſe prodit ubique 30
Illa eadem rerum facies, quae veſpere ſero,
Occiduas feſſos cum jam demerſit in undas
Quadrijugos Titan; nec dum tamen aethera in altum
Evexit bijugos, nec dum Nox horrida fuſco

Illud lumen circa Solem, oſtendetur infra, provenit e ab atmoſphaera Solis, quae concipitur, ut Phoebi coma: aſtra ſub aſpectum venirent ſemper, niſi nimia Solis luce obruerentur per diem: lumen ſolare reflexum ab aëre circumjacentibus regionibus imminente, quibus eclipſis non eſt totalis, crepuſculum parit in ipſa totali eclipſi: nimia vis luminis a dimidio etiam Sole emiſſi ita tendit oculorum fibras, ut majore lumine vix tendantur magis: omnes ejuſmodi cauſae ad Phoebum pertinent, qui invocatur.

[3] Phaenomena eclipſeos ſolaris enumerantur: pallor crepuſcularis: aſtra clariora ſe prodentia, exigua enim ne tum quidem in conſpectum veniunt: lumen circa Solem deliteſcentem, quod quidem eſt duplicis generis; nam quidam veluti annulus ambit locum Solis,

Aurora

Involvit penitus velo terrasque, Polumque; 35
Seu cum mane novo roſeum caput extulit undis
Aurora, et primo conſperſit lumine flores.
Ipſa ſub obſcuras videas rutilare per auras
Sydera, ſed tantum quae ſydera nocte ſerena
Plenius aërios colluſtrant lumine tractus. 40
At nitidus Phoebi obductam circum undique frontem
Annulus aurata perfuſus luce coronat.
Ille quidem, ardentis qua parte latentia ſpectat
Ora Dei interior, clarus magis: altior idem
Qua ſeſe attollit, rutilaque à fronte recedit, 45
Langueſcit ſenſim, atque levi minus emicat igne.
Excipit hunc longo protenſus in aethera tractu
Languidior veluti rhombus: procul altera in ortum,
Altera in occaſum cuſpis procurrit: at illi
Lactea lux, qualem celſi de vertice montis 50
Pallentes nebulae, aut qualem aethere mittit ab alto
Quae ſuperos via longa Jovis deducit ad aedes.
Verum ubi vix tenuem Phoebei Cynthia vultus
Particulam progreſſa aperit; procul ilicet omnis
Annulus, atque omnis rhombi pallentis imago 55

qui eo eſt vividior, quo Soli propior, et hic quidem ſolet eſſe ſatis amplus, latitudinem unum etiam gradum ſuperante, licet mentionem faciant Aſtronomi etiam tenuiſſimi annuli, et vividiſſimi, qui ſit concentricus Lunae, non Soli. Deinde in obſcurioribus eclipſibus apparuit aliquando etiam quidam veluti rhombus procurrens in binas admodum longas velut cuſpides hinc, et inde a loco Solis ſub Zodiaco tenui lumine, ut nebulae, vel illius, quam Aſtronomi appellant viam lacteam, Graeci autem Galaxiam, quam Poëtae dicunt eſſe Deorum viam pro Jove adeundo; quae quidem omnia evaneſcunt, ubi primum exigua etiam ſolaris diſci pars detegitur; Sole autem vel dimidio tantum detecto, habetur dies jam omnino clara, et integra.

Effugit ex oculis: mox astra sequuntur, et ante
Quam medium puro Titan caput efferat Axe,
Plena fere, claraque dies in luce refulget.

Horum principia, et causas si nôsse latentes
Quasque cupis; primum expediam, quid fulgidus ille 60
Annulus, ac tenui pallens sit lumine rhombus.

Sunt 4, quibus à radiis Lunae stringentibus orbem,

4 Incipiendo ab annuli causa, eam aliqui desumunt ab illa proprietate luminis, quam Optici appellant inflexionem, vel diffractionem: hic autem innuitur et ipsa proprietas una cum reliquis lucis proprietatibus, et ejus causa. Dum radius luminis abit per medium homogeneum, progreditur per rectam lineam: si incurrat in corpus heterogeneum, habet reflexionem, refractionem, diffractionem. Nimirum, si deveniat ad amplam novi corporis superficiem; pars ejus radii reflectitur, pars ingreditur in ipsum corpus, etiam in priores saltem particulas corporis utcumque opaci, et ibi, si non incurrat perpendiculariter, refringitur, nimirum ingreditur quidem, sed detorquetur a directione sui motus. Quod si perradat tantummodo extremam partem novi corporis, adveniens ad distantiam perquam exiguam; progreditur quidem, sed mutata itidem directione itineris ita, ut alii e radiis praetervolantibus flectantur introrsum in umbram ab ipso corpore projectam, alii extrorsum ad partes umbrae oppositas.

Causa horum phaenomenorum omnium est mihi, et aliis plurimis, potissimum Newtonianis, vis quaedam mutua, quae habetur inter lucem, et corpora: haec vis mihi est mutua inter omnes materiae particulas, et in ingentibus distantiis est attractiva in ratione, ut vocant, reciproca duplicata distantiarum ad sensum; est nimirum ipsa gravitas Newtoniana: at in exiguis distantiis est jam attractiva, jam repulsiva, pendent et magnitudine, et directione vis pro binis punctis quibuscunque a distantiis, secundum legem quandam expressam per quandam curvam lineam, quam exposui, et ad universam applicavi tam Mechanicam, quam Physicam tum in dissertationibus pluribus, tum in justae molis opere impresso Viennae in Austria, ante hosce duos annos, cui titulus *Naturalis Philosophiae theoria redacta ad unicam legem vi-*

Inflexisque

Inflexisque via fulgens habet annulus ortum.
Scilicet est lucem, et reliqua inter corpora quaedam
Mutua vis, qua se alternis pelluntque, trahuntque, 65
Ingens in tenui spatio, quaeque obvia nisu
Urgeat immani, at majoribus intervallis
Usque adeo levis, ut sensus eludat inanes.
Hinc ubi, dum celeri radius volat impete, fibris

rium in Natura existentium. In particulis corporum pendet vis etiam a numero, et dispositione punctorum, ex quibus eae constant, cum inde pendeant summae virium pertinentium ad omnia punctorum binaria.

Hisce viribus agit lumen in corpora, calorem excitando in eorum fibris, et corpora in lumen, ipsum detorquendo a suo itinere. Vis in exiguis distantiis est ingens, in magnis insensibilis. Dum lumen abit per medium homogeneum, summae actionum agentium directionibus oppositis aequantur ad sensum, et idcirco motum rectilineum lucis non turbant: in distantia exigua a limite dividente media heterogenea jam praevalet attractio, jam repulsio, et mutatur perpetuo directio, et celeritas motus ejus: si summa virium repellentium a novo medio, et retrahentium in medium praecedens, praevaleat, atque id ita, ut ante, quam particula luminis satis immergatur in novum medium delata ad loca actionum circumquaque aequalium, elidat omnem velocitatem accessus perpendicularis ad id medium, quam habebat prius; fiet reflexio: si ea summa praevaleat, sed minus; habebitur ingressus in novum medium, sed cum velocitate imminuta, et in casu motus obliqui refractio cum recessu a perpendiculo: si praevaleat summa virium oppositarum; habebitur ingressus cum velocitate aucta, et in casu motus obliqui refractio cum accessu ad perpendiculum. Ubi radius perstringit tantummodo marginem corporis, detorquetur viribus iisdem, sed praetervolat, et acquirit inflexionem, quae est quaedam inchoata refractio, vel reflexio: cum autem vis sit mutua; dum tenuissimae luminis particulae ingentem sui motus mutationem inde acquirunt; corporum fibrae crassiores, et inter se connexae, acquirunt solum tremorem quendam.

Hujus theoriae partem tantummodo attingit hic locus.

Tenvibus

Tenvibus accessit nimium; tremere ilicet omnes, 70
Et varios cursus, variosque iterare recursus;
Unde oritur calor; at contra lux aurea coeptum
Tardat iter, celeratve, et recto à tramite flectit.
Illa igitur si forte amplam se immittat opaci
Corporis in faciem, pars introgressa per imas 75
Discurrit latebras, vacuisque meatibus errat;
Pars reflexa viam relegit, retroque resultat.
At radius, summas qui praetervectus ad oras
Aut dorsum legit, aut aciem perstringit acutam
Conradens, spatioque levis praetervolat arcto, 80
Ille quidem tenues pergit se inferre per auras,
Sed rectum alterno tractu, alternoque repulsu
Flectit iter, jamque introrsum pertractus in umbram
Invehitur, contra opposito jam calle recedit.

Aspice [5], in obscurum quondam penetrale per arctam
Dum radius se rimam infert, laevique papyro 85
Sistitur, adverso vel pariete; pendeat ipso
Si forte in radio filum, tenuisve capillus;
Lucis particulis utraque e parte repulsis,
Illius umbra tibi plus aequo excrescet, at ipsa 90
Adductis introrsum aliis, minus atra, minusque
Tristis erit, variaque asperget luce tenebras.

Lamellas [6] tenues etiam interponere mos est,

[5] Primum experimentum, ad diffractionem videndam, capilli, cujus umbra est multo latior ob radios extrorsus detortos, sed multo minus densa, et nigra, ob alios introrsum flexos.

[6] Alterum experimentum: radius tenuis intra conclave obscurum excipitur binis lamellis, vel aciebus cultrorum non ita multum distantibus a se invicem, inter quas transit usque ad ulteriorem papyrum ipsius pars allapsa ad rimam, quam eae relinquunt inter se,

Vel

Vel, geminas cultrorum acies spatiisque remotas
Inter se paribus paullatim adducere, dum se 95
Conjungant, radiisque viam venientibus omnem
Praeripiant, claudantque aditus, dorsoque repellant.
Post acies etenim candens objecta papyrus
Tum varios lucis flexus, variosque reflexus,
Tum vis ipsa, ut agat, quanta intervalla requirat, 100
Edocet, obtutu vigili si singula lustres.
Primum etenim, cultros dum distinet intervallum
Amplius; in medio radiis perfusa papyrus
Illaesis contra rimam fulgebit hiantem.
Quamquam etiam extremis utraque e parte coactis 105
Flectere iter, sese illa nitens via pandit utrinque
Plus aequo ad latera excurrens, et latior exit.
Ast ubi contractum sensim jam limite certo
Decrevit spatium; se protinus incipit ipse
Lucidus in geminas tractus discerpere partes: 110
Jam nullis recta radiis pergentibus, umbra
Densior in medio exoritur; quae restat utrumque
Ad latus, inflexa generatur fascia luce.
Ergo etiam 7 Solis radios, queis cingitur orbis
Celantis fratrem Phoebes, dum viribus isdem 115
Deflexi internas subeunt circum undique partes,

Initio igitur, dum binae acies adhuc satis distant a se invicem, habebitur ductus lucidus unicus respondens illi rimae, sed multo amplior, quam rima ipsa, ob radios nimirum detortos hinc, et inde prope acies. Accedentibus ad se invicem illis aciebus, ubi deventum fuerit ad certam distantiam; tum unicus ille ductus lucidus dividetur in duos separatos ab umbra intermedia; ea umbra orietur; quia tum nulli radii transibunt rectà ad chartam illam, sed radii utrinque detorti generabunt illos binos lucidos ductus hinc, et inde a medio.

7 Eodem igitur pacto hi cen-

Sole etiam latitante, putant, fulgere, nigranti
Et rutilam Lunae fronti efformare coronam.
  Rem quoque [8] subjiciunt oculis: tubus amplior alte
Erigitur Coelo, patuloque hiat ore superne: 120
Arctior in gremio suspenditur orbis; at ima
Parte subit laevis, citroque, ultroque trahendus
Attactu molli tubulus, cui tenve foramen
Stat medio, et superas prospectum pandit in auras.
Huc oculum admovisse solent: hinc lampada Solis 125
Suspiciunt, omnesque notant in imagine quadam
Defectus varios, similes defectibus illis,
Objectu quos Luna suo super aethere gignit.
Namque refert Phoebes vultum nigrantis, in alto,
Orbis, qui gremio suspensus pendet, et idem 130
Sive minor nitida, seu major imagine Solis

sent radios Solis detortos circa marginem lunaris globi devenire ad oculum observatoris, et gignere annulum illum lucidum.

8 Proponitur eclipsis quaedam artificialis, qua solet exhiberi hic annulus a diffractione ortus. Artificialem eclipsim proposuit in monumentis Academiae Parisiensis ad ann. 1715 celeberrimus Astronomus Isleus, cujus Academici mentionem fecimus lib. II. adn. 11, sed methodo non ita parum diversa ab ea, quam hic exhibui, et quae est multo aptior ad repraesentandam eclipsim Lunae naturalem.

Infra verticem tubi cujuspiam superne aperti suspendatur circulus ex materia opaca ejus magnitudinis, ut spectata e fundo ejus diameter appareat sub angulo dimidii gradus, nimirum ut sit circiter ipsa diameter una e 114 partibus aequalibus distantiae ab ipso fundo. In eodem fundo collocetur alter tubulus insertus tubo priori, et mobilis intra ipsum, qui infernè sit clausus, et habeat foramen, cui applicari possit oculus, et per ipsum suspici ille circulus suspensus, qui apparebit major Sole, vel aequalis, vel minor, prout ille tubulus protrudetur magis, vel minus intra tubum, ut foramen accedat ad circulum magis, aeque, vel plus, quam requiritur, ut diameter apparens

Cernitur

Cernitur, ut libet; extrorſum ſi ſcilicet ipſo
Eductus lente tubulus removetur ab orbe,
Vel contra introrſum protruditur, atque propinquat.
Ergo ubi protruſo tubulo ſat proximus orbis 135
Excrevit, rutilaque apparet lampade major;
Ipſe viam Phoebi medius ſi reſpicit axis,
Immotusque manet; Phoebus prius integer, inde
Falcatus magis, atque magis, jam parte latente,
Aſpicitur, donec totum ſe denique condat. 140
Tum vero, ardentem qui lampada condidit, orbis
Undique detortis radiis in margine ſummo
Emicat, et puro rutilus nitet annulus igne.
Quidni igitur ſimiles pariter ſint illius ortus,
Nigrantem in medio Phoeben qui cingit Olympo, 145
Inflexisque via radiis tribuatur uterque?

circuli ſit aequalis diametro apparenti Solis.

Poſt hujuſmodi conſtructionem dirigendus erit tubus in Solem, et ſiſtendus ita, ut Sol motu diurno progrediens deveniat ad ipſum circulum. Si ita dirigatur tubus, ut via centri Solis tranſeat per centrum circuli, repraeſentabitur eclipſis Solis totalis, vel annularis, prout diameter apparens circuli fuerit non minor, vel minor diametro apparente Solis.

Jam vero in caſu eclipſeos totalis, adhuc circa illum circulum apparebit circumquaque annulus lucidus ortus a radiis inflexis in margine circuli.

Isleus Solem admittit in locum penitus obſcurum per exiguum foramen, et conum radiorum per id tranſeuntium excipit in circulo plano exhibente Solis imaginem, quae poteſt eſſe vel major, vel minor circulo, prout ipſe circulus retrahitur, vel protruditur ad foramen. Ubi imago Solis eſt minor, et tota tegitur a circulo, apparent circa ipſum circulum annuli lucidi, et vero etiam colorati. At ii naſcuntur ex diffractione radiorum tranſeuntium per illud tenue foramen relictum in tubi vertice. Ad rem apte repraeſentandam oportet admittere radios libere advenientes ad circulum ſuſpenſum, uti libere adveniunt radii ſolares ad Lunam.

Haec

Haec illi: 9 Verum ista, cave sententia mentem
Ne tibi transversam abripiat; rationis inane
Nec pondus, nec magna virûm te nomina fallant.
Namque ea, quae geminis certa experientia cultris 150
Intervalla docet, per quae se effundit agendo
Mutua vis, radiosque ciet, satis una nitentem
Longe alios ortus evincit habere coronam.
Scilicet in decies denas si forte resolvas
Particulas digitum, partemque acceperis unam, 155
Quamquam adeo tenuem; longe tamen usque minori
Deficit in spatio, nec jam vis ulla citatos
Sollicitat radios, et recto à tramite flectit.
Ergo etiam intorto qui lumine viribus isdem
Annulus atratum Lunaï cingeret orbem, 160
Arctior usque foret, digiti centesima quam pars. (ctum
Nullum etenim, incurvo aut Phoebes de margine, pun-
Sive quod assurgat magis, atque à margine distet

9 Eam non posse esse caussam annuli, qui apparet in eclipsibus Solis, evincitur illo experimento, de quo adn. 6. Nam per id experimentum invenitur distantia illa, in qua agit ad sensum vis radios detorquens, quae distantia est dimidium ejus intervalli, quo binae acies distant a se invicem tum, cum primo incipit apparere ille umbrosus tractus inter duos lucidos ductus; nam ubi acies plus distabant a se invicem, adeoque a medio plus, quam per dimidium illius ultimi intervalli; radii per medium transeuntes progrediebantur recti. Porro ea distantia est perquam exigua; invenitur enim multo minor, quam una centesima pars unius digiti.

Jam vero annulus, qui in Luna inde oriri possit, non potest esse crassior intervallo ejus distantiae; nam a superficie Lunae obversa Terrae nulli radii solares deveniunt ad oculum, nec vero ulli a spatio, quod magis a Luna distet; cum radii remotiores recta procurrant ulterius, adeoque non detorqueantur introrsum ad oculum. Porro pars centesima digiti in distantia adeo enormi ab oculo, uti est

Longius,

Longius, inflexa percellet luce tuentem.
Nam quecumque oculis pars dorsi obvertitur, illa 165
Lumine fraterno viduata nigrescat, oportet:
At spatium à dorso protentum longius alto
Vi radios flectente caret, qui tramite recto
Proin fugiunt, longeque alias labuntur ad oras.

His animadversis, tute ipse attingere metam 170
Jam potes, et certis errorem agnoscere signis.
Nôsti etenim, aethereas quam Luna recedat in oras
Ardua; nam terris decies mage surgit ab imis
Eductum Coelo tollens caput, ipsa suum se
Quam gyro Tellus immani flectat in orbem. 175
Nôsti etiam sensim minui, ac vanescere demum,
Dum procul aufugiunt, spectatoremque relinquunt,
Quaecumque intuimur, molemque proinde minutam
Usque adeo, atque adeo procul à Tellure remotam
Haud cadere in sensum, et mortales fallere visus. 180

Luna, est ita tenuis, ut omnem sensum effugiat. Sunt usque ad Lunam circiter 60 semidiametri terrestres, quorum singulae continent quamproximè pedes Parisienses 20, 000, 000, sive partes pollicum centesimas 24, 000, 000, 000, in in qua distantia una centesima apparet sub angulo minore duobus minutis quintis, quae tenuitas, nisi vis luminis sit admodum ingens, sub sensum omnino non cadit, annulum autem nec ampliorem illum, et languidiorem exhibere potest, qui in eclipsibus Solis apparet protensus ad distantiam etiam unius gradus, nec arctiorem, et vividiorem, situm intra ipsum, qui adhuc sensibilem crassitudinem habere solet. Is annulus in eclipsi artificiali illa etiam, quam supra expressi, est admodum sensibilis, ob exiguam distantiam oculi a circulo, in cujus margine fit diffractio, quae ibi potest gignere annulum crassum per plura etiam minuta prima.

Distantiam Lunae, 60 semidiametrorum circiter, expressi per 10 circumferentias Terrae, quarum singulae continent paullo plus, quam senas semidiametros.

His

His tibi perſpectis ultro patet, hìc nihil illis
Viribus, et radiis tribui nil poſſe retortis;
Quamque tubo e medio praebet, qui proximus ora,
Phoebeosque ignes orbis tegit, aethere ab alto
Non poſſe hanc oculis Phoeben praebere coronam. 185

Adde [10] quod, et radii, quos vis ea flectit, eundo
Se tenuant magis, atque magis: namque impare niſu,
Flexibus atque adeo imparibus torquentur, et ille
Immenſum, hic recto vix quidquam à calle recedit.
Tanta igitur demum poſt intervalla viarum 190
Inde oculis lumen tam tenve allabitur, omnem
Ut fugiat ſenſum, et motus vix excitet ullos.
Et quiſquam radiis memorata lege retortis
Jam tribuat natam celato Sole coronam?

Nec minus [11] ille tamen veri à ratione recedit, 195

10 Accedit tenuitas illius Luminis; nam inflexio illa radiorum fit in angulis admodum diverſis pro diverſa diſtantia a margine corporis inflectentis. Quare illud lumen, quod advenit ad ſpatium ita arctum, diſtrahitur in immenſum in tanto intervallo a Luna ad Terram, in quo ejus particulae divergentes recedunt a ſe invicem in immenſum; quod quidem eum annulum debet reddere prorſus inſenſibilem.

Eſt et alia ſententia de eodem annulo, cum ſuo experimento, quam eodem anno 1715 protulit in iiſdem Monumentis Academiae Pariſienſis Hireus, obſervato quodam velut annulo circa globum Soli interpoſitum, qui oriebatur a radiis, quos ob ſcabritiem globi partes anticae limbo proximae reflectebant ad poſticas. Verum et is annulus in Luna eſſet et tenuis in immenſum, et languidus.

11 Progredior hic ad ſententiam communiorem, quae tribuit illum annulum atmoſphaerae, quam in Luna admittunt, qui ita ſentiunt; et quidem non deſunt, qui ſerio affirment, ſe vidiſſe in Luna, potiſſimum tempore ſolaris eclipſeos, etiam fulgura, quod quidem et Wolfius admittit, ac ſerio profert ad probandam atmoſphaeram Lunae. At praeterquam quod nunquam in Luna illuſtrata a Sole videmus nubes,

Qui

Qui ſibi lunares confingit, et advocat auras
Auxilio, atque aliter ſic omnia ſolvere tentat.
Scilicet ut noſtrum late circumfluit orbem,
Qui ventos ciet, et nubes qui ſuſtinet, aër,
Quo propior terris, hoc denſior, idem ubi in Axem 200
Erigitur, ſenſim aethereum tenuatus in auram;
Ipſam etiam Lunam ſimili ſic aëre cingi,
Ac ventos ſentire ſuos, gravidasque futuris
Imbribus, et multa ruituras grandine nubes.
Eſt quoque, qui tacitam multa jam nocte per umbram
Alta tubo, et vitreis ſpeculatus lentibus aſtra, (205
In fuſca Lunae facie nimbosque ſonantes,
Fulguraque, et celſas ferientia fulmina turres
Viſa ſibi narret, juret quoque: mentem, animumque
Uſque adeo praecepta animo ſententia ludit: 210
Hanc vero radios partim reflectere, partim
Introrſum torquere auram, rutilaque corona
Nigrantis triſtem Phoebes circumdare frontem:
Cumque eadem à dorſo Lunae ſe tollat in Axem
Altius aſſurgens; ipſam quoque ſe mage in altum, 215
Haerentem fronti Phoebes, attollere lucem.
Verum age [12], queis etiam hunc liceat configere telis

cum maculae nobis eaedem ſemper eodem modo appareant; quis non videt, fulgur, et fulmen eſſe objecta adeo exigua, et tam tenuis luminis, ut in tanta diſtantia nullis omnino teleſcopiis percipi poſſint? Opinioni animo praeconceptae tribuendam puto phaenomeni omnino non exiſtentis perceptionem imaginariam; niſi forte provenerit ab aliquo interno tremore fibrarum oculi fatigati diuturna applicatione ad teleſcopium.

12 Atmoſphaeram lunarem ego quidem nequaquam admitto: innuo hic argumenta nonnulla, quae ipſam impugnant; verum et haec ipſa fuſius, et alia nonnulla expoſui in mea diſſertatione de Atmoſphaera

Errorem, expediam. In primis te plurima, Lunam
Haud ullo circum perfundier aëre, qui sit
Huic nostro assimilis, rite observata docebunt. 220
Aspice cum [13] puro nitet aethere, seu petat auras
Cornibus obstantes primis, seu plena superbam
Ostentet frontem, rutiloque simillima fratri
Nocturnas vincat tenebras, atque obruat astra;
Nonne vides, certo quam limite fulgeat oris 225
Extremus teretis margo, et quam lumine demum,
Aequali in fuscam lux desinat aurea noctem?
At mediam si forte Deam circumfluus aër
Ambiat, et quo se magis aethera tollit in altum,
Hoc magis in vacuum sensim rarescat inane; 230
Ipse etiam extremus confuso in margine limes
Palleat, ac sensim incertus vanescat, oportet.
Quid [14] quondam, quae fixa vocant, dum Sydera dorso

Lunae, quibus an satisfecerint, qui, eandem atmosphaeram posterioribus annis admittentes, expresse ediderunt, se meis omnibus argumentis respondisse, lectoribus judicandum relinquo; si qui forte id negocii suscipere in se velint, ut rem ipsam cognoscant, ac judicent.

Dico autem, in Luna nullam esse atmosphaeram similem huic nostrae, quae nimirum eo magis tenuis fit, quo assurgit magis supra lunarem superficiem, donec evadat paullatim insensibilis; suspicor enim, ut dicemus paullo inferius, circa Lunam haberi fluidum quoddam simile nostrae aquae, quod nimirum certum habeat limitem superficiei supremae, in qua plurimum adhuc differat a circumjacente aethere, multo densius eodem.

13 Primum argumentum a limite admodum distincto in margine lunaris disci, qui margo, ubi est lucidus, apparet distinctissimus, et, ut dicimus, terminatissimus. Si quis Terram longe prospiceret, videret utique marginem admodum confusum, lumine in recessu a centro se sensim attenuante una cum ipsa atmosphaera.

14 Secundum argumentum a lumine fixarum, quae a Luna occultantur. Protuli in eadem Dissertatione plura testimonia ejus, quod hic affirmo, quod

Contegit

Contegit obscuro inferior, seu Virginis ora
Erigones, sive alterno qui funere fratres 235
Aethereas subeunt sedes, oculumve nitentem
Raptoris Tauri, aut Nemeaei corda Leonis?
Nonne ollis rutilum paullatim obtundere lumen
Protinus, et radiis lentum ingenerare tremorem
Inciperet, densis dum tandem involveret umbris? 240
At perstant immota, nigranti et proxima limbo
Intactum servant jubar, ac percellere acutis
Inspectantûm oculos telis[a], et lumine pergunt
Illaeso rutilare: atque atrae ubi denique frontis
Curvatum attigerint limbum, tum tempore puncto 245
Dispereunt simul, ac penitus conduntur in umbra.
Qualis, ubi placido tenuis globus aëre pendens,
Quem pueri molles olim, innuptaeve puellae
E pingui lympha canna eduxere palustri

nimirum in ejusmodi occultationibus non sensim minuatur earum lumen, sed sine ulla praecedenti mutatione, aut tremore momento temporis velut intereant. Ego sane multas vidi occultationes ejusmodi, quin unquam deprehenderim ullum indicium atmosphaerae paulatim auferentis lumen fixae occultatae a limbo Lunae obscuro, nec ullam imaginem satis vividam ejus momentanei interitus totius luminis invenire potui praeter illam, quam hic adhibui bullae illius, quae momento temporis disrupta evanescit.

Sunt quaedam observationes mutationis cujuspiam a nonnullis Astronomis aliquando deprehensae et in fixis, de quibus hic agimus, et in planetis, de quibus in sequenti adnotatione; sed eae sunt admodum rarae, si comparentur cum oppositis, ut patet ex testimoniis, quae in ea dissertatione protuli: vera autem, et permanens atmosphaera deberet semper aliquid, nec ita parum mutationis gignere. Deinde atmosphaera nostrae similis gigneret phaenomena admodum diversa ab iis, quae dicuntur visa in iis admodum raris observationibus. Persecutus sum ibi diligenter ea ipsa phaenomena, et curvas, quas videretur describere fixa limbo pro-

Inflantes, calidumque ſinu incluſere vaporem, 250
Adverſo dum Sole nitet, pulchrosque colores
Alternat, pictaeque refert Thaumantidos ora;
Si ſubito graviorem auram, aut perſenſit acutam
Forte aciem; diſrumpitur ilicet, et perit omnis
Forma globi, fugit ex oculis ſpeciesque, colorque 255
Temporis in puncto, ac tenues vaneſcit in auras.

Illa [15] quoque, haud ullis quae fixa in ſedibus orbem
Libera ſigniferum percurrunt, aſtra, cruenti
Sive globus Martis, ſeu Jupiter, aut Venus alma,
Saturnusve piger, ſeu qui talaria plantis 260
Tantum mane novo, ſeu primo veſpere nectit;
Illa etiam Phoebes vultum cum forte nigrantem
Paullatim ſubeunt, formam corrumpere ſenſim
(Nam longis ſuſpecta tubis trans vitrea ſepta
Formam oculis praebent jam proxima facta rotundam)
Curvarique ſinu in medio, incertisque cieri (265
Motibus aſpiceres, dubia et caligine mergi.
Aſt ea proveniunt ſecus omnia: nullus ad ipſum

xima, cujus quidem et emerſio haberetur ante immerſionem, ob refractionem ingentem: multo rarior atmoſphaera adhuc pareret mutationes multo majores, quam quae dicuntur obſervatae.

Hinc eas ego rariores obſervationes explicandas cenſeo vel per illuſionem opticam a teleſcopiis ortam, vel per aliquid in atmoſphaera noſtra interpoſitum; nam in earum nonnullis alii obſervatores alibi poſiti, et idem obſervantes, nihil viderunt ejuſmodi; vel alicui parti craſſioris atmoſphaerae ſolaris delapſae eo ipſo tempore in Lunam, ut eadem eſt origo Aurorae Borealis hic apud nos juxta Mairanii theoriam.

15 Tertium argumentum ab occultatione planetarum. Quamplurimae obſervationes nullam exhibuerunt, ne minimam quidem mutationem: exiguus earum numerus aliquam obtulit admodum exiguam. Huc redeunt, quae ſupra de fixis diximus; ſed illud planetis pe-

Jam

Jam limbum perducta Deae tremor occupat : idem
Ille manet diae nulla caligine turpis, 270
Qui fronti fuit ante nitor, nec forma rotundi
Lumine compressa intorto corrumpitur orbis.
Accedit, [16] quod, qua lucem discriminat oris
Haud pleni Divae nigranti limes ab umbra,
Non ille incertus dubia caligine visum 275
Fallit, nec caecam lux excipit aurea noctem
Sensim, perque gradus: densissima jungitur umbra
Fulgori pleno, ac penitus contraria formis
Incurrunt in se oppositis, et proxima pugnant.
At nostro assimilis si fors circumfluus aër 280
Circum obeat Phoeben; confuso limite margo
Umbrosum dirimat radianti à lumine tractum.
Namque jubar deflexum auris impervia luci
Directae, et Phoebo loca nondum objecta, nitente
Spargeret irrorans imbre, affusasque tenebras 285
Molliret, primo ceu mane Aurora nigrantem
Paullatim noctem fugat aurea, et ante patentes
Perfundit rutila campos aspergine, quam se

culiare demonstravi in eadem dissertatione ; si atmosphaera Lunae esset vel immensae cujusdam tenuitatis, quam Eulerus admisit, in qua tota refractio horizontalis esset aliquot secundorum tantummodo ; Jovis formam, quotiescumque occultatur à Luna, debere esse ita ellipticam, ut axis longior deberet esse duplus brevioris.

16 Quartum argumentum a limite distinctissimo inter partem Lunae lucidam, et obscuram, quem limitem atmosphaera redderet valde confusum ; illuminarentur enim partes intermediae lumine reflexo ; ut in crepusculis, ob quod a nocte ad diem transiretur sensim. Apparent in Luna quotidie lucidissimae quorundam montium cuspides, radicibus, et subjecta valle nigerrimis ita, ut nullo modo sub sensum cadant. Apud nos perquam exiguum, potissimum in ipso Solis ortu, vel occasu, est discrimen lu-

Erigat, ac pleno Titan jubar evomat ore.
Accedit, [17] quod si nostris par ambiat auris 290
Divam aër, pariter sua nubila nôrit, oportet,
Candentesque nives; quibus extima frontis imago
Mutaret formam saepe, ut qui vertice ab alto
Orbis, quo vehitur Phoebe, despectet in ima
Telluris facie campos, maria ampla, lacusque 295
Affusos, vallesque imas, et culmina montium
Edita, inaequali tueatur perlita luce
Singula, dum puro late pellucida Coelo
Aëris aura nitet, quae, nubibus obruta densis
Dum tegitur facies Terrae, indiscreta niterent 300
Omnia, et aequali confusa in luce laterent.
Atque idem, gelido loca quae sub cardine duram
Persensere hyemem, nivibusque albentia candent,
Clara magis, quam vere novo, aut aestate videret
Ardenti, cum se nivibus jam nigra solutis 305
Spectandam Tellus praebet, frondesque virentes
Per nemora erumpunt late, rupesque sub altis
Montibus, atque imis horrent in vallibus umbrae.
At Lunae in vultu non haec discrimina formae,
Non jubaris produnt sese: manet una, eademque 310
Umbrarum facies, dum parte effulget eadem
Phoebus; nec varii percellunt lumina ductus,
Ipse nisi ardenti dum fervidus imbuit imbre

minis in parte montis immediate illustrata a Sole, et parte reliqua, quam illuminant radii ab atmosphaera reflexi;

17 Quintum argumentum a constanti forma, et lumine partium Lunae in eadem positione ad Solem, quae a nubibus, et nivibus mutari deberent, ut diversam omnino formam prae se ferre debeat Terra diversis temporibus ex iisdem causis. Hoc argumentum attigimus et supra adn. 11.

Conversam

Conversam Phoebes frontem, mutentur, et atri
Mutato tractus positu, jamque altera, jamque 315
Sordescat tenebris Divae pars altera opacis.
Quae si perpendas simul omnia, concidet error
Deprensus claroque patens in lumine, et auras
Aëriis similes haud Lunam ambire fatendum est.

Quamquam [18] aliquo ipsam etiam perfundier aequore,
Lunaï solidum liquidis latitare sub undis (et orbem 320
Crediderim, incerto obliquus qua margine saltem
Despectat terras limbus; sed non tamen illas
Aëris in morem hoc tenues mage, quo mage in altum
Assurgunt, vacuo donec mutentur inani, 325
Esse rear; verum aequoreas imitarier undas,
Et summa contra in facie quae limite certo
Sat densae affusam sustentent aetheris auram.

Indicio est ille ipse, aequo qui margine limbus
Asperitate caret, nec hiatu abrumpitur ullo, 330
Aspera dum varia facies nigrescit ab umbra
Mille locis, mediaeque inter confinia lucis,
Qua Sol curvatum radiis stringentibus orbem
Obliquus circum conradit, flexibus errat
Semita praeruptis, multoque hiat aspera dente. 335
Scilicet ipsa etiam Phoebe qua montibus altis
Ardua se tollit, Coeloque minatur, hiantes
Qua gremio valles aperit, camposque patentes

18 Hic proponitur mea sententia de fluido homogeneo affuso toti Lunae, quam innui adn. 12, cum argumento praecipuo, quod me ad eam sententiam impulit. Est autem illud, quod licet totum Lunae discum videamus maxime scabrum, et inaequalem, quae inaequalitates se produnt potissimum in limite inter partem illuminatam, et obscuram, ubi inaequalitates usque ad extremum marginem sunt ingen-

Diſtendit late, ac fundit maria ampla, lacusque
Terraï aſſimilis: proin dorſo haud partibus aeque 340
Phoebeum in cunctis jubar excipit, atque remittit,
Umbraque pro vario poſitu fratrisque, ſororisque
Inflectit ſeſe, et partes contorquet in omnes.
Hos puram ſcabra Lunaï in fronte per undam
Tranſpicimus varios flexus, et, qua via luci 345
Non nimis obliquo brevis eſt trans aequora calle,
Forma manet facie in media, vallesque profundas,
Et juga inaequalem metimur celſa per umbram:
Turbantur ſummo confuſae in margine partes.
Nam radii in tenues dum produnt aetheris auras 350
Attracti ad lympham proni inclinantur, et ima
Fronte Deae quae merſa latent, elata liquentis
Ad faciem lymphae, ut laevi depicta papyro,
Aut aequa in tabula, referunt, poſitumque retorto
Immutant lucis ductu, formaque tuentes 355
Turbata ludunt oculos. Pars nulla liquentis

es; adhuc tamen totus margo extremus in plenilunio, et multo magis margo Lunae obſcurus intra Solem in eclipſi ſolari, apparent admodum aequales, et politiſſimi. Sunt nonnullae obſervationes, in quibus viſa ſit una, vel altera inaequalitas in limbo Lunae intra Solem; ſed rariſſimae ſunt, et aliquando ab uno obſervatore ſunt viſae, dum alii ſimul viderunt limbum admodum laevem.

Id phaenomenum plures Aſtronomi cum Galileo repetunt ex eo, quod in extremo limbo montes alii alios occulant: at in reliquis Lunae partibus videmus montes elevatos plurimum etiam ſolitarios, quorum ſimiles in margine apparerent utique; et quidem lunares montes ſunt multo majores terreſtribus, eoſque Aſtronomi determinant per illam ipſam inaequalitatem lucis, et umbrae, ex qua illorum altitudo facile deducitur.

Ego igitur id phaenomenum repeto ab ejuſmodi fluido Lunam ambiente, per quod tranſ-

Se

Se dorsi picta praebet sine imagine; flexus
Proin varii lucis, sinuataque cernitur umbra
Extremum ad finem, et sese surgentia Coelo
Culmina, demersique excisae frontis hiatus 360
Ostentant, quacumque patet revolubile dorsum.
At nihil affuso se tollit ab aequore in auras
Aethereas, planaque extans è fronte fluentem
Asperat abrumpens limbum, qui proinde vel igni
Phoebeo adversus micet, aversusve nigrescat, 365
Aequali circum laevis se limite finit.

At nulli, Phoebi frontem dum Cynthia condit,
Haec poterunt radii transversa per aequora in auras
Trajecti aethereas transcurrere, nigrantisque
Ora Deae circum rutila exornare corona: 370
Attactu dorsi primo flectuntur, et imam
Detorti ad Phoebes frontem allabuntur, in oras
Quae procul hinc superas attollitur, aversumque
A Terris fracto perfundunt lumine vultum:

picimus ejus fundum, et in ejus superficie per radios refractos intuemur velut depictas inaequalitates omnes ipsius fundi, et differentiam umbrae, ac lucis, quae habetur in eodem; at limes ejus fluidi est aequalis, et laevis.

Quando Lunam videmus in Sole in eclipsibus, nulli radii per illud fluidum ad nos transire possunt, quia per refractionem interius detorti incurrunt in nucleum solidum Lunae, et limes apparet laevissimus.

In illa dissertatione de atmosphaera lunari haec omnia fuse exposui, et ostendi, quae phaenomena haberi debeant posito ejusmodi fluido, sive oculus collocetur extra, sive intra; sunt autem ibi nonnulla admodum singularia, quae quandam velut piscium Astronomiam a nostra admodum diversam exhibeant: est et experimentum quoddam phialae vitreae, quam exterius intuenti apparet crassitudo ejus vitri, si ea impleatur materia crassiore; sed ipsa crassitudo sensum effugit, si im-

Haud

Haud ulli objectum perrumpunt, atque in apertum 375
Aethera progressi pergunt, oculosque lacessunt.
Proin [19] alios ortus, alias super Axe petendum
Cingenti Divam jubari, ardentique coronae
Sublimes causas; longe nempe altius illi
Principium est luci, et Phoebo genitore superbit. 380
Quin etiam ipse nitens ab origine rhombus eadem
Gignitur, aethereasque simul procedit in auras.
Queis tamen auxiliis, quave hanc satis ubere vena
Naturae aggrediar partem, atque arcana docebo?
Nunc ades, O! nunc, Phoebe pater, diffunde micantem
Fronte comam, et flavos per eburnea colla capillos: (385
His opus est: nunc ardentes age concute habenas,
Flammivomis nunc urge acres calcaribus armos
Quadrijugum: undantem e patulis fac naribus ignem
Commixtum nebula, et fumis nigrantibus efflent. 390
Principio [20] queis Luna caret, perfunditur auris

pleatur pulvisculo tenui, vel liquore, quae apparent, tanquam si in externa vitri superficie sita essent: phaenomeni autem ratio repetitur a Dioptricae principiis, et ad rem praesentem applicatur; ac demum ostenditur, quo pacto inde deduci possit non totus ille amplus annulus, quem ego non ei fluido, sed atmosphaerae solari ibi tribuo, ut et hic inferius, verum ille usque adeo magis tenuis, et vividus, qui Lunae corpus ambit. Sed ea omnia satis erit hic tantummodo innuisse.

19 Reliquis sententiis rejectis, originem latioris illius annuli, et rhombi repeto ab atmosphaera solari, quae est origo altior, et immediatius ad Solem spectans: in sequenti invocatione atmosphaeram concipio, ut in prima invocatione adn. 2, tanquam Phoebi comam, et praeterea ut fumos, quos ejus equi efflent e naribus cum igne, quibus innuuntur vapores, et exhalationes emissae e solari corpore ob ignem internum.

20 Exhibetur hic ortus, et natura atmosphaerae solaris, quae habet, ut haec nostra, partem densiorem, et propio-

Phoebus,

Phoebus, et ipſe ſuo libratus in aëre pendet.
Hic, humilis rutilo qua proximus imminet orbi,
Denſior, et nebulas ſaepe, et nigrantia dorſo
Nubila ſuſtentat, queis palleat omnis ubique, 395
Aut maculis Phoebi vultus ſpargatur opacis.
Idem autem aethereas, qua ſe protendit in oras
Altior a Phoebo aſſurgens, tenuatur, et aura
Uſque levi, vacuo vix quidquam diſtat inani.
Scilicet ut gremio Tellus denſoſque vapores, 400
Particulaſque ignis tenues emittit ab alto
Exhalans: illi denſantur pondere, et imo
Incumbunt humiles dorſo: procul evolat ardens
Halitus, et nebulas levior, nubeſque relinquit;
Non ſecus ipſe etiam Titan effundit ab imo 405
Nigranteſque ſinu fumos, tenuemque favillam
Uſque vomens, vacuoſque undanti aſpergine campos
Aetheris, et totum late circum imbuit Axem.

rem ipſi Soli ob pondus, quo craſſiores vapores magis nituntur in ipſum, ac aliam ſenſim rariorem, et magis elevatam. In illa priore habentur et nubes ſolares, quibus jam fere communiter tribuuntur maculae illae, quas in ipſo Sole intuemur, et quaedam velut nebula, quae ingentem Solis tractum, et aliquando totum diſcum involvit, ac reddit pallidiorem ſolito ita, ut per quaſdam veluti rimulas tranſpiciatur vividius ſolaris ſuperficiei lumen, quas nonnulli Aſtronomi appellarunt ſolares faculas.

In hoc argumentum ſolarium macularum earumque cauſae a nebulis, et nubibus repetitae cum haec in Arcadum coetu recitarem, adjeci epigramma cum Italica verſione, quae hic ſubjicio.

E P I G R A M M A.

Fallor? an, aethereas qui curru ardente per auras
Aeternum puro fundit ab axe jubar,

Haec

Haec excussa procul fontem nituntur in ipsum,
Ac rutilum innati repetunt vi ponderis orbem; 410
Quaeque minus gravitate vigent, procul Axe recedunt
Ardua, particulis contra quae pinguia crassis,
Parte sedent ima, et dorso incubuere nitenti.
Nubibus haec densis sedes, nebulisque serenam
Quae maculant Phoebi frontem, aut caligine tristi 415
Obducunt late: maculis vapor imminet atris
Purior assurgens, qui non intercipit omnes,
At multos sistit radios tamen, imbuiturque

Unde satus Maja, et cum Marte, pigroque parente
Jupiter, unde nitet Cynthia, et unde Venus;
Unde nitent prata, et radii septemplicis ictu
Versicolor picto flore superbit humus;
Fallor? an obscura nitidos caligine vultus
Obruit, et maculis turpibus ora notat?
Haud equidem fallor: nigrantes pectore fumos
Evomit, et vultus inficit ipse suos.
Sol nubes habet: o fuscae miser incola Terrae,
Tu speres laetos, et sine faece dies?

TRADUZIONE.

M' inganno? O pur que', che dal carro ardente
Diffonde puri raggi, onde si adorna
Venere, e Cinzia, e ogni altro astro lucente,
Che sotto il Ciel stellato in Ciel soggiorna;
Onde tosto divien lieto, e ridente
Ogni vago giardino allor, che aggiorna,
E dal tessuto raggio gentilmente
Percosso il fiore a' bei color ritorna,
M' inganno? O pur di nere macchie il volto
Talor s' ingombra? Ah! non m' inganno: o quale
Gli miro in fronte atro vapore accolto!
Misero! e contro il rio destin fatale
Tu speri i dì sereni, e lieti, ah stolto
Del fosco Mondo abitator mortale!

Lumine,

Lumine, et obductum circum Titana refulget.
Scilicet [21] hinc ortum ducit, Phoebumque latentem 420
Aureus in media complectitur annulus umbra,
Quoque magis Coelo erigitur, Phoebumque relinquit
Exterior, puro tanto minus igne coruscat.
Cur tamen [22] et, rutilam qui parte ab utraque coronam
Ambit, et aethereas longe tenuatus in oras 425
Excurrit rhombus, Phoebi exoriatur ab aura;
Cur aequam fugiat formam, oblongusque per Axem
Emicet, affusoque irroret lumine stellas;

21 Ab hac atmosphaera Solis repeto causam annuli latioris ambientis Solem in eclipsi totali, qui eo est minus lucidus, quo magis recedit a limbo Solis, quia, quo atmosphaera est altior, eo etiam est tenuior. Sunt qui dicant inde oriri non posse, quod sit concentricus Lunae, non Soli: at arctiorem illum, et vividiorem annulum esse concentricum potius Lunae, quam Soli, utcumque per observationem determinari potest, non vero latiorem; cum in eclipsi totali centrum Lunae à centro Solis parum admodum distet; nam ejus diameter apparens parum admodum superare potest diametrum apparentem Solis, et nulla pars disci solaris procurrit ultra lunarem.

22 Pro explicanda causa rhombi illius, qui aliquando apparet in eclipsibus, oportet ostendere, quo pacto ex rotatione circa proprium axem, quam cum Sole habet ejus atmosphaera, oriatur vis centrifuga, et ob ipsam atmosphaera eadem induat figuram lentis cujusdam, ex qua a nobis obliquè visa oriatur figura rhombi, cujus extremas partes intuemur in lumine zodiacali deprehenso a Cassino. Id argumentum fuse, et elegantissimè pertractavit P. Carolus Nocetus e nostra Societate vir celeberrimus (Nicetas apud Arcades nominatur), in suo poëmate de Aurora Boreali, quod cum alio de Iride, et meis in utrumque adnotationibus satis amplis Romae prodiit ante hosce 13 annos: ibi ego, quae huc pertinent, diligentissime evolvi omnia. Ipsum immortalis ejus carminis auctorem, quem aetate adhuc satis integra, et optima valetudine, superiore anno Roma discedens reliqui florentissimum in meo

Haud

Haud levis evolvisse labor: nec digna laboris
Jam merces speranda venit, quando invia quaeque, 430
Asperaque intactis Parnassi per juga dumis
Pervadens, Boreae fulgentem e parte nivalis
Dum celebrat plectro Auroram; fidibusque canoris
Aethereos nuper Nicetas edidit ortus,
Et causas rutili victuro carmine rhombi: 435
Musarum decus, et nostri clarissima Pindi
Gloria Nicetas, quo non prestantior alter
Aut fuit Arcadicis, aut olim exsurget in arvis
Scrutari Sophiae sedes, atque abdita quaeque
Eruere, et Latiis proferre exculta Camoenis. 440
Pauca modo expediam: aeternum, si plura requiris,
Perlege opus vigil; haud equidem vigilâsse pigebit.

Primum igitur [23] quoniam immani per et intima
Viscera, ferventesque sinus agitatur ab igne (Phoebus
Usque furens, quoniam immenso se corpore tantus 445
Porrigit; e patulis quae faucibus evomit aurae
Semina, nigrantes fumi, nebulaeque volucres
Immensum aethereas circum se quaque per oras
Diffundunt, longeque procul Titanis ab orbe

Collegio Romano, domi quidem Generalem studiorum Praefectum, foris autem Examinatorem, ut appellant, et Episcoporum, et Synodalem, ac Pontificium sacrae Poenitentiariae Theologum, ante hosce aliquot menses fato ereptum amisimus.

23 Solis atmosphaeram protendi longissime a Sole, suadet ipsa tanta vis caloris ipsius Solis: sed et lumen ipsum zodiacale, de quo mox agemus, et cometarum caudae, quas jam saepe diximus oriri ab ascensu vaporum cometicorum in atmosphaera Solis, habentur autem etiam in cometis remotioribus a Sole, quam sit Terra, evincunt ipsam protendi, ut hic affirmo, longissime a Sole.

Ejus gravitas in Solem debe-

Excurrit

Excurrit tenuis vapor, et ſpatia inficit ampla. 450
Ille quidem, medium dum pondere nititur aequo
Omni ex parte premens in Solem, flectier aequo
Orbe etiam, formaque ſtudet fulgere rotunda.
Ipſe tamen genitor Phoebus vetat, atque ſuo ſe
Circumagens dum contorquet ſuper axe, per altum 455
Compreſſam ad latera ipſe jubet conſurgere dorſum.
Nempe [24] ſuo aſſiduis Phoebum ſuper axe cieri
Motibus, ingentique auram torquere rotatu,
Caligo evincit triſtis, maculaeque nitentem
Turpantes frontem: namque illas tempore eodem 460
Sive novae mèdio in vultu gignantur, in unam
Seu coëant plures, pluresve oriantur ab una
Diſciſſae, abruptaeque, videmus ſemper eandem
In Coeli partem concordi incedere gyro,
Et medium unanimes circum Titana rotari. 465
Jam verò incurvos [25] quaecumque rotata per orbes
Circumeunt, medium fugere, et procul ire per auras
Aſſiduo tentant niſu: ſic plumbea habenam
Glans valida contorta manu diſtendit, et undam

ret ipſi inducere figuram ſphaericam ob aequilibrium, ſi ea quieſceret; ſed motus, quem habet circa proprium axem cum Sole, cogit induere figuram compreſſam; quod quo pacto accidat, jam explicabitur.

24 In primis Solem converti circa proprium axem, ſatis evincunt maculae ipſius: eae jam oriuntur, jam intereunt, una in plures diſcinditur, plures coaleſcunt in unam, et obſervantur in partibus admodum diverſis; et tamen omnes ſemper moventur motu, qui eſt circularis circa eundem axem, et eâdem, ſaltem proximè, periodo dierum 25 pro integra converſione. Hic tantus conſenſus ſatis evincit, rotari Solem ipſum, et ſecum abripere in gyrum ſuam atmoſphaeram, ac cum ipſa maculas, ſive nubes in ea innatantes.

25 Quaecumque corpora cir-

Excutit

Excutit affusam celeri rota concita cursu. 470
Quaeque simul gyros aequali tempore plures
Impete non uno absolvunt, etiam impare nisu
Avelli à medio tentant; minus illa recessum
Namque urgent, quae lenta via breviore feruntur;
Contra quae rapido magnos agitata per orbes 475
Turbine praecipitata ruunt, magis incita cursu
Vi tentant majore fugam, ac retinacula tendunt.
Ergo age [26], et ingenti dum sese vortice in orbes
Circumagunt aurae Phoebi, tu mentis acutam
Fige aciem, gyrosque animo perpende sagaci. 480
Nonne vides, quanta se mole volubile dorsum
Torqueat? extremo vix non immota sub axe

culos describunt, concipiunt vim quandam recedendi a centro, quae dicitur centrifuga, quam Christianus Hugenius rite consideravit primus. Nam omnia corpora vi inertiae conantur semper abire per viam rectam, nec ad orbes curvilineos detorquentur, nisi vi aliqua, quae si abesset, per rectam omnino abirent.

Hujus vis centrifugae duplex hic argumentum innuitur ab experimentis petitum, vis, qua lapis funda circumactus habenam tendit, quae ipsum in orbe illo retinet, et impetus, quo resilit aqua aspersa rotae circumactae.

Adduntur leges, quod nimirum si diversi circuli describantur omnes eodem tempore; vis centrifuga in iis, qui majores sunt, fit major. Theorema generale, a quo pendent quaecumque eo pertinentia Hugenius proposuit, est hujusmodi: vis centrifuga in circulis est in ratione composita ex directa duplicata velocitatum, et reciproca simplici radiorum; ex eo autem facile deducitur hoc aliud, cujus hic usus occurrit; si circuli eodem tempore describantur, vis centrifuga est in ratione directa radiorum, sive in ratione directa velocitatum.

26 Si jam concipiatur motus totius massae circa eundem axem, apparebit, in quavis superficie sphaerica haberi circulum quendam maximum in medio, in quo celeritas maxima sit; dum circuli propiores polis conversionis ipsius eo mi-

Stant

Stant latera, atque brevi procedunt pigra meatu.
Dorso igitur quae celsa volat, magis aura citatam
Accelerare fugam, medioque recedere tentat. 485
Et faciat, superasque procul dispersa per oras
Aufugiat; gravitas ni contra obsistat, et imum
Urgeat in Solem, nisusque eludat inanes.
At licet haud penitus fugiat, Phoebumque relinquat;
Erigitur tamen, et vasto tumet altior orbe. 490
Ipsum etenim tanto infractum conamine pondus
Languet hebes, nisu levior jamque aura minore
Per dorsum premit: at lateri quae proxima utrique
Vim retinet ferme illaesa gravitate priorem.
Haec igitur gravior vincit, Phoeboque propinquat;
Illa autem urgenti palmam concedit, et omni (495

nores sunt, et minorem velocitatem habent, quo ad polos magis acceditur. Hinc vis centrifuga in illo ingenti circulo, qui dicitur aequator, erit major, quam in reliquis, et prope polos vis erit ad sensum nulla.

Ea vi, tota illa massa dissiparetur, nisi obstaret gravitas in Solem, major eadem vi, quae quidem cohibet massam ipsam; sed ubi vis centrifuga est major, plus detrahitur de ipsa vi gravitatis; adeoque pondus remanet majus prope polos, quam sub aequatore; quam ob causam ad habendum aequilibrium debet elevari magis sub ipso aequatore fluidum, et ad polos deprimi, ut majore ipsius fluidi altitudine compensetur minor singularum partium vis. Inde totum illud fluidum acquirit formam sphaeroidis compressae, sive lentis cujuspiam.

Ego hic unicam rationem exposui aequilibrii sublati, majorem nimirum vim centrifugam sub aequatore, quam prope polos; sed habetur et altera, quod nimirum vis centrifuga sub aequatore directe opponitur gravitati, in reliquis locis eo obliquius, quo magis acceditur ad polum; nam ipsius aequatoris centrum est in ipso centro sphaerae, ad quod gravitas dirigitur, reliquorum autem circulorum in puncto axis eo remotiore a centro sphaerae, quo magis ad polum acceditur.

Parte tumens, longe superas se attollit in oras;
Compressam ac Phoebi vapor hinc, atque inde figuram
Induit, et vastae fulget sub imagine lentis.
His demum emersus salebris jam caetera prono 500
Expediam cursu, et facili ratione docebo.
Scilicet 27 immotum ad terras si verteret axem
Aurea lens; formam procul hinc suspecta rotundam
Protinus indueret, teretique effulgeret orbe.
At quoniam immensum huc dorsum deflectit ab alto; 505
Transversam tuimur, medio et coit arctior axe
Ad latera adstringens sese: geminata per amplum
Hinc, atque hinc Coelum cuspis procurrit, et ingens
Phoebum ambit niveo spectandus lumine rhombus.
Hinc rutilam Phoebi frontem fulgentior orbis 510
Circuit, ac propior; densi genuere vapores:
Circumstant bini, quos tenvior aura, levisque
Progenuit, vultus utraque ex parte nitentis
Lucentes tractus: comptis de more capillis
Ora Dei credas effulgere, caesariemque 515
Arbitrio facilis Zephyri per eburnea colla
Ludere, perque humeros; haec scilicet illa tot olim,
Haec Clarii coma compta Dei celebrata per Orbem

27 Jam vero ejusmodi lens si aspiceretur oculo collocato in ejus axe, appareret circularis, ut patet; at cum obvertat nobis dorsum illud protuberans, debet apparere sub forma cujusdam veluti rhombi, oblonga nimirum, binis velut cuspidibus, vel aciebus procurrentibus hinc, et inde a medio in partes oppositas. En igitur, unde oriatur rhombus lucidus hinc, et inde a Sole, visus aliquando, nimirum in eclipsibus, in quibus minus luminis superest, et obscuritas habetur major ob majorem excessum disci lunaris supra solarem; nam ejus lumen tenue densiores tenebras requirit, ut

Vatibus

Vatibus, hi crines flavi, intonsique capilli.

Ne tamen [28] haec unquam demens, ne posse videri 520
Mortali credas visu, dum libera Coelo
Ora nitent Phoebi, et radiis fulgentibus ardent,
Immortale oculos hebetat jubar, atque minorem
Subtrahit obtutu, et vetat internoscere flammam.
Ac veluti nuda in numerum dum brachia tollunt, 525
Et rigida exercent validis incudibus aera
Artifices; multa seu cum rota concita lympha
Jam vastas tollit moles, jam deprimit, illae
Lina terunt, usum in tenuis formanda papyri,
Et calamos, dextramque olim sensura disertam; 530
Personat horribilis late fragor: ipse nisi omnem
Ore trahas collectam imo sub pectore vocem,
Vicinos frustra non exauditus amicos
Alloqueris: totas tantus fragor occupat aures.
Haud secus immodico terras dum lumine Titan 535
Irradiat, visumque ferit; languescit imago
Pallentis rhombi, victus languescit et orbis,
Immensumque leves Phoebi jubar obruit ignes.

Non ita [29] cum nostro Titan procul exulat orbe,
Mersus aquis sero jam vespere, sive recentes 540

videri possit.

28 Ob eam tenuitatem luminis is rhombus nunquam videri potest interdiu; nam oculi ita obruuntur nimia solaris luminis vi, ut aures nimio fragore malleorum in officinis ferrariis, vel in iis aedificiis, in quibus rotae aquarum vi concitatae terunt lina ad chartam efformandam, ubi exaudire non licet, nisi clamore maximo vociferantem; et haec ipsa est causa, ut infra videbimus, cur stellas etiam interdiu videre non possimus.

29 Ante Solis ortum, et post Solis occasum apparent sub zodiaco extremae partes ejus lucidi rhombi certis tempori-

Mane novo dum nectit equos Aurora per umbram.
Vespere nam sero placidi per tempora veris,
Mane per autumnum, cum signifer orbis ab imis
Altior erigitur terris, crassosque vapores
Despicit assurgens, nivei pars ultima rhombi 545
Eminet, atque nitens ferit aurea sydera cuspis.
Saepe etenim à Titane procul protenditur, et qua
Fascia bissenis medium secat aethera signis,
Phoebeus semper procurrit in aethere rhombus.
Ergo et fraternae subiit cum Cynthia fronti 550
Subrepens, rapuitque jubar; nitet annulus altè
Victor, et obscuro se rhombus prodit Olympo.

bus, quibus nimirum ante matutinum, vel post vespertinum crepusculum ea zodiaci pars, ad quam ejusmodi materia pertingit, extat satis elevata supra horizontem, ut crassiores vapores horizonti ipsi proximos effugiat. Ad id requiruntur duo; primo quidem, ut atmosphaera solaris apta ad reflectendos radios solares protendatur ad satis magnam distantiam a Sole ipso; nam diversis annis, et multo plus diversis seculis diversa admodum est ejusmodi extensio ita, ut aliquando lumen zodiacale inde ortum pertingat ad distantiam tantummodo 50, vel 60 graduum a Sole; aliquando vero ultra 100 gradus protendatur. Deinde ut Sole infra horizontem posito circa initium matutini, vel finem vespertini crepusculi, ea zodiaci pars sit parum obliqua ad horizontem; notum est enim apud Astronomos, aliam esse aliarum zodiaci partium inclinationem ad horizontem. Porro id accidit in hac boreali zona temperata mane per autumnum, et vespere verno tempore, et iis temporibus potissimum solet id phaenomenum observari; quod quidem sub zona torrida, in qua zodiacus nunquam multum inclinatur ad horizontem, observari solet per totum annum tum, cum satis longe ipsa lux protenditur a Sole.

Cum hoc lumen videamus sub zodiaco hinc, et inde a Sole, quotiescunque dies, vel satis vividum crepusculum non sint impedimento, patet, debere itidem videri in ea eclipsi Solis, in qua minus luminis a circumjacente atmosphaera adhuc Solem vidente reflectatur.

His

His animadversis, [30] cur et radiantia Coelo
Protinus erumpant, multaque in luce coruscos
Attonitis vultus ostentent sydera terris; 555
Jam nullus labor est, paucis adverte, docebo.
Ne tibi sydereos sero jam vespere nasci,
Mane perire ignes, quisquam persuaserit auctor.
Nocturnas qua luce micant tremebunda per umbras
Astra, micant summo dum fervet in aethere Titan 560
Arduus, atque diem curru circumvehit alto.
Ut crines tamen ipse suos, rhombumque, coronamque
Obruit invictis quibus imbuit aëra, flammis;
Sic etiam fixosque Polo, errantesque per Axem
Obtundit, conditque ignes, nec posse videri 565
Se coram, et superas sinit effulgere per auras.
Nec si densa Deum nubes tegat, astra nitentes
Continuo retegunt vultus, oculosque lacessunt.
Trans nubes sibi pandit iter, fractumque retorto
Calle jubar Phoebi tamen evolat, et via si qua 570
Finditur interrupta patens trans nubila, campos
Ilicet, aëriasque auras, crassosque vapores
Irrorat radiis salientibus; aurea circum
Mille repulsa locis lux omnia protinus implet,
Et premit astrorum tenues, atque obruit ignes. 575

30 Ex iis, quae dicta sunt, patet, cur et stellae in eclipsi totali appareant. Eae semper lumen emittunt, quod nimio solaris luminis fulgore obruitur interdiu. Si nubes quaepiam Solem tegat, adhuc lumen a reliqua atmosphaera reflexum impedit, ne stellae videantur in parte Coeli, quae supersit serena. Verum in eclipsi Sol occultatur etiam proximis atmosphaerae partibus, et toti superficiei Telluris circumjacenti. Idcirco tum apparent ipsae stellae, saltem eae, quae sunt lucidiores.

Ast ubi opaca procul sublimi ex aethere Phoebe
Et nebulas, nubesque, et nubibus aëra densis
Impositum, montesque altos, camposque tenebris
Inficit, et late fraternos condidit ignes:
Tum, caeca ceu nocte, nitentia sydera surgunt. 580
Sic ego [31] cum Phoebi radios excluderet omnes
Arte tubus multa insignis, noctemque foveret
In gremio, licet in medio sublimis Olympo
Arderet Titan, sudo nitidissima Coelo
Saepe olim aspexi, propioraque sydera terris. 585
Olim [32] equidem saepe; at quoties nunc pura sereno
Ore dies sine faece nitet, cum jam altus ab undis
Extulit Eois caput, ardentesque per horam
Effudit radios Titan; me candida Oloris
Cauda vocat, summaque Poli jam fulget in arce, 590
Spectaturque tubo ingenti trans vitrea septa.
Cum vero occiduas deflexum Phoebus ad undas

31 Telescopiorum etiam mediocrium ope lucidiores stellas interdiu quoque observant Astronomi, quas ego saepe admodum observavi. Intra tubum est quaedam veluti nox, et objectivum vitrum plures ejusdem stellae radios colligit, quam simplex oculi pupilla possit admittere.

32 Haec adjeci Arimini, dum anno 1752 inirem observationes astronomicas ad determinandam magnitudinem gradus Meridiani inter urbem Romam, et Ariminum in aedibus Comitis Joannis Francisci Garampi Patricii Ariminensis, amicissimi mihi ab ipsa prima communi adolescentia. Tres autem fixas adhibebam, α Cygni (nam Astronomi post Bayerum graecis litteris stellas fixas singularum constellationum designant, incipiendo à lucidioribus), quae iis ipsis diebus, quibus haec scripsi, perveniebat ad meridianum prope zenith una circiter hora post ortum Solis: β Aurigae, quae eo deveniebat tribus horis circiter post Meridiem, quae stella est in ipso Aurigae humero: μ Ursae, quae est in pede ipsius anteriore prope Leonis signum, quae tum appellebat in

Inclinat

Inclinat currum, à medio nam tertia fluxit
Hora die, tollens humeros Auriga nitentes
Erigitur, fummique ardens in vertice Olympi 595
Ire jubet, pofitusque fuos metirier; et qua
Anteriore petens rabidum premit alta Leonem
Urfa pede, illa quidem fero jam vefpere, cum jam
Confundit lucem dubiis nox prima tenebris,
Sufpectanda venit; veniet tamen ante, diesque 600
Poft fenos Phoebi occafum praevertet, et alto
Vifa tubo, rutilae vincet mihi lampadis ignes.
Haec ipfa et domina fpectabam nuper in urbe;
Urfam equidem media ferme jam nocte per umbram
Pervigil, ac primae poft fera crefpufcula noctis 605
Aurigam fulgentem humeris, nigrumque per Axem
Ingenti dextra quatientem immane flagellum.
At rutilum fruftra jam plena in luce diei
Effundente jubar Phoebo, fe lucida Cycni

ipfo vefpertino crepufculo, fed quotidie anticipabat, ut reliquae itidem, appulfum fuum quatuor circiter minutis ob motum proprium Solis in orientem, quo is ex parte orientis accedit femper magis ad ftellarum loca; quam ob caufam fex diebus poft eum ipfum diem, quo haec fcripfi, debuit et ipfa obfervari ante Solis occafum.

Prioris, et tertiae obfervationes exhibui in opere de Litteraria Expeditione per Pontificiam ditionem, tum Ariminenfes illas, tum Romanas, quas ante inftitueram in Collegio Romano horis indicatis hic inferius. Secundae fixae obfervationes paucas admodum tentare potuimus Arimini, et admodum incertas, cum priores turbatae fuerint a nubibus, et nebulis, pofteriores a nimia vicinia Solis; quamobrem eae nulli mihi fuerunt ufui ad illam determinationem. Sed reliquarum duarum proruli obfervationes abunde multas, et quidem Romanas binis anni temporibus inftitutas, quae omnes confenferunt intra unius tantum fecundi difcrimen a medio, ut ibidem videre eft.

Sistebat cauda; atque oculos urgebat acutos. 610

Nobile 33 nunc eadem qua surgit Ariminum, et altas
Educit Coelo turres, arcumque superbum,
Ac veterem solido stantem de marmore pontem
Ostentat, geminosque amnes hinc moenibus, atque hinc
Sustinet allapsos, Rubiconis et ostia spectans 615
Proxima, Romanas acies, jactaque furentem
Alea, et ore trucem rabido, atque extrema minantem
Mente ducem trepida recolit, spretique Senatus
Infracta imperia, ac civilis semina belli
Protinus hic suscepta sibi, totumque per Orbem 620
Hinc subito immitis diffusa incendia flammae;
Totque inde eversas urbes, tot sanguinis amnes
Effusi, ac tantos confusae stragis acervos;
Hic ergo, hic eadem in plena nunc sydera luce
Suspecto, et Phoebi nil curo ardentia tela. 625

Testis ades, 34 gentis decus immortale Garampae,

33 Visuntur adhuc Arimini plura Veterum Romanorum monumenta, inter quae arcus insignis, et pons: Rubiconem fuisse Arimino proximum constat ex ipso Caesaris adventu Ariminum paullo postea, quam trajecerat Rubiconem ipsum, terminum Romanis Imperatoribus constitutum a Rep., quem praetergredi sine auctoritate Senatus nefas esset; ubi is quidem et illud celeberrimum pronunciavit *jacta est alea*, ad quod hic alluditur, et quod civilis belli exordium extitit.

34 Comes Franciscus Garampius est Patricius Ariminensis. Quae hic protuli in ejus laudem, sunt illa sane inferiora ipsius meritis. Formam singularem in primo juventutis flore ornabant plurimum ingenuae artes, quae nobilem optimae indolis juvenem decerent, saltatoria in primis, in qua cum summa venustate exercebat sese, atque excellebat, et musica, in qua nunc etiam vel inter primos quosque egregios Italiae professores excellit in eo lyrae genere, quod appellamus *il violino*; cujus naturam, et usum conatus sum hisce versibus exprimere: lyram autem ipsam habebat singula-

Et

Et patriae Francisce decus, quem flore juventae
Vernantem primo, seu molli brachia gyro
Flectere, seu sinuare pedes, agilesque choreas
Exercere, chorus Charitum miratus, et oris 630
Dulce decus, roseasque genas, blandumque micantes
Fronte oculos, flavasque comas suspexit, et imo
Insigens animo suspensus inhaesit; at alto
Nunc etiam Pindi de vertice, turba sororum
Aonidum perculsa stupet, stupet ipse canoros 635
Urgentem nervos, sinuatum et crinibus arcum
Tractantem facili dextra, laevaque micantes
Motantem attonitus digitos, atque ipsa loquacis
Septa lyrae, dulcemque sonum miratur, et aureum
Demittit caput, ac palmam tibi cedit Apollo. 640
Quid grande ingenium, doctasque exculta per artes
Mens vasta, atque imo sapientia pectore sidens?
Scrutantem aethereas sedes, atque aurea Coeli

rem omnino, et perfectissimam.

At multo adhuc majori erat laudi egregio juveni ingenium summum optimis excultum studiis. In Bononiensi Academia Astronomiae sub Eustachio Manfredio celeberrimo viro operam dederat in ipsa adolescentia, cum tanto progressu, ut ejus honorificentissimam mentionem fecerit Manfredius ipse in Praefatione suarum Ephemeridum. Inde Romam delatus, mihique aetate suppar amicitiam mecum iniit, quam deinde perpetuo et illaesam servavimus, et vigentem, servaturi perennem impofterum; transitum Mercurii sub Sole observavit mecum anno 1736, de quo ego jam tum Dissertationem edidi. In ea observatione ego excipiebam imaginem Solis transmissam per telescopium in tabella contra ipsum ita aptata, ut et imago illa ipsa cum circulo ibi descripto, et umbra verticalis lineae cum certa ejus circuli diametro congrueret: Garampius autem, qui stylo tenui continuo consectabatur centrum nigricantis exiguae imaginis Mercurii, notabat ejus positionem ipso momento congruentiae, quo a me de eadem admonebatur; quod observationis ge-

Sydera

Sydera ſervantem jam olim juvenilibus annis
Viderat, et merito celebrârat Felſina plauſu, 645
Romuleas cum primum arces, urbemque Quirini
Viſiſti, et Maja genitum ſub lampade Solis,
Nam memini, pariter ſervavimus: ipſe nigrantem
Uſque vigil globulum Phoebea in imagine acuto
Figebas telo, et ſignabas cuſpide curſum: 650
Aſt ego nigrantemque orbem, et rutilantia Phoebi
Laevibus ora vitris tranſmiſſa, tuboque, rotundae
Aptabam excipiens formae, tenuique papyro.
  Inde redux, Pindoque Deam, Coeloque potentem
Advehis in patriam tecum, exceptamque perenni 655
Uraniam hoſpitio colis, et vaga ſydera, et ignem
Phoebeum, ac rutilam, Diva comitante, ſororem
Scrutaris vigil: en Coelum dum metior, atque

nus hic ipſis verſibus exprimitur.

Regreſſus in patriam domi ſuae lineam meridianam duxit, ac plura inſtrumenta comparavit ad obſervationes inſtituendas idonea; inter quae horologium oſcillatorium, quo ego ibidem ſum uſus, aptavit in certa ſuarum aedium parte, in qua meum et ſectorem, et quadrantem collocavit loco ad ejuſmodi obſervationes ſatis idoneo.

Confluebat autem frequens nobilium virorum turba ad obſervationes ipſas, ſed multo ſaepius aderat matrona lectiſſima ejus uxor, et filiolus, admirabilis ſane ingenii puer, qui ſeptimo aetatis anno et univerſam jam latinam grammaticam egregiè ſciret, et latinos auctores optime interpretaretur, et Geographiam calleret mirum in modum; poſt biennium autem, cum eum a patre Romam adductum vidi, nummos quoque veteres, et vetera manuſcripta jam bene noſſet, ac legeret; quibus ejus tam multis dotibus accedebat et elegantia oris, et ſuavitas indolis ſumma. Sed praecocem nimium tantae ſpei puerum, et unicum familiae germen, nimis immaturo praereptum fato doluimus, quem poſt paucos annos ſubſecuta mater optima totam luctu complevit domum.

Inquiro

Inquiro veſtrae quid vertex diſtet ab urbis
Vertice Romuleae, longoque ardentia ſcrutor 660
Aſtra tubo, Diva ipſa tuas me adduxit ad aedes.
Hic aditum ad Coelum ſummi ſub culmine tecti
Ipſe aperis: das ipſe rotas, queis certa notentur
Tempora: quaeque ſuis operi lectiſſima tanto
Inſtrumenta locis tribuens defigis, et aſtra 665
Suſpectas mecum, ac filo metiris Olympum.
Suſpectat dulcis conjux, ſuſpectat et ipſe,
Proh ſuperi! qua vi mentis, quaque indole gnatus,
Septennis licet, ac procerum denſiſſima ſaepe
Suſpectat turma, et matrumque, nurûmque corona
Miratur, cerni per vitra, tubumque nigrantem 670
Poſſe die medio redivivos aetheris ignes.
Sed quid 35 opus vitrea ſeu lente, tubove nigranti?

Verum habet amicus, quo ſe ſoletur, nimirum et Religionem ſuam, ex qua omnium optimi conſolationis fontes repetuntur, et vero etiam naturalem Philoſophiam, ac doctrinam ſingularem tam aſtronomicam, quam antiquariam, ut et fratrem egregium, Baſilicae Vaticanae Canonicum, et Archivii Pontificii cuſtodem, ſanctiſſimum ſane, et doctiſſimum virum, qui et pietate ſingulari toti urbi Romae exemplo ſit, et operibus editis pluribus omni eruditione plenis jamdiu inclaruerit, ac aeternitatem nominis familiae polliceatur; cujus quidem familiae memoriam conſervabunt omnino, ſi vixerint, et haec mea carmina, imparia quidem tantis meritis, ſed idonea ad publicam hanc memoris, et grati animi ſignificationem exhibendam.

35 Ex locis maximè obſcuris et ſtellae interdiu videri poſſunt. Inaudieram autem, idem accidere aliquando etiam in Obſervatorii Pariſienſis cavea illa admodum profunda; quanquam Pariſios delatus ſuperioribus menſibus illud accepi, ejus caveae obſcuritatem non eſſe ſatis magnam ad id phaenomenum exhibendum. Adhuc tamen lucidiores fixas inde nudo etiam oculo deprehenſurum arbitror Coelo ſatis ſu-

Si

Si ſatis aërias ſublimi turris in auras
Vertice ſe tollat, noctemque imitetur opaco 675
Clauſa ſinu, terrae ſatis ima in viſcera ſi ſe
Demittat fovea, atque arcto ſuſpectet hiatu
Aethera, et horrenti gremium nigreſcat ab umbra,
Alta die medio, Phoeboque ardente per Axem,
Sydera ſuſpiciens, oculo ſpectabis inermi. 680
Eſt locus Europae in medio, qua regius altis
Ingreditur ripis, dominamque interluit urbem
Sequana. Dives opum, et duro fortiſſima bello
Gens tenet, at ſimul et placidae ſtudioſa Minervae.
Hìc templum Uraniae, ſolidoque e marmore vaſtae 685
Conſurgunt aedes, et vertice nubila pulſant.
Turba frequens venerata Deam juvenumque, ſenum-
Affluit: illa ſedet ſolio ſublimis in alto, (que
Sceptra tenens, ſtimulatque animos ad grandia natos.
Parjetibus circum, et ſummi ad faſtigia tecti 690

do quempiam, qui ſatis acuta polleat oculorum acie.

Magnificentiſſimae ſunt ejus Obſervatorii aedes, ubi Caſſinus de Thury, et Maraldus, magna nomina, habent inſtrumenta aſtronomica, et obſervationes ſuas inſtituunt. Innuuntur autem hic praecipua ex ejuſmodi inſtrumentis. Solent nimirum haberi in obſervatoriis globi terreſtres, et coeleſtes, quorum poſteriores ſummo ſunt uſui; omnino habentur *tubi lentibus inſtructi vitreis, tenſiſque capillis*, nimirum teleſcopia cum micrometris, quae continent lentes vitreas, et fila juxta adn. 4. lib. I. et 48. lib. II. Armillae erant admodum in uſu apud Veteres, et nunc adhibentur potiſſimum pro ſolaribus horologiis, vel pro craſſioribus altitudinum obſervationibus: omnium maxime neceſſarii ſunt *orbes ſecti*, nimirum quadrantes, et ſectores metallici, in quibus et alidada cum teleſcopio eſt quidam radius mobilis: ſed alterius generis erat ille radius, cujus nomen a Veteribus pro Aſtronomia eſt conſecratum, juxta illud Virgilii lib. VI.

Arma

Arma Deae pendent defixa, globique, tubique
Lentibus instructi vitreis; tensisque capillis,
Armillae, sectique orbes ex aere corusco,
Fulgentesque auro radii, et momenta notantes
Fluxa rotae, ac rigidis pendentia pondera virgis. 695
Nec satis aëriam duxisse ad nubila molem;
Sub pedibus quaesitae umbrae, patefactaque terrae
Viscera, praecipitique solum discessit hiatu:
Aeternis horret fovea alta obducta tenebris,
Excluditque diem: fundo Nox tristis in imo 700
Excubat, horrentique minax se jactat in umbra,
Tetra per obscurum ducit quo semita callem,
Tresque patet Coeli spatium non amplius ulnas.
Ergo illinc, puro Titan licet altus Olympo
Fulgeat, et multo collustret lumine campos, 705
Si forte aethereas vultum conversus ad oras
Extuleris, summumque oculis spectaveris Axem;

Coelique meatus Describent radio, et surgentia sydera dicent. Demum haberi debent *et momenta notantes Fluxa rotae, ac rigidis pendentia pondera virgis,* nimirum horologia oscillatoria, sine quibus Astronomia excoli nunc quidem omnino non potest.

Praeter eos binos Astronomos, quos nominavi, qui quidem ad id Regium Observatorium pertinent, mirum sane, quam multi, quam egregii Astronomi habeantur nunc quidem in Gallia, et potissimum Parisiis, ubi praeter alios complures, qui ad Regiam Academiam non pertinent, numerantur in ipsa tam multi primae notae celeberrimi Astronomi, Caillius, Monierius, Isleus, Pingreus, De la Lande. Quanquam universa gens nihilo minus liberalibus studiis, quam armis dedita, in omni sacrae, profanaeque doctrinae genere, et potissimum is coetus in iis, quae ad naturalem scientiam pertinent, pro qua est institutus, ita excellit, ut nihil ulterius desiderari posse videatur: infinitum esset singulas classes persequi; satis sit innuisse Geometras plane sum-

Protinus,

Protinus, ut media quondam radiantia nocte
Aspiceres, densam radios vibrare per umbram
Astra vides, caecumque Poli distinguere tractum: 710
Usque adeo oppressis Phoebi jubar officit astris.

Sed nec [36] opus pleno Titanis lumine, namque
Vix bene fraternae sese subducere fronti
Incipit, Eoasque soror transcurrere in oras;
Ipse etiam tenuis tanta sua spicula limbus 715
Vi torquet, pulsatque oculos, hebetatque tuentem,
Ut victus rhombusque nitens, atque annulus, atque
Astrorum coetus toto languescat Olympo,
Et fugiat densa mersus caligine visum.

Cur tamen [37] obducto non protinus exoriatur 720
Horrida nox Titane, nigroque haud omnia velo
Inficiat, penitus condens; lux unde supersit
Languidior, stellasque vetet spectare minores,
Accipe. Fulgentem Phoebi cum Cynthia vultum
Eripit ex oculis, non uno tempore cunctis, 725
Quas circum intuimur terraeve, aut aëris oris
Abdidit, atque omnes plena demersit in umbra.
Saepe procul montesque alti, vallesque profundae,

mos, Clairautium, D' Alembertum, Fontainium, quorum consuetudine usus sum nuper Parisiis per menses sex cum voluptate summa, uti nunc summam in me hic in Anglia tot doctissimorum hominum humanitatem experior.

36 Perquam exigua particula solaris disci detecta tantum lumen emittit, ut statim evanescat et rhombus, et annulus, et fere statim quodcumque etiam lucidissimum sydus.

37 Hic jam exponitur illud, cur Sole penitus obtecto non habeatur nox obscurissima, sed quoddam velut crepusculum. Ratio praecipua repetenda est a lumine, quod reflectit atmosphaera terrestris paullo inde remotior, quae videt aliquam partem disci solaris, et ab illa illuminatur.

Conspicui

Conspicui semper pars aëris ultima, partem
Phoebeae extantem suspectant frontis, et ignes 730
Aethereos, puramque bibunt e margine lucem,
Ac nitidum tenebris inspergunt lumen opacis.

Finge animo rigidas protendier aethere virgas,
Quae recto Phoebique globum, Phoebenque minorem
Corradant ductu, et densis circum undique septis 735
Includant medios, tum deinde excurrere pergant,
Cynthia fraterno qua dorsum avertit ab igne:
Nonne vides, longo transgressae tramite Divam
Ut coeant sensim, et puncto sistantur in uno,
Ac teretem referant tenuata cuspide conum? 740
Umbra sinu coni concluditur, atque nigranti
In gremio quicumque latet, de lampade Solis
Nil tuitur, frustraque oculos attollit inanes.
Qui cono egressus virgas transcurrat, et atris
Erumpat septis liber; jam limite summo 745
Ardentis videt ora Dei, tristesque tenebras
Excutit, atque aliqua radiorum aspergine gaudet;
Quoque magis faciem coni fugit, hoc mage flammis
Imbuitur nitidi vultus, partemque minorem

Luna projicit umbram conicam determinatam a radiis, qui tangunt et Solem, et Lunam ipsam. Qui jacet intra eum conum, nihil e Sole videt; qui autem ex ipso egreditur, videt partem eo majorem, quo longius abit in latus.

Porro illa umbra, Sole perigeo, et Luna apogea, nunquam ad Terram devenit, et tunc habetur eclipsis tantummodo annularis; Sole autem apogeo, et Luna perigea, immergitur illa quidem intra superficiem Terrae, sed ejus crassitudo ibi est perquam exigua ita, ut adhuc sit multo minor illo spatio, ad quod protenditur radius visualis intra atmosphaeram terrestrem non solum ex monte aliquo, sed etiam ex ipsa ima superficie camporum.

Ereptam

Ereptam rutila Phoebi de fronte requirit. 750
Ergo ipse umbrosus terras qua conus in imas
Transcurrit, campisque aciem defigit acutam,
Phoebeum penitus latitat jubar: omnia circum
Conspicuus rutilo perfudit lumine margo.

Verum ubi per tenues Phoebe caput altior auras 755
Extulit, et nostrum Titan se pronus ad orbem,
Demisit propior, Coeloque recessit ab alto;
Ante coit, breviorque acie vanescit acuta
Umbrosus coni vertex, quam possit ad imum
Telluris dorsum pertingere, nigrantique 760
Obductum prorsus Titanem involvere velo.
Contra cum Phoebe terris quam proxima, et oras
Avius in superas frater sese extulit, idem
Tenditur umbriferi, seque intra viscera Terrae
Condit apex coni, et Phoebi jubar omne repellit. 765
At quoniam tenui pallentes tum quoque campos
Cuspide figit apex; brevior se continet arctis

Initis calculis invenio, coni illius longitudinem a centro Lunae computatam, cum est maxima, esse semidiametrorum Terrae quamproximè 60, cum est minima quamproximè 58. Distantia autem Lunae a centro Terrae maxima est ex Caillio semidiametrorum Terrae $64\frac{2}{3}$ minima $55\frac{3}{4}$, quae distantiae, si Luna sit in ipso zenith, dempta una semidiametro, evadunt a superficie Terrae $63\frac{2}{3}$, et $54\frac{3}{4}$. Patet illas longitudines cadere inter has distantias, ideoque umbram Lunae aliquando non devenire ad superficiem Terrae, aliquando in eam immergi.

Jam vero maxima immersio erit, si longitudo coni umbrosi maxima conjungatur cum distantia Lunae minima. Tum vero calculo inito invenio semidiametrum sectionis perpendicularis umbrae ibi, ubi ejus axis in Terram immergitur, accedere ad 96 milliaria ad pedem Parisiensem computata, sed adhuc esse aliquanto minorem. At ex monte, qui paul.

Finibus,

Finibus, ac gyro exiguo concluditur umbra.
Scilicet horrentis centum si millia passus
In latus à medio coni discesseris axe ; 770
Jam semper plena evadens emergis ab umbra,
Ac saltem extremo suspectas margine Phoebum.
At saepe aërii summo de vertice montis
Longe ultra hos fines, longe ultra millia centum
Prospectus patet in campos ; et in aëra densum 775
E dorso aequali, campisque patentibus ultra
Millia tercentum protenditur, excurritque.
His ergo depulsa locis lux aurea sese
Insinuat, puraque nigrantem aspergine conum
Imbuit irrorans, et tristem temperat umbram, 780
Percellitque oculos, ac tenvia sydera condit.

Quid, quod [38] et ardentis Phoebi coma prominet, at-
Annulus, et gemina procurrens cuspide rhombus (que
Sordentem coni radios jaculatur ad axem,
Aethereosque negat penitus nigrescere tractus? 785

lo superet altitudinem unius milliarii, patet prospectus in campos humiles, vel in superficiem maris ultra 100 milliaria. Radius autem visualis horizontalis per atmosphaeram fertur ultra milliaria 560, si altitudo atmosphaerae assumatur, uti plerumque solet, 40 circiter ejusmodi milliariorum; et si consideretur tantummodo pars ejus crassior, quae ultra 12 milliaria non assurgat, adhuc ille radius visualis protenditur ad milliaria 310, nimirum ultra tercentum millia passuum.

Quamobrem in casu maximè adverso, et rarissimo, ad centrum umbrae lunaris in eo superficiei Terrae puncto, in quo eclipsis est centralis, haberi potest lux reflexa a remotis montibus positis extra conum, adeoque illuminatis ab aliqua saltem parte disci solaris ; debet autem omnino haberi lux reflexa a magna parte crassioris etiam atmosphaerae terrestris inde conspicuae, et jacentis extra conum.

38 Accedit lux reflexa ab atmosphaera solari, a qua an-

Diximus, obducti [39] cum frons nitet aurea Phoebi,
Cur plena obscuris non protinus evolet alis
Horrida nox, tristique polum late obruat umbra:
Nunc licet haud pleno Titan effulgeat ore
Dimidia plus parte latens, cur clara sereno 790
Fulgeat Axe dies, nec tantam lucis ademptae
Percipiant jacturam oculi, admixtasque tenebras,
Expediam: non hic magnum quaerenda per Axem
Causa, nec aërios tractus, nebulasque volucres
Consuluisse juvat, nec campos, nec procul alta 795
Culmina: se quisque obtutum defigat in uno,
Scrueturque animi sedem, et penetralia mentis
Intima, quaeque sagax dedit instrumenta petendi
Notitias rerum conclusis carcere in arcto
Natura, impulsas fibras, nervosque trementes. 800
Principio [40] Natura parens, dum corpore mentem
Clauderet humanam, et crassos circumdaret artus,
Indidit instrumenta, quibus, quae forte geruntur
Extrorsum, ac varios posset cognoscere rerum

nulum illum, et rhombum, qui tum apparere solent, derivavimus.

39 Cum hic fiat transitus ad explicandum, cur dimidio etiam Sole obtecto integra fere, et illaesa dies perseveret; innuitur phaenomeni causa: binas autem expono causas inferius, jamdudum Physicis admodum notas, quarum prima repetitur a vi, qua lumen a dimidio Sole proveniens fibras oculi ita tendit, ut tensio orta a dupla vi fere nihilo sit major, quam quidem causam attigi etiam adn. 2; secunda vero repetitur a dilatatione pupillae in minore lumine, qua fit, ut admisso ampliore radiorum cono, non eadem sit proportio luminis intra oculum, quae extra. Utraque pertinet ad constitutionem organorum, quibus utimur ad percipiendas res extra nos positas.

40 Animae sedem, praecipuam saltem, esse in aliqua cerebri parte, multi censent, et erit admodum probabile, si

Interitusque,

Interitusque, ortusque, et motus materiaï. 805
Illa quidem in medio latitat conclusa cerebro,
Qua coëunt nervi, et primam per tenvia ducunt
Fila viam, ac vastos longe protensa per artus
Diffundunt sese, velut ab radicibus imis
Aëriae late quercus, vel propter amoenam 810
Crescentis platani ripam densissima surgit
Ramorum soboles, frondesque extendit opacas.
Ast iterum textu vario tenuata per omnem
Nervorum se fila cutem flectuntque, plicantque,
Molliaque obductis adstringunt retia membris. 815
Jam vero quaecumque animo se externa latenti
Corpora noscenda objiciunt, atque intima mentis
Pervadunt arcana, haec ante, haec retia pulsant,
Concutiuntque agiles nervos, sive ipsa propinquis
Ictibus, emissa aspergine particularum, 820
Aut circum affusae sinuosis fluctibus aurae.
Sic ea, quae digitis, sic quae contingimus ore,
Se sistunt coram, et fibras praesentia tendunt.

nomine cerebri intelligatur et cerebellum, quorum utrumque eodem hic nomine complector, ac multo magis, si addatur ejus continuatio per omnium nervorum originem; quanquam alii potius eam sedem reponendam putant in solidis tunicarum, et nervorum fibris. Quidquid de eo sit, anima in ipso corpore conclusa, velut in quodam carcere exteriora objecta non percipit, nisi per motum, qui ab externo sensorio propagatur ad cerebrum: eam propagationem fieri censent alii per ipsum motum fibrarum rigidarum, alii per fluxum spirituum animalium discurrentium per internos meatus fibrarum: utramque sententiam expressi.

Porro triplici modo objecta externa agunt in nostros sensus, alia per contactum, uti fit in tactu, et gustu; quanquam in mea Physicae generalis theoria nullus habetur corporum contactus immediatus, et mathematicus, sed tantum-

At sonus, undantem dum concutit aëra, ad aures
Advolat, et tremulo percellit tympana motu: 825
Particulis procul emissis efflantur odores,
Aut violae, ardentisve rosae, aut bene olentis acanthi:
Sparguntur longe et radii, perque aethera, perque
Aërios tractus procul evolat, atque oculorum
Aurea lux aciem repetito concutit ictu. 830
Continuo percussa tremunt tenuissima primae
Fila cutis, tunicaeque leves, et summa propago
Nervorum impulsu tremulo salit: emicat imas
Idem per latebras tremor, excurritque vel ipso
Fibrarum textu, nervisque rigentibus, aut si 835
Per medios tenuis nervos se spiritus infert
Discurrens, nervo impressum vapor ipse tremorem
Concipit, atque animi sedem deducit ad altam.
Mens vigil assuetos allapsus sentit, et ipsis
Nervorum imperitat fibris, seu tenuibus auris 840
Arte sagax, motatque artus, et membra gubernat.

Qualis, ubi effusae spatia arripuere quadrigae,
Arrectique jubas, atque effera colla tumentes
Pulveream late attollunt ad sydera nubem 845
Quadrupedes, glomerantque gradus: (confusus ad astra

modo physicus, relicta semper exigua distantia, in qua agit quaedam vis repulsiva, quae idem praestet, quod praestaret ipse immediatus contactus; alia objecta externa agunt per undas excitatas in fluido circumjacente, uti fit in auditu, qui sonum excipit per undas in aëre excitatas a corporibus sonoris; alia demum per emissionem particularum, ut in odoratu, et visu, quorum primum fere omnes Physici, secundum cum Newtono quamplurimi censent percipere substantiam tenuem a rebus emissam, particulas nimirum odoriferas, et lucem.

It

It clamor, plaususque sonat, fremitusque faventûm)
Incumbit pronus, distentaque lora magister
Flectit agens, jamque hunc, jamque illum verbere longo
Incitat, aeratisque jubet parere lupatis.
Aut qualis media quondam Regnator ab aula, 850
Qua tumet Ister aquis, vel qua se turgidus infert
Sequana, seu placida populos ditione quietos
Pacatus regat, aut durum procul impetat hostem,
Quadrupedumque, virûmque globos, horrentiaque arma
Concitet, excidioque inimicas destinet arces; 855
Ille quidem interea domina se continet urbe
Immotus, partes famulantûm turba per omnes
Pervolat, extremique alius de margine regni
Nuncia fert, rerumque vices, et praelia narrat,
It contra, dominique alius jussa alta reportat. 860
Quidquid [41] id est, quoties rigidi pars extima nervi
Uno, eodemque tremit motu, tremor unus, et idem
Diffundit sese, cerebroque allabitur, una
Atque eadem species mentem percellit acutam.
Ergo age [42], et impulsas allapso lumine fibras 865
Contemplare vigil, genitumque expende tremorem;
Nonne vides, rutilo ut quantum distenditur ictu

41 Patet omnino ex hac theoria, eandem haberi debere perceptionem in anima, si idem fuerit tremor propagatus ad cerebrum.

42 Tremor propagatus ad cerebrum pendet a tremore impresso fibris sensorii: tremor autem hic respondet tensioni fibrae factae per externam illam impulsionem. Ubi particula luminis advenit ad fibrillam, ea tenditur; tum elasticitate sua se restituit, et aliquandiu tremit etiam sine novis impulsibus, quam ob caussam aliquando diu post ingentem luminis vim perceptam, clausis etiam oculis, videmus lumen. Porro si tensio fibrae

Quodlibet, ac recto discedit tramite filum,
Tantundem retrahat sese, vicibusque feratur
Tantundem alternis hac, illac, et sinuante 870
Se trepidans motu in partem deflectat utramque?
At primus, valido fibrae qui flexus ab ictu
Protinus exoritur, non idem impulsibus ipsis
Consonat usque adeo, ac leges ita servat easdem,
Incurvi motus geminatas dupla sequatur 875
Mensura ut vires, spatioque impulsa recedat
Fibra duplo. Est modus, et certi sunt denique fines,
Quos ubi jam valido attigerint fila incita pulsu,
Nequidquam vires adjungas viribus; atque
Urgentem ingemines nisum; vix flectier ultra 880
Se sinit, ac citius dabitur disrumpere, quam vi
Usque nova extenti textum producere nervi.
Quod 43 si forte animo titubas, atque anxius haeres;
Parjetibus geminis transversi funis utrumque
Fige caput; medio tum tenvia pondera primum 885
Adjice, deinde novas massis super ingere massas
Paullatim, gradibusque aequis: distendier ipsum,
Et pariter medio paullatim inflectier, atque
Demitti adductum; terraeque accedere funem

sit exigua, duplicata vi tendente, duplicatur ipsa tensio; at ubi tensio jam est ingens; vis plurimum aucta tensionem nihil ad sensum auget; neque enim vires, quibus in se invicem tendunt particulae in iis distantiis; in quibus elasticas fibras constituunt, sunt proportionales ipsis distantiis, sed mutantur in ratione ejusmodi, ut ubi distantia usque ad certos limites excreverit, vis ad mutuum accessum, quae distractionem impedit, augeatur quamplurimum; distantia ipsa parum admodum aucta; unde fit, ut incrementorum summa, quae distractionem fibrae constituit, sensum effugiat.

43 Rem facile videre est in experimento; quod hic subji-

Aſpicies; ſed maſſa levis dum pondere nondum 890
Immodico excrevit nimium, torquebitur aeque
Ferme idem ad terram, ſpatiiſque à tramite recto
Ad nova ſe paribus demittet pondera funis.
Aſt eadem exiguum poſt temporis intervallum
Incrementa viae, terramque acceſſus ad imam 895
Decreſcent ſenſim; ac demum vis ponderis ingens
Longe ubi diſtractum funem depreſſerit, ille
Viribus uſque novis vix jam deſcendere quidquam,
Vix poterit produci ultra, maſſaeque recentes
Diſruptum potius diſſolvent, quam mage tendant. 900
Ergo 44 etiam, tenui piceae dum lumine taedae
Urgentur fibrae, atque oculo tenduntur in imo,
Si fors aucta novis ſenſim nova lumina taedis
Adveniant, viſumque petant; tendentur iiſdem
Ipſae etiam gradibus fibrae, gradibusque tremores 905
Aucti iſdem, medium ducentur ad uſque cerebrum;
Nec fallent vigilem nova luminis augmina mentem.
At ſua dum Phoebus radiantia ſpicula mittit,
Dimidio licet ore latens; lux aurea tanto
Inflexas niſu fibras contorquet, ut omne 910
Quod reliquo manat vultu, licet impete duplo
Fila jubar pulſet nervorum, vix tamen ipſa
Curvari jubeat magis, ac tremor exoriatur
Ferme idem, niſuque animum percellat eodem.

citur. Si funi horizontaliter diſtento applicentur in medio exigua pondera, deſcendet initio ita, ut deſcenſus ſint ad ſenſum proportionales ponderibus tendentibus: ſed ubi tenſio evaſerit ingens, diſrumpetur citius, quam adhuc multum augeatur tenſio illa, et deſcenſus.

44 Idem igitur et in oculorum fibris debere accidere, ſatis patet, adeoque patet prima, et potiſſima phaenomeni cauſa:

Adde, [45] quod et frontem media plus parte coruscam
Cynthia dum tegit; et missos intercipit ignes, 915
Non eadem ereptae lucis jactura tuenti
Accidit, et media pariter plus parte minutum
Ingreditur jubar, atque acies defertur ad imas.
Consuluit Natura, oculi et mirabile textum 920
Ereptos reparat radios, damnoque medetur:
Forma globi est olli; tunicae texere cavatos
Circumquaque sinus densae, tenebrosaque condunt
Viscera: parte tamen media, qua prominet, atque
Candentem obscurus tractum discriminat orbis, 925
Exiguus radiis aditus patet, atque rotundum
Transmittit Phoebi rutilantia tela foramen.
Hoc super in morem tenuis pellucida cornu
Se tunica extendit, nec lucem objecta moratur:
Vitrea ad apricam velut interjecta fenestram 930
Lamina, ventorumque iras, imbresque repellit,
At rerum admittit species, Phoebique sagittas.
Transmissos aditu radios crystallina, utraque
Parte tumens, dorso lens excipit, inflexosque
Introrsum fundo concurrere cogit in imo, 935

45 Transitur hic ad secundam causam, quae repetitur a dilatatione pupillae; et quae hic proponuntur, satis vulgo sunt cognita, ut globosa oculi forma; obscuritas intra ipsum ob opacitatem scleroticae cum choroide, et uveae; foramen in media uvea, quod dicimus pupillam, quam tegit cornea pellucida, per quam radii transmissi, ab humore crystallino in primis, qui in forma lentis cujusdam crassioris, sed pellucidae, pendet inter humorem aqueum, et vitreum; collecti in oculi fundo in retina, vel choroide, imaginem pingunt objecto externo simillimam, et situ inverso positam, juxta ea, quae diximus lib. II. adn. 41. de lentibus vitreis in genere.

Porro pupilla ipsa contrahi, ac dilatari potest, et cum ha-

Et

Et parva objectas in imagine pingere formas.
Ipsam igitur mira contexuit arte fenestram,
Et filis fila implicuit Natura, trahendo
Latius extendi; pluresque admittere posset
Ut radios, contra laxando contraheretur 940
Arctior, et nimios contracta excluderet ignes.
Si forte [46] obscura quondam sub nocte per umbram
Dum tenuis dubiam secreta in parte ministrat
Cerea fax lucem, vicinum intentus amicum
Aspicias, oculosque oculis defixeris, atque 945
Contemplere nigram trans cornea septa fenestram;
Distentos cernes aditus, lateque patentes
Circumquaque fores per aperta foramina lucem
Contrahere, et tunicas auctam transmittere ad imas.
Ingentem interea flammam puer excitet, atque 950
Admoveat, sensimque novo petat igne tuentem:
Protinus aspicies nigrantem adstringier orbem,
Praecludique fores radiis: cumque ille coruscam
Proximus ante oculos jam flammam adduxerit, igni
Vix tenues aditus, contractaque porta patebit. 955
Scilicet hinc [47] multo obscuras e lumine sedes

betur lumen multo vividius, contrahitur.; cum ipsum languet, expanditur.

46 Eam pupillae dilatationem admodum facile videre est in observatione, quae hic innuitur, admota per noctem oculo candela, tum remota per vices; statim enim apparebit alterna contractio, et dilatatio pupillae.

47 Ea, saltem ex parte, est ratio phaenomeni, quod saepe omnibus occurrit. Ingressi in locum obscurum e multo lumine, initio quidem nihil discernimus, nec ullum agnoscimus ex iis, qui ibi sunt, et nos vident, ac agnoscunt; sed paullatim clarescunt omnia, et post aliquantulum temporis nos etiam omnia distinguimus. Dilatatur nimirum interea pupilla, et plures radii ingrediun-

Si subito ingressus quondam penetraveris, ipse
Torquebis nequidquam oculos, visusque sedenti
Jamdudum in tenebris turbae, tu cernere contra
Haud poteris, notosque tuens dignoscere vultus. 950
Ast oculi sese tereti expandente fenestra,
Jam magis, atque magis clarescere singula sensim
Incipient, ceu mane novo dum prima tenebras
Discutit Aurora, ac tetram fugat aurea noctem.

Ergo etiam [48] medium rapuit cum Cynthia Solem,
Dimidiaque jubar mulctavit parte, fenestra (965
Illa eadem sese paullatim tendet, et ignis
Jacturam, protracto aditu, pensabit adempti.

Atque [49] utinam seu distentum laxare foramen,
Quantum cuique libet, compressum sive liceret 970

tur in oculum. Sed et illud accedit; quod aliquandiu durat impressio major facta a majore externo lumine, quae impedit, ne illa minor satis commode percipi possit, donec ipsa paullatim deleatur, fibris ab illa majore tensione, et tremore redeuntibus ad quietem aptiorem exiguis etiam impulsibus percipiendis.

48 Ob ejusmodi dilatationem pupillae illud accidit, ut ratio quantitatis luminis intra oculum non sit eadem, ac extra; sed mutetur multo minus et ipsa, et claritas visionis, quae ab ipsa pendet, quam exterioris luminis vis; et cum dimidio Sole obtecto habetur extra oculum dimidium prioris luminis; intra oculum habetur multo magis, quam dimidium ejus luminis, quod antea habebatur.

49 Sequens episodium conscripsi eo ipso die, quo solenne Ascensionis festum Romae celebrabatur de more. Cum a prandio finem hujusce libri deberem in Arcadum conventu legere, inveni nexum satis ad rem idoneum inter argumentum, quod pertractabam, et festum, quod agebamus, quem hisce versibus expressi.

Porro facile est observare, in avibus nocturnis in primis, quemadmodum pupillam immani hiatu aperiant per noctem, quam per diem contrahunt in tenuissimum circellum: idem in felibus observare licet, quae per diem habent ob-

Contrahere,

Contrahere, et nimiae radios excludere lucis!
Nos quoque, ut obscuram per noctem e culmine tristi
Infaustus bubo, trepidove agitata volatu
Noctua, nigranti contemplaremur in umbra
Conspicuas rerum formas, contraque nitentem 975
Et vultum illaesis oculis spectare liceret,
Et currum Phoebi ardentem scrutarier, atque
Quadrijugos patulis efflantes faucibus ignem:
Ceu teneram Coelo prolem Jovis ales aperto
Provida cum primum educit, nidoque relicto 980
Edocet insuetas agitare per aëra pennas
Antevolans, acri ferventem lampada visu
Suspicere, immotasque jubet defigere in ipsam
Frontem acies, dignamque sua se prodere matre.
Ipse pater prima nascentis origine Mundi 985

longam tenuissimam rimulam in pupilla, et per noctem apertiunt immanem circulum, quam ob causam in ipsis nocturnis tenebris satis bene vident. Nam semper aliquid luminis, quod se insinuat per rimas, et per intimam etiam murorum substantiam post reflexiones plurimas, penetrat ab aëre externo, qui etiam per noctem illustratur a fixis: accedit, quod plurima corpora tenue lumen emittunt calore naturali agitata; sed ejus luminis nos multo minus colligimus, quam necessarium est ad satis impellendas nostrorum oculorum fibras.

Si ejusmodi haberemus oculi constitutionem, ut pupillam possemus dilatare, et contrahere in eadem ratione reciproca, in qua externum lumen mutatur, videremus semper objecta externa aeque clara, nec omnino perciperemus ullum discrimen in lumine Solis, et objecti cujusvis per noctem visi; sed multum distamus ab ejusmodi facultate, et mutatio pupillae est multo minor, quam externi luminis mutatio. Dicitur Aquila ejusmodi facultatem habere ita magnam, ut impune Solem intueri possit, relicto nimirum perquam exiguo foramello in pupilla, et prolem suam ita ad Solem explorare, quam si videat ejus radios non sustinere, ut se indignam rejiciat.

Omnipotens

Omnipotens tantum munus mortalibus aegris
Abnuit, ac fragiles morituri corporis artus
Dum geſtant miſeri, ſe tantum attollere, et ignes
Noluit audaci niſu ſpectare supernos.
 Non ita cum ſedes olim poſt longa beatas 990
Saecula, et aetherei contingere limen Olympi
Jam dabitur, Coeloque frui, mortemque reſumptis
Artubus, et functae ridere pericula vitae.
Accedet fibris vigor: immortale tuenti
Se pandet, placidoque jubar (ceu mane nitentes 995
Sparguntur mollis flores aſpergine roris)
Immenſum aeternos mulcebit lumine viſus.
 Nonne vides, domito cum primum Acheronte trium-
Victor agens patrium conſcenderet arduus Axem (phos
Aeterni ſoboles, Deus ipſe, aeterna Tonantis; 1000
(Namque haec ipſa dies, qua cantum, et ruſtica plectra
Caſtalio reſonante jugo, atque Aganippidos undae
Ad ſtrepitum, numeros ripa reddente, movemus,
Haec olim, haec patriis victorem reddidit aſtris,
Inſeruitque Polo, et ſuprema in ſede locavit) 1005
Nonne vides, inquam, cum diam effundere lucem
Inciperet propior Coelo, ac rutilare per Axem
Aetherium, et pompam, majeſtatemque Tonantis
Exerere, atque Deo dignis effulgere flammis;
Ut ſuſpectantes ſocios, Divamque parentem 1010
Corpore mortali oppreſſos ne laederet ignis
Immodicus, penituſque acies obtunderet aegras,
Candentem oppoſuit nubem, ac protexit opaco
Se velo condens, et apertum obduxit Olympum?
Coelicolis contra effuſis, veterumque parentum 1015
Turmis pompa patet. Sunt immortalia membra

Qui

Qui dudum effractis in lucem educta sepulchris
Induerunt, stipantque latus, longoque triumphum
Ordine concelebrant, promissaque regna frequentes
Jam subeunt. Ollis oculos aeterna beatos 1020
Lumina, divinumque jubar, radiique perennes
Molliter illapsi irrorant aspergine dulci,
Aeternaque animos demulcent luce beatos.
O mihi diffractos circum qui protinus artus
Dissolvat, reparetque! Choris felicibus O qui 1025
Misceat, elatumque recluso importet Olympo,
Et liceat rutili vultu pendere Tonantis,
Nec seu mendaci ambrosia, seu nectare inani,
Divino pasci sed lumine, divinaeque
Immotas aeternum acies defigere fronti! 1030
Phoebe pater, medio cessas quid lentus Olympo?
Quid cohibes tardos fraeno remorante jugales?
Urge, age, fac celeri decurrant saecula gressu,
Fac citius miseris fugiat mortalibus aetas,
Et roseis tam fausta dies exurgat ab undis. 1035

FINIS LIBRI III.

DE

DE SOLIS AC LVNAE DEFECTIBVS.

LIBER IV.

POST serta [1] obductam Phoebi cingentia frontem
Candida, fulgentesque comas, radiumque bicorn
Signiferi oppositis protentum finibus orbis,
Et vim divini jubaris, plenumque, latentem
Dimidio quanquam ore, diem, te, Diva Triformis, 5
Te canimus niveos prima Telluris ab umbra
Pallentem vultus, tum sive sub Axe latentem
Nigranti, raptamque oculis, seu luce maligna
Perfusam late, et turpi caligine foedam.
Tu digitos mihi, tu plectri resonantia eburni 10
Fila move, cantumque rege, et non impare versu
Ipsa tuos praesens da pandere, Diva, labores.

1 Habetur initio brevissima commemoratio argumenti superioris libri, in quo agebatur de pluribus phaenomenis luminis in eclipsi Solis; tum innuitur argumentum hujus, in quo agitur potissimum de phaenomenis luminis, quae accidunt in Lunae eclipsi; quid sit ille pallor, qui apparet in Luna ante umbram, et cur Luna in sua eclipsi aliquando penitus evanescat ex oculis, quod tamen rarissimè accidit, plerumque autem appareat illuminata, sed luce quadam maligna. Idcirco autem invocatur hic ipsa Phoebe, ad quam pertinent, quae hic pertractantur.

Principio

Principio [2] umbriferi dorso cur proxima coni
Inficiat pallore genas turbata nitentes
Cynthia, divinumque oris confundat honorem, 15
Illa docet, Phoebi rutilis quam corpus opacum
Fulget ubi à radiis, umbram è regione nigrantem
Projicit adversa, quae pallida margine summo,
Atque incerta oculos fallit; mediam undique circum
Namque obeunt dubio mixtae splendore tenebrae. 20
Quoque magis fugit, atque à corpore distat opaco,
Hoc magis incerto se limite contrahit umbra.

Nonne vides? Alti summo de culmine tecti
Cum cadit, atque viam distinguit tramite longo,
Densatas inter tenebras, tractumque nitentem 25
Linea non tenuis tantum sese inserit, et non
Protinus hinc illuc puncto transitur in uno:
Languescit sensim lux aurea, paullatimque
Exoritur, lentoque gradu sese explicat umbra
Principio levis, ac sensim nigrescit eundo. 30

Non tamen et spatiis plus aequo ingentibus idem
Confusus margo distenditur, et digitorum
Exiguo semper numero concluditur arctus.

Ast ubi majores altis de montibus umbrae

[2] Hic incipit explicatio illius, quam *penumbram* dicimus, quae in eclipsi Lunae praecedit, et sequitur umbram: primum agitur ex phaenomenis de penumbra in genere. Umbra, quam corpora a Sole illustrata projiciunt, habet marginem confusum ita, ut ab umbra densa ad lumen plenum transeatur per tractum semiobscurum. Hic limes umbrae incertus eo est latior, quo umbra longius projicitur. Ad distantiam unius, vel alterius pedis umbra apparet satis terminata, sed confusio ejus marginis satis est ingens in umbra, quam domorum tecta projiciunt in subjectas areas; at eadem est immanis in umbra, quam editi montes projiciunt in patentes

Excurrunt

Excurrunt procul, et campos secuere patentes, 35
Nequidquam extremae speres confinia lucis
Designare tuens, ac multis passibus erres
Incertus, dubiusque animi, dum à lumine certo
Haud dubiam demum transcurrere detur ad umbram.
Quorum 3 etiam causas libeat si nôsse latentes, 40
Accipe: durum opus est dicto, sed dexter Apollo,
Et faciles quid non jubeant sperare Camoenae?
Si medio Phoebi tantum prorumpat ab imo
Irriguus radiorum imber, Coelumque per amplum
Effundat recto se tramite; Quidquid opaci 45
Corporis objiciat sese, cursumque moretur,
Margine distinctam certo determinet umbram.
Finge etenim, quacumque patet via libera, virgas
A puncto vibrante jubar procurrere recto
Tramite in immensum; sed qua se corpus opacum 50
Objicit, infractas dorso consistere, et ultra
Quod superat, vacua spatium rarescere ab aura.
Id spatii, virgas inter quod restat inane,
(Nonne vides?) omni viduatum luce carebit,
Et penitus tenebris mersum nigrescet opacis. 55
Quod dextra, laevaque ictus persentit inani

campos. Ibi potissimum Sole ad occasum vergente longissimâ jam umbrà, nullo pacto licet discernere, ubinam terminetur umbra ipsa.

3 Ut phaenomeni reddatur ratio, profertur casus, in quo margo umbrae deberet esse distinctissimus; si nimirum radii erumperent omnes ab unico puncto. Considerentur enim omnes radii, qui prodeunt ab eo puncto, ut quaedam solidae virgae in infinitum prorensae, qua nullum habetur obstaculum, et infractae in superficie corporis opaci interpositi. Spatium omne immune a virgis, est umbra totalis, nullo radio illuc penetrante: qui ex hac umbra emergat ad virgas, statim abibit ad lumen plenum ita, ut

Accedat

Accedat spatio quantum libet, aureus olli
Objice summoto plena luce ingruet imber.
Nam referunt radios virgae, quem abrumpit opaci
Dorsum obicis, non ille ultra progressus ad umbram
Pertinet; ast alius, quamvis sit proximus olli, 60
Progreditur liber, coeptumque agit aethere cursum:
Quumque omnis puncto radiorum nimbus ab uno
Prorumpat, rectusque volet; vi pollet eadem,
Et rutilat splendore pari, qui proximus umbrae 65
Nigranti, quique aversas petit avius oras.
At quoniam 4 totus Titan nitet, undique et alto
Tela jacit dorso effulgens, lucemque ministrat;
Quacumque ignifero nullum de corpore punctum
Cernitur, ardentesque genae, dorsique recurvi 70
Margo latet totus, nigrescunt omnia, et umbra,
Lumine summoto penitus, densissima regnat:
Quae totum Titana vident, speciemque rotundae
Libera prospectant frontis loca, lumine gaudent
Persusa integro, plenaque in luce nitescunt: 75
Sunt alia in medio, quae partem è fronte nitenti
Aspiciunt; partem interjecta obstacula condunt:
Hìc tenebris rutilum lumen miscetur opacis,

in ipso initio vis luminis debeat esse eadem, ac in ulterioribus locis, cum simplices ab unico puncto digressi radii habeantur ubique extra illam umbram.

4 Confusi marginis causa est ipsa Solis magnitudo. Sunt enim semper quaedam loca post corpus opacum, ex quibus nullum videri potest punctum solaris disci, et ibi est umbra plena: sunt alia, ex quibus licet videre totum Solis discum, et ibi est lumen plenum: sunt alia, ex quibus apparet tantummodo pars solaris disci, et ibi habetur mixtum quoddam ex luce, et umbra, quod eo est obscurius, quo minor pars cernitur ipsius disci solaris.

Hìc tibi confusae dubius male cernitur umbrae
Terminus, hìc incerta almae confinia lucis. 80
Hanc, [5] quoniam media est purum jubar inter, et umbram
Pene umbram dixere, suo qui nomine docti
Quaeque notant. Illa, umbroso qua proxima limbo,
Par umbrae, similisque, jubar vix excipit ora
Solis ab extrema: tum quo magis inde recedit, 85
Clarescit magis, et media qua parte nitentis
Prospectat media ora Dei, jam luce potenti
Emicat, et pleno vix quidquam à lumine distat.
Ipsa [6] autem, objecti qua proxima corporis umbra

5 Hic jam patet, cur dicatur *Penumbra*, nimirum *pene umbra*, quo ipsam nomine nominavi etiam in carmine, cum utrumque sit latinum verbum; adhuc tamen diverso semper caractere imprimendum curavi ob conjunctionem earum vocum alienam ab ingenio Latinae linguae potissimum in quibusdam casibus, in quibus mihi adhibenda fuit. Ipsa penumbra eo est obscurior, quo propior umbrae, quia eo minor inde videri potest pars solaris disci. Ubi tamen eo jam deventum est, unde dimidium cernitur disci ipsius, jam lux est fere ita clara, ut in luce integra, juxta ea, quae diximus lib. III. ab adn 39

6 Ostenditur, jam, cur penumbra corporis proximi sit arcta, et corporis remoti admodum ampla; et res applicatur penumbrae, quam corpora verticalia projiciunt in planum horizontale. Concipiantur bini Solis radii, quorum alter egreditur a summo, alter ab imo disco Solis, qui transeant per summum apicem corporis opaci projicientis umbram. Ii radii ibi se intersecabunt, et pergent porro ita, ut, qui venit a puncto altiore, descendat infra alterum, qui venit ab inferiore. In illa decussatione ii radii continebunt angulum, in quo tota penumbra continebitur; nam infra inferiorem habebitur totalis umbra, et supra superiorem totalis lux: anguli autem vertex erit in eo supremo puncto corporis projicientis umbram, in quo se ii bini radii intersecant.

Jam vero in quovis angulo a binis rectis lineis constituto ipsae lineae initio parum admodum a se invicem distant, eoque minus caeteris paribus,

Exoritur

Exoritur dorso, tenui cur tramite sese 90
Finiat adstringens: tum quo magis inde recedit,
Atque obicem simul, et Phoebeam lampada linquit
Progrediens, crescat semper *pene umbra*; magisque
Ambiguus partes margo se tendat in omnes;
Huc animum adverte, et facili ratione patebit. 95
Tot radios inter, qui missi à lampade Solis
Culmina seu tecti, sive alti culmina montis
Perradunt, perguntque agiles, tu mente sagaci
Contemplare duos, qui nempe à vertice summo
Promicat, et fundo contra qui erumpit ab imo. 100

quo angulus est minor, tum eo magis recedunt a se invicem, quo magis recedunt ab illo vertice: ac proinde penumbra in exigua distantia a vertice est exigua: ea vero idcirco etiam est multo minor, quod ille angulus est exiguus, est enim aequalis diametro apparenti Solis, nimirum paullo major dimidio gradu; sed eadem deinde crescit, et in ingenti distantia, evadit ingens.

Facile demonstratur illud, si umbra excipiatur plano perpendiculari ad radium Solis, quo ea terminatur, totam amplitudinem penumbrae fore idiomate trigonometrico ad distantiam verticis umbram projicientis a puncto, in quod projicitur, proxime, ut est sinus diametri apparentis Solis ad sinum totum, sive proxime unam e 9 millesimis partibus ejus distantiae; quod si excipiatur in plano obliquo fore eo majorem, quo obliquitas fuerit major, nimirum ad illas novem millesimas proxime, ut est distantia verticis projicientis umbram ab ipso loco umbrae ad distantiam ipsius perpendicularem ab eodem plano, sive trigonometrico idiomate, ut est sinus totus ad sinum anguli, quo ille radius inclinatur ad id planum. Inde facile potest computari magnitudo penumbrae pertinentis ad tectum, vel montem, cujus umbra recipiatur in area horizontali, vel in campis, data altitudine ipsius tecti, vel montis, et elevatione Solis supra horizontem, a qua pendet distantia, ad quam umbra projicitur

Si montis altitudo supra campos quosdam sit unius milliarii, et umbra in eos campos projiciatur ad distantiam trium milliariorum a vertice; penum-

Ille, alma à luce incertus qui distinet umbram
Nigrantem limes, radiis concluditur istis,
Inter utrumque jacens: tristi prior imminet umbrae,
Contingit pleno loca lumine laeta secundus.
Illi igitur primo exortu procul usque remoti 105
Paullatim ad sese accedunt; et culmine in ipso
Conveniunt, flexumque acuunt; dumque aëre aperto
Pergit uterque suum rectus producere cursum,
Se fugiunt iterum, et geminato crure decussant.
Namque prior, summo Phoebi cui celsior ortus 110
Vertice, demittit pronum caput: altior illum
Despectat, qui limbo humilis prorupit ab imo.

His animadversis, jam caetera sponte patescent.
Nam quoties rectis consurgit cruribus, atque
Flexus hiat, quo crura apicem producta relinquunt 115
Usque magis, magis à sese distracta recedunt
Ipsa simul, latoque magis panduntur hiatu.
Hinc quoniam tenui flexu concluditur, atque
Qui purae densam luci disterminat umbram,
Margo jacet gemino crure interceptus; in ipso 120
Exortu, aut tenui si sistitur intervallo,
Ipse etiam tenuis spatio finitur in arcto.
Quo mage progreditur, campisque patentibus idem
Excurrit procul, hoc etiam mage crescit eundo.

Nunc age [7], palloremque Deae jam nosce triformis.

bra perpendiculariter excepta erit passium 27, et excepta in illo plano erit triplo major, nimirum passuum 81; unde patet illud, quod superius dictum fuerat, *multis passibus erres incertus.*

[7] Habentur jam igitur ea omnia quae fuerant proposita. Pallor Lunae ante eclipsim provenit a penumbra; pallor eo est densior, quo magis acceditur ad tempus eclipseos, quia penumbra eo est densior, quo

Horrentem

Horrentem cono tristi dum projicit umbram (125
Aëra per vacuum; Phoebique intercipit ignes
Terraï moles interfita, terminat illam
Confuso incertus circum undique margine limes;
Et lucem obscuris miscet *pene umbra* tenebris. 130
Hanc subit, hinc pallore genas perfunditur, ante
Quam penitus densa se Cynthia condat in umbra.
Ipse autem primum tenuis densatur eundo
Oris divini pallor, quia quo mage ad umbram
Accedit *pene umbra*, velut memoravimus ante; 135
Hoc etiam partem lucis de fronte minorem
Prospicit, atque magis ferrugine tingitur atra.
Cumque procul superas se tantum attollat in oras
Cynthia, Telluremque imam procul alta relinquat,
Ingenti spatiique, et temporis intervallo 140
Ante umbram pallere Deae nitida ora triformis
Incipiunt; namque ipsa, altum dum assurgit in Axem,
Distrahitur *pene umbra*, aperitque patentia crura.
Atque utinam et nobis concederet auctor Apollo;
Quod Terrae, Coelique licet mensoribus, atros 145
Ceratave super tela, tenuive papyro
Ut calamo Vates tractus signemus acuto,
Seu radio in multa sulcos ducamus arena!
Ut tibi *pene umbrae* certos, umbraeque nigrantis,
Luminis et pleni fines, oculoque fideli 150

umbrae propior: incipit ille pallor longo tempore ante eclipsim, quia penumbra debet esse amplissima in ingenti distantia Lunae a Terra projiciente penumbram ipsam.

8 Ad percipienda penitus, quae consequuntur, necessarium esset schema, vel saltem id prodesset plurimum; verum, ut juxta harum adnotationum institutum ab eo hic abstineamus, curabo, ut sola imaginationis vi res satis intelligi

 Subjicerem,

Subjicerem, auratàeque notarem cuſpide virgae!
Ingens diſtentae ſupremo in vertice telae
Picta globi ſpecies ſtaret, Phoebumque referret.
In medio Tellus tenui conſiſteret orbe:
Tum quatuor (tantum quatuor nam tramite recto 155
Hinc poſſunt, atque hinc orbes conradere binos)
Nigrantes irent tractus, binique mearent
Extrorſum, bini contra ſeſe inter utrumque
Insererent tereti figentes oſcula dorſo.
Tum mediis rectum aſpiceres traducier axem 160
Orbibus, atque ipſo tractus concurrere in axe.
Scilicet externa primi qui parte meabant,
Terreſtris dorſi poſt oſcula preſſa coirent,
Et tenui umbriferum finirent cuſpide conum: (165

poſſit ſchemate ipſo tantummodo concepto: ejus ope facile determinantur, et oculo ipſo ſubjiciuntur termini penumbrae, umbrae, et luminis pleni.

Schema, quod pro eclipſi Lunae oculis ſubjicienda proponi ſolet, eſt hujuſmodi. Habetur in vertice circulus multo major, qui referat Solis globum, in medio alter minor, qui Terram. Tum ducuntur quatuor rectae lineae, quarum ſingulae contingant utrumque circulum, quae omnes producuntur longe ultra Terram: duorum autem circulorum, quorum alter totus jaceat extra alterum in eodem plano, nonniſi 4 tangentes communes duci poſſunt, quarum binae extrorſum cadunt reſpectu utriuſque, ac eos inter ſe concludunt ambos, reliquarum binarum ſingulae interſecantur inter eoſdem binos circulos relinquentes alterum ad unam plagam, alterum ad alteram. Accedit axis, ſive recta linea ducta per centra illorum circulorum, et producta longe itidem ultra Terram.

Jam vero priores binae ex illis quatuor tangentibus concurrunt in hoc axe ultra Terram in cuſpidem acutam, et exhibent conum umbrae terreſtris; poſteriores duae concurrunt in eodem axe, ſed inter binos circulos, ante quam deveniant ad contactum cum Terra; ultra quam idcirco ſemper magis recedunt a ſe invicem: quidquid ſpatii concluditur in-

Phoebum

Phoebum inter, Terramque aliis concursus, et ante
Incurvi contactum orbis, qui deinde per auras
Diversi aethereas fugerent procul, atque patenti
Defererent flexu seseque, umbramque nigrantem.
Hos inter, conumque omnis conclusa jaceret
Pene umbra, at vacuas immensum extensa per oras.
Quod spatii ultra ipsos tractus superesset, id omne
Illaesum pleno gauderet lumine Phoebi.
Transversos demum tractus incurva secaret
Linea, signaretque viam, qua plena nitenti
Dum vehitur curru, primum pallore decoros 175
Confundit vultus, tum densa conditur umbra
Cynthia, dum redeant iterum pallorque, jubarque.
Singula 9 quod si etiam momenta notare liberet,

ter illum conum, et hasce binas tangentes post earum contactum cum orbe Terrae, pertinet ad penumbram, et ex quovis puncto ejus spatii Sol suspiciatur, Luna tegit aliquam ejus partem. Quidquid autem habetur extra hosce limites, videt integrum Solem, et proinde habet lumen plenum.

Accederet ipsi schemati linea transversa exprimens viam centri Lunae projectam in ipsum schematis planum, quae determinaret amplitudines penumbrae, et umbrae in ipso situ orbitae lunaris.

9 Non limites tantummodo penumbrae proposueramus considerandos, sed et tempus, dicendo, multo ante eclipsim apparere pallorem illum: id tempus facile itidem definiri potest ope schematis, quod haud ita difficulter concipitur. Constat id binis circulis concentricis, quorum alter refert sectionem coni umbrae in regione orbitae lunaris, alter sectionem penumbrae. Diameter prioris esset fere tripla diametri Lunae, uti diximus in adn. 34 lib II. Intervallum autem inter binos circulos, sive distantia limitis penumbrae a limite umbrae, esset fere aequalis semidiametro Lunae.

Hoc posterius patet ex adn. superiore 6. Diximus enim ibi, angulum, quo continetur penumbra, terminatum radiis se intersecantibus in ipsa Terra, aequari semidiametro apparenti Solis; adeoque amplitudo pen-

Quo tenuis pallor primum incipit, atra serenam
Quo primum attingit frontem, penitusque tenebris 80r
Obruit umbra genas, quo Cynthia lumine rursus
Incipit effulgere novo, vel quo fugit omnis
Tandem umbra, aut pallor tandem quo desinit omnis;
Altera tela tibi pictis simul omnia signis
Subjiceret lustranda. Amplam tela ipsa referret 185
Planitiem, qua tum conus, qui continet umbram,
Tum fusco *pene umbra* sinu transversa secatur.
Has gemini exprimerent orbes, quorum arctior umbram
Praeberet tristem, confusae latior alter
Pene umbrae fines, ac lumina mixta tenebris. 190
His medium commune foret, primusque pateret
Ter tantum crassus, quanto protenditur orbe
Ipsa Deae species, et quod jacet inter utrumque,
Ferme unum ex îsdem comprenderet intervallis.
Tum recta inferret sese, atque excurreret ultra 195
Semita, quam lento percurrit Cynthia gressu.
Transversi ductus horas, momenta notarent

umbrae visa e loco intersectionis, nimirum e Terra, debet apparere aequalis diametro apparenti Solis, cui itidem apparet ad sensum aequalis diameter Lunae juxta adn. 13. lib. I.

Hisce circulis accederet linea referens viam centri Lunae, recta idcirco, quod curvae etiam lineae exiguus arcus habetur pro recta; ea vero recta transiret in minore, vel majore distantia a centro communi, prout medium eclipseos accideret magis, vel minus prope nodos. Luna transcurreret gressu lento, cum plures horas impendat ad omnes illos circulos superandos, qui in exiguo schemate picti habentur ob oculos.

In hac ipsa recta notari solent per lineolas ipsi perpendiculares horae, quibus Lunae centrum debet appellere ad illa ipsa puncta ejus rectae, quae ita notantur, et ipsae horae minoribus lineolis, et punctulis dividi solent in singula, vel quina minuta.

Hinc,

Hinc, atque hinc adscripti apices, numerique monerent
Appositi, medius Divae quo tempore quemque (200
Transversum aut ductum, aut apicem contingeret orbis.
Sic [10] distincta quater senas ubi tempora in horas
Cuspidis auratae vertex designat, (in imo
Appensum gremio pondus, seu lamina flexo
E chalybe assiduo nisu trahit, atque rotarum
Convertit terga, et flexus contorquet in aequos), 205
Circum apices, circum numeri; et nigrantia senas
Signa notant horas: lento sese aurea cuspis
Circumagit gressu, jamque hunc, jamque indicat illum,
Inque diem gyro quater intorquetur eodem.
Hic etiam [11], quamquam haud aurata cuspide, acutus
Tempora designaret apex, quem mobilis orbis 210
Lunaï referens orbem, exsectusque papyro.

10 Ejusmodi divisio est similis divisioni circuli notantis horas in horologiis illis, quae habent unicam cuspidem horariam; quae si majora sint, uti sunt ea, quae in turribus prostant, possunt horarum intervalla facile dividi in dena, vel quina minuta, ut eadem cuspis haec etiam indicet; atque id facilius in italicis horologiis, in quibus dividi solet circulus horarius in horas tantummodo sex, et ipso aere campano nunquam exhibentur plures, quam sex ictus, cum ex una parte molestum sit numerare decem, undecim, duodecim ictus, et ex alia difficile sit sex horis falli in hora indicata. Idcirco posui *quater senas*, et *gyro quater intorquetur eodem*; nam reipsa cuspis apud nos in Italia quater gyrat.

Ragusii, me adhuc puero, ingens horologium publicum et notabat in circulo horario, et exprimebat ictibus omnes 24 horas, quas et nos Italico more nominamus, cum dicamus vigesimam tertiam, et vigesimam quartam semihora ante, et semihora post occasum Solis. Illud erat sane incommodum, cum tot minuta requirerentur ad 24 ictus edendos, et numerandos, facili admodum errore in tanta numeratione. Credo postea redactum esse ad ictus vel 12, vel 6.

11 Ad percipiendum fructum ex superiore schemate, addi

E tenui, gremio pertusus haberet in imo.
Scilicet hunc lenta posses deducere dextra,
Signatamque viam percurrere, perque patentem 215
Se numeri objicerent aditum, et momenta docerent,
Queis pallor vultum, queis caeca involveret umbra.
E geminis illis namque orbibus exteriorem
Mobilis hic Phoebes cum primum attingeret orbis,
Tingere tum primo inciperet pallore nitentes 220
Diva genas: cum se hic penitus mersisset in illum,
Tum penitus toto palleret Cynthia vultu.
Sic etiam interior tum primam ostenderet umbram
Contactu gemino, tum quo progressa tenebris
Tempore jam penitus se Diva involvat opacis. 225
Reddita sic etiam nova lumina, palloremque
Excussum prima seu fronte, aut corpore toto
Idem iterum geminis dans oscula mobilis orbis
Orbibus innueret, certa et momenta notaret. (vens
Haec tu oculis lustrans, numerosque, et picta revol-
Signa animo, volucrique erectus in ardua mente (230
Sydera, ut obtutu haereres defixus in uno,
Dulciaque attonitum mulcerent gaudia pectus!

potest circulus exhibens discum Lunae in sua proportione ad eos circulos, exsectus ex altero chartae frustulo, qui tamen interius perforari deberet relicta cuspide, quae centrum denotaret. Ducendo cuspidem ipsam per illam lineam, quae denotat viam centri Lunae, appareret statim, quanta eclipsis deberet haberi quovis momento temporis: sed, quod huc pertinet, facile statim haberi possent momenta quibus inciperet, et desineret Luna mergi tam in penumbram, quam in umbram. Id, si eclipsis fit satis magna, praestarent quaterni contactus circuli mobilis cum singulis e binis circulis umbrae, et penumbrae; bini exteriores, et bini interiores, uti satis exprimitur ipsis versibus.

Sic

Sic olim [12] et, Sicula miles Romanus in urbe
Dum fureret duri post longa incommoda belli 235
Victor, et ense ferox, sparso saeviret et igne,
Jamque altae quassatae arces, jam tecta ruebant
Ardua, fumantesque globi, flammaeque volucres
Aëra complerant vacuum, et cruor undique rivis
Per fora, perque vias manabat grandibus; unus 240
Qui patriam ingenio fidens, non milite denso,
Servârat longùm, instantemque represserat hostem,
Incumbens baculo senior pendebat, et alta
Inscribens radio contemplabatur arena
Mille notas: non ille gravi clangore tubarum, 245
Non gemitu, non singultu, et clamore cadentûm,
Flammarumque globis stridentibus, atque ruentis
Concussus patriae excidio, defixus inhaeret,
Perque notas oculo pronus discurrit acuto.
Nequidquam stricto miles jam barbarus ense 250
Imminet, infixoque latus mucrone recludit:
It cruor, et vacuo pereunt in corpore vires:
Non casum dolet ille suum, atque indebita fata
Conqueritur, gemit effuso sed sanguine mersos

12 Notissima est magni Archimedis sors in obsidione Syracusanae urbis, qua capta, cum is a milite ipsum non agnoscente confoderetur, dum totus erat in geometrica quadam contemplatione, de sola schematis confusione, dicitur conquestus esse. Ingentem etiam animi abalienationem quandam à sensibus, et geometricam velut extasim, passus erat utique Archimedes ipse, cum nudus e balneo prosiluit inclamans illud suum *Εὕρηκα*, *inveni*. Huc etiam pertinet notissimum illud Italicum *Come lo Geometra, che s'affige*. Quanta sit earum contemplationum voluptas, ii soli norunt, qui ad profundiora Geometriae mysteria penetrarunt.

Superiorem horologii comparationem cum sequentibus versibus composueram in itinere Perusia Nuceriam, in quo a

Ingenii

Ingenii foetus moriens, confusaque signa: 255
Usque adeo rapiunt animos ea signa, notaeque.
Sed quoniam [13] nodis, et dura compede vincti
Heu miseri vates adstringimur, atque notarum
Usus abest, numeros versu nec possumus omnes
Exprimere, et rerum mensuras dicere certas; 260
Pauca tibi expediam, quae multum oratus Apollo,
Parnassique sinent leges, et dura Camoena.
Principio [14] Solis motus, Lunaeque per Axem
Si serves vigil, et componas omnia cautus
Sese inter, facile invenies, quantum ipsius orbis 265
Extendit sese, tantum discedere in horas
Fratris ab orbe Deam, tantumque accedere ad oram
Oppositam, et tristem se tantum inferre per umbram.
At ferme hoc ipso, veluti memoravimus ante,
Pene umbrae exterior disjungitur intervallo 270
Orbis ab orbe umbrae, ac ferme ter crassior umbra

prandio digressus Assisio ingens adii vitae periculum, quod exposui opusculo 1. *Litterariae Expeditionis* adn. 94. Nuceriam delatus verspere per effusum imbrem, conscripsi in aedibus Gubernatoris ejus urbis, quae pertinent ad Syracusanum excidium, dum fulgurationes perennes, et immanis tonitruum fragor truces mihi ideas suggererent.

13 Iterum hic jure queror de difficultate exprimendi versibus res geometricas, et calculos; conor tamen praestare, quantum per poësim licet, praecipua attingens capita, et calculos crassiores instituens numeris, ut ajunt, rotundis.

14 Lunam ad Solem ex altera parte accedere, et ex altera recedere proximè per intervallum aequale diametro apparenti suo, diximus adn. 30. lib. II; adeoque idem est ejus motus respectivus respectu coni umbrosi, qui semper obtinet partem Soli oppositam e diametro, et habet idcirco motum eundem, quem ipse Sol. Cum igitur diximus hic adn. 9. intervallum inter limites penumbrae, et umbrae esse circiter aequale diametro Lunae, et umbrae diametrum fere triplam in eclipsi centrali, in qua Lu-

Est

Est ibi, terque magis vasto distenditur orbe.
Ergo, quod sequitur, recto si calle per ipsum
Umbraï medium Dea permeet, effluet hora
A primo ad primas frontis pallore tenebras, 275
Altera, dum densis frons tota immergitur umbris;
Tum ferme binae in tenebris; dumque umbra recedit
Paullatim, toto lux et redit aurea vultu,
Dumque fugit totus pallor, bis defluet hora.
Si vero [15] obliquo tulerit se Diva meatu, 280
Et mediam fugiens umbram transversa feratur,
Longius à primo frontis pallore tenebras
Effluet ad primas, tenebris pariterque fugatis,
Majus erit, pallor dum toto abscedat ab ore:
Longius ipsum etiam, totos dum nigra tenebris 285
Aut vultus tegat, aut paullatim detegat umbra:
At contra minor in tenebris mora: quin procul orbe
Cum saepe à medio discedat semita, saepe

na transeat per ipsum umbrae centrum percurrens ejus diametrum; effluet hora ab initio penumbrae ad initium eclipseos, tum per unam horam crescet pars obscurata, usque ad immersionem totalem, et aliae fere binae horae evolventur, donec limbus praecedens, tota diametro emensa, adveniat ad finem umbrae, et incipiat emersio, quae durabit itidem circiter per unam horam, ac demum, altera evolvetur hora usque ad penumbrae finem.

[15] Si Lunae orbita sit obliqua ad illos circulos, quod accidit fere semper; quatuor tempora ab initio penumbrae ad initium immersionis in umbram, ab hoc ad finem immersionis, ab initio emersionis ad finem, a fine hujus ad finem penumbrae, erunt utique longiora, et mora in umbra totali, vel etiam tempus ab initio immersionis ad finem emersionis erunt breviora. Id quidem admodum facile demonstrari potest geometricè ope illius ipsius schematis. Patet autem illud, quod hic additur, saepe fieri, ut orbita lunaris nimis distet a media umbra, ut idcirco pars tantummodo disci Lunae incurrat in umbram fae-

Sive

Sive umbram non tota ſubit, ſeu Cynthia tantum
Pallet vicina, non et nigreſcit, ab umbra. 290
Non tamen [16] haec penitus, non haec tibi tempora
Immutata manent: clauduntur finibus arctis (ſemper
Illa quidem, at fines intra mutantur eoſdem
Pro vario et fratris poſitu, Divaeque ſororis.
Quo propior terris Titan, hoc arctior umbrae, 295
Latior at *pene umbrae* orbis, magis et celer ipſe
Phoebusque, oppoſitusque axis volat, atque ſequentem
Proinde magis celer et Phoeben fugit umbrifer orbis,
Denſatisque magis fugienti paſſibus inſtat.
Rurſum etiam Terris propior quo Cynthia, coni 300
Hoc magis umbriferi craſſos pervadit, at arctos
Pene umbrae fines magis, ac mage praepete curſu
Et Phoebum, oppoſitamque umbram ſequiturque, fu-
(gitque.

pe enim plenilunium eclipticum celebrari debet in majore diſtantia a nodo.

16 Facile patet, quod hic affirmatur, non ſemper haberi debere accurate eadem illa tempora, quae expreſſimus, ſed ea variari intra quoſdam certos limites; pendent enim a diverſa poſitione Solis, et Lunae, quibus mutatis mutantur etiam ipſa. Quo Sol eſt propior Terrae, eo ceteris paribus conus umbrae eſt arctior, et conus penumbrae latior in eadem diſtantia a Terra, nam radii tangentes globum majorem Solis, et minorem Terrae eo debent magis incliuari ad ſe invicem, quo minus eſt eorundem globorum intervallum; adeoque radii umbram efformantes, cum convergant, magis convergent in eadem diſtantia, et radii efformantes penumbram magis divergent. Mutatur igitur ex eo capite magnitudo circulorum tam umbrae, quam penumbrae. Ob eandem autem minorem diſtantiam apparens celeritas Solis circa Terram erit major, cum debeat eſſe aequalis celeritati Terrae circa Solem, quae in diſtantia minore ab ipſo eſt major juxta adn. 28. lib. I; adeoque major eſt celeritas coni umbroſi, quae aequatur celeritati Solis, et a qua pendet celeritas reſpectiva Lunae reſpectu ipſius umbroſi

Jam

Jam vero qua Luna meat, si longior extet
Semita, praecipitique minus ruat illa volatu, 305
Temporis intervalla fluent majora, vicesque
Ipsa etiam contra oppositas breviora sequentur.
Rebus in his [17] unum superest, quod noscere per te
Ipse potes, si, quae supra memoravimus, alto
Fixa animo repetas, memorique in mente revolvas. 310
Scilicet ante nigram pallor quod postulat umbram,
Vel postquam densae penitus fugere tenebrae,
Intervallum horae, frustra deprendere speres,
Intentis quanquam usque oculis, primusque tuentem,
Postremusque fugit pallor; lucem inter, et umbram 315
Nam media, igniferi tantum qua respicit orbis
Cynthia dimidium (reliquum rapit invida Tellus),
Luce tamen tanta imbuitur, tamque aurea vultu
Emicat, ut pleno vix quidquam à lumine distet.
Ergo ubi pallentem longum suspexeris, atque 320

coni, adeoque tempus.

Varia distantia Lunae a Terra, mutat pariter eadem tempora; nam Luna propior Terrae permeat partem crassiorem coni umbrosi, qui, quo magis recedit a Terra, eo magis attenuatur, donec desinat in cuspidem; permeat autem partem arctiorem penumbrae, quae cum includatur binis radiis se intersecantibus prope dorsum Terrae, quam contingunt, quo magis recedit a Terra, eo magis dilatatur juxta adn. 6 hujus. Ipsa itidem Luna Terrae propior movetur celerius, quod tempus contrahit.

17 Quod hic innuitur pendet ab adn. 5 hujus, et 39. lib. III: nimirum non tota penumbra est sensibilis; ibi enim, unde dimidius discus Solis adhuc cernitur, lumen apparet plenum; quin etiam ad lucem satis vividam abunde est multo minor pars solaris disci;. Hinc initium penumbrae non solet observari nec per horam, nec vero per semihoram ante initium immersionis in umbram, nec penumbrae finis tanto intervallo temporis post finem immersionis. Vix uno

Intentos

Intentos in frontem oculos defixeris haerens;
Sufpenfus, dubiusque diu, vix denique lucis
Perfpicies jacturam, umbrae cum proxima trifti
Diva timet denfas jam jam mergenda tenebras,
Poftremusque oculos pallor jam ludet hiantes, 325
Vix bene cum tenebris emerget laeta fugatis.

Hactenus [18] unde genis pallor: nunc unde per umbram
Qui fuperant tenues radii, lumenque malignum,
Expediam; natura tibi fed luminis aurei
Contemplanda iterum, vis et quae mutua, fractos 330
Dum torquet radios, flexus parit, atque reflexus.

Primum igitur tam multa inter quae corpora lucem
Accipiunt, coeptumque finunt producere curfum,
Sive fluant, feu mole pigra concreta rigefcant,
Illa quidem lucis radios non viribus îfdem 335
Ad fefe rapiunt, uno non omnia nifu.
Nam, quae denfa minus, nifi forte aut fulphure olenti,
Aut craffo, qualem femper frondentis olivae

quadrante ante, et poft pallor in Luna eft fatis fenfibilis.

18 Fit jam hic gradus ad explicandum, cur Luna immerfa in ipfam umbram Terrae habeat adhuc lumen refiduum, quo fit, ut eam et ibi fere femper adhuc videamus. Id quidem provenit a lumine, quod tranfit per atmofphaeram Terrae extantem ad margines hemifphaerii ipfius Terrae refpicientis Lunam, ubi id refringitur, et intorquetur introrfum in ipfam umbram, ac devenit ad Lunam.

Ea occafione innuitur theoria, et caufa refractionis. Corpora agunt in lumen, et lumen in corpora, uti diximus adn. 4. lib. III; fed haec actio non eft eadem in omnibus corporibus: ceteris paribus corpora denfiora plus agunt, fed pari etiam denfitate corpora magis unctuofa, et fulphurofa magis agunt in lumen, ut e contrario ipfa citius ab eodem lumine inflammantur. Hinc ubi lumen obliquè tranfit e medio rariore in denfius, vel in medium pinguius; refringitur, five mutat directionem itineris fui, atque id accedendo ad lineam

Telegoni propter colles, Setinave rura
Dant ſuccum teretes bacchae, plus pinguia pollent,
Debiliore urgent niſu, & minus avia cogunt (340
Ire loca, ac recto deflectere tramite lucem.
At contra quae denſa magis, ſeu ditia pinguis
Materiae, majore etiam vi lumina ducunt,
Infractaeque jubent ductum intorquere viaï, 345
Ergo ubi de tenui, et craſſo minus, ad mage denſum
Ingreditur, ſeu pingue magis lux aurea corpus
Obliquum per callem; ipſo ſe in limine primo
Erigit, atque obliqua minus procedit: at inde (350
Dum rurſum egreditur, rurſumque ad tenvia tranſit
Corpora, ſeu quae craſſa minus, deflectitur ipſam
Pronior ad faciem contra, atque obliquior exit.
Nam, qua parte magis trahitur lux incita, coeptum
Inclinat curſum intorquens, maſſaeque propinquat
Urgenti niſu majore, minusque trahentis 355
Corporis à medio, velut indignata, recedit.

perpendicularem ſuperficiei, in quam ingreditur; contra vero ſi e medio denſiore, vel pinguiore tranſit ad rarius, vel minus pingue, refringitur recedendo a perpendiculo, quod quidem fit certa lege, cui innititur tota dioptrica, quae appellatur ratio conſtans ſinuum anguli incidentiae, et anguli refractis; ſed ea huc non pertinet. Vis attractiva major cogit particulas luminis accedere ad ſuperficiem attrahentem, adeoque in ingreſſu denſioris medii acceſſu continuo ad ſuperficiem ita incurvatur via radii, ut evadat magis erecta ad ipſam ſuperficiem, et e contrario in egreſſu retracta in ipſam inclinatur ad eandem motus ipſius particulae, et radius evadit magis obliquus.

Dum nominatur hiç oleum, nominantur Telegoni colles, et rura Setina, nimirum loca proxima Tiburi, quam urbem Telegonus condidiſſe dicitur, et Setiae; quae loca nunc ingentes habent olivarum ſylvas, et egregio oleo ſunt celebres nihilo minus, quam olim celebraretur ſetinum vinum, juxta illud *ſetinum ardebit in auro*,

Hinc [19] radios Phoebi dum lens cryſtallina, utraque
Parte tumens, tergo exceptos circum undique ad axem
Inflectit, ſpatioque jubet concurrere in arcto;
Ingentes ſubito flammas ciet, atque nigrantes 360
Attollit Coelo fumos, et tempore parvo
Roboraque in cineres, in calcem marmora, gemmasque
Ire jubet, maſſasque auri diſſolvit, et aeris.
Hinc etiam quaecumque olim trans vitrea ſepta
Inflexas ultra facies, quaecumque ſub undis 365
Obliqua intuimur, radiorum tramite fracto,
Longe aliis male viſa locis adſcribimus, atque
Illuſi digito monſtramus, quam quibus extant;
Ac ſaepe in ſumma fractum gemit anxius unda

19 Ea eſt ratio, cur lens cryſtallina radios colligat: phaenomenum expoſuimus lib. II. adn. 41. Incurvantur enim radii introrſum tam in ingreſſu, quam in egreſſu ob curvaturae directiones contrarias in forma lenticulari. Porro ubi radii ſolares colliguntur in foco lentis, ibi et ignem excitant, uti eſt vulgo notiſſimum; et quidem ſi lens ſit ſatis magna, fere incredibiles ſunt effectus radiorum coëuntium: vegetabilia reſolvuntur in cineres, marmora, & gemmae calcinantur, metalla liqueſcunt tempore per quam exiguo.

Fallitur etiam viſus, cum aliquod objectum tranſpicimus per vitra obliquis ſuperficiebus terminata, ut trans priſmata; nam in vitris terminatis per ſuperficies parallelas ſecunda ſuperficies parit effectum prorſus contrarium, et aequalem effectui prioris, adeoque ipſum corrigit; ſic itidem fallitur, cum oblique intuemur objecta ſita infra ſuperficiem aquae. In utroque caſu mutata directione radii advenientis ad oculum, objecto ipſi tribuimus locum diverſum ab eo, quem occupat, eum nimirum, qui jaceat in directione ultima radii ſubeuntis oculum ipſum. Et ea eſt ratio notiſſimi phaenomeni, quo remus, cujus pars in aquam immergitur, apparet fractus in ipſa ſuperficie aquae: cum enim ob refractionem debeamus punctis remi intra aquam demerſi tribuere loca diverſa ab iis, quae occupant; non tribuimus puncta jacentia in directum cum reliquis extra aquam extantibus.

Nauta

Nauta novus, vana delusus imagine, remum, 370
Et trepidus tenues correptum attollit in auras;
Dumque videt firmum, stupet inscius, et sibi, et ipsis
Diffidens oculis, digitis explorat, et ungue. (cum
Ergo [20] age, Tellurisque golbum, et circum aëra, cir-
Aetheris immensos animo tibi concipe tractus. 375
Scilicet ignifero radius qui Solis ab orbe
Aethera per tenuem rectus devenit, ad auras
Cum primum aërias delabitur, atque recurvum
Incidit in dorsum obliquus, densosque vapores
Sensit, et urgentem nisum, viresque trahentes, 380
Continuo introrsum deflectitur, atque jacentes
Cogitur intorto ad terras accedere cursu.

20 Ex hac refractionis natura illud consequitur, ut ubi radius luminis e tenuiore aethere advenit obliquus ad atmosphaeram terrestrem, debeat inflecti introrsum, et refringi accendendo ad perpendiculum. Ipsius autem atmosphaerae dorsum hic dicitur recurvum, cum debeat ipsa affectare figuram ad sensum sphaericam, ut Terra. Quoniam vero, quo magis acceditur ad superficiem Terrae, eo atmosphaera ipsa est densior ob majorem nimirum pressionem superiorem; idcirco radius ejusmodi perpetuo mutat directionem itineris sui, et describit curvam lineam, quae cavitate respicit ipsam superficiem Telluris.

Jam vero ex omnibus radiis incidentibus in totum hemisphaerium illustratum a Sole, plerique ita incurvati introrsum incidunt in ipsam Terrae superficiem, ubi si aliquis oculus illos excipiat, videt Solem ipsum elevatiorem aliquanto, quam revera est, supra horizontem, et ob eam causam mane apparet ortus Solis aliquot minutis citius, et vespere occasus aliquanto serius, quam revera accidat. At postremi, versus marginem, evitant globum Terrae, et trajecti per atmosphaeram egrediuntur iterum ex ea ad auram aetheream puriorem, per quam jam progrediuntur recti, sed directione nova magis inclinata introrsum ad axem coni umbrosi, nimirum ad rectam illam lineam, quae transit per centra Solis, et Terrae, ac producitur ultra Terram. Hu-

Et quoniam, primum tenuis, crebrescit, ad imam
Dum propior Tellurem aër demittitur, et se
Comprimit ipse suo, ac paullatim pondere densat; 385
Perpetuo cursum radius deflectit eundo;
Et terit incurvum sinnatus in aëre callem.
Hic demum ad faciem si forte allabitur amplam
Terraï, nactusque oculos perstrinxit acutos;
Phoebei speciem vultus attollit, et altis 390
Mersum undis seu mane novo, seu vespere sero
Erigit, atque imo erectum sustentat Olympo,
Producitque diem. Sunt qui Telluris ad oras,
Quas videt extremas Titan, atque aëris auras,
Incurvare viam pergunt, atque aethere aperto 395
Jam fugiunt recti, mediumque feruntur ad axem.
Atque hìc, [21] nigrantis coni quod triste tenebras,
Distinguat jubar, ac Phoeben aspergine rara
Inficiat, multaque tuenti ostendat in umbra,
Jam facili ratione patet: nam quidquid in oras, 400
Aëris extremas illapsum luminis alto
Telluris dorso non sistitur, atque ad apertum
Aethera per tenues rursum delabitur auras,
Inflexum in primos tristis circumundique coni
Invehitur fines, nigrantem et temperat umbram, 405

jusmodi sunt, ex gr., illi, per quos aves vident, si eos excipiant, Solem allapsum ad suum horizontem, qui, si nihil eos sistat in aëre, praetervolant effugientes occursum Telluris.

21 Jam vero hinc facile patet, hoc lumen, quod advenit ad marginem superficiei atmosphaerae illustratae a Sole, et per eam transvolat, ac inflectitur ad axem, debere ingredi intra conum ipsum umbrae terrestris: et id quidem incurrit in Lunam positam in ipsa umbra, ac eam respergit lumine tenui quidem, sed tali, ut adhuc commode discerni possit.

Perfusamque

Perfusamque Deam, tenui quamquam igne, colorat.
Ac tibi [22] ne dubiam teneat sententia mentem,
Contemplare nigrum tenuata cuspide conum,
Et radii perpende viam, qui proximus alto
Terraï dorso, aethereas trans aëra ad oras 410
Appulit, ac recto fertur per inane volatu.
Ille quidem egreditur medium inclinatus ad axem
Quinque magis spatiis, quam si via prima maneret,
Nec rectum incurvo mutasset tramite callem.
Hinc vero et totidem umbrosi de partibus axis 415
Lumine prima caret tantum, quae proxima terris;
Perfundit reliquas denso jubar aëre tortum.
Quod si etiam flexus perpendere, mensurasque
Et numeris numeros liceat conferre, quod arctis
Legibus adstrictae nequeunt praestare Camoenae; 420
Bis decies, et bis tantum consurgere Olympo
Invenies omni viduatum lumine conum,
Quantum lata patet transverso corpore Tellus.
Alta magis tricies sed Phoebe assurgit in Axem,
Despectatque humiles Terras, Coeloque propinquat;
Illa igitur prorsum horrentes fugit alta tenebras, 425
Sit licet umbraï in medio, fractumque per auras
Excipit aërias jubar, et se ostentat ab alto.

22 Ut id evidenter pateat, oportet videre, quantum immergatur id lumen in ipsum conum umbrae terrestris, et an demittatur usque ad eam ejus regionem, quam occupat Luna posita in centro ipsius umbrae. Ad ejusmodi investigationem esset opportunum admodum, et fere necessarium aliud schema; adhuc tamen conabimur haec, et quae sequuntur, subjicere mentis oculis, quantum licebit.

Concipiatur radius e transvolantibus infimus, qui tangit superficiem Telluris. Is post egressum ex atmosphaera habet angulum inclinationis ad axem

Hoc 23 autem, extremum quod transvolat aëra, lumen
Cur adeo langnescat hebes, Divamque triformem 430
Usque adeo tenui squallentem aspergine tingat,
Accipe. Hyperboreis licet eluctatus ab oris
Discutiat nubes Aquilo, Coelumque serenum
Fulgeat; aërias sparsi tamen usque per auras
Pervolitant, quamquam tenuata mole, vapores. 435
Saepe etenim densis dum nubibus obrutus aër
Nigrescit circum late, Coelumque, diemque
Eripit ex oculis; crebris micat ignibus aether,
Commovet horrisonus mentes fragor, aëriasque
Fulmina concutiunt turres, jamque imber ab alto 400

coni circiter quintuplo majorem, quam si sine refractione processisset. Nam angulus coni umbrosi esset sine refractione paucis secundis minor diametro apparente Solis, nimirum dimidii circiter gradus; adeoque inclinatio radii non refracti ad axem, quae est dimidia ejus anguli, est circiter quarta pars unius gradus. At refractio horizontalis syderum est circiter dimidii gradus, et haec duplicatur, dum radius tangens Terram progreditur usque ad egressum; unde illa inclinatio augetur per gradum integrum, sive per angulum quadruplum prioris, et evadit angulus inclinationis quintuplo major.

Inde autem facile colligitur, hunc radium secare axem umbrae in distantia fere quintuplo minore a centro Terrae: Calculo autem trigonometrico invenitur, axem umbrae, si Solis diameter apparens assumatur minutorum 31, continere diametros terrestres 111. Quare illa pars quinta continebit proxime diametros 22, sive ipsam diametrum *Bis decies, et bis*. Distantia media Lunae a Terra est juxta adn. 13. lib. I. semidiamettorum proxime 60, adeoque diametrorum 30. Igitur illi radii refracti ab atmosphaera terrestri immerguntur in umbram ita, ut deveniant ad axem etiam ad loca multo inferiora regione Lunae; adeoque multo magis incurrunt in ipsam. Pars coni umbrae carens omni lumine non assurgit nisi ad 22 circiter diametros Terrae: Luna in ipso centro umbrae constituta assurgit supra hunc conum penitus nigrantem, et ipsum evitat.

23 Explicandum nunc illud,

Praecipitat

Praecipitat, plenisque exundant flumina ripis;
Saepe ergo Aeolio Boreas emissus ab antro
Evolat, et siccis pluvium secat aëra pennis.
Continuo Coelum omne silet, suspenditur ater
Nimbus, et adstrictis clauduntur nubibus imbres: 445
Ipsae autem tumidae primum tenuarier, inde
Discindi nubes, Phoebique admittere hiantes
Per rimas jubar, ac demum vanescere, et omne,
Quam late Coelum patet, effulgere serenum.
Scilicet, e Libycis Auster delatus arenis 450
Quos multo fervens distenderat igne vapores,
Non illos Boreas pellit procul aëre ab alto,

cur hoc lumen, quod in Lunam incurrit, sit adeo tenue. Ratio ejus tenuitatis hic affertur duplex: prima est, quod vapores, quibus est plena atmosphaera terrestris, intercipiunt maximam luminis partem, ut idcirco exigua pars transeat per totam atmosphaeram; secunda est distractio radiorum; quorum alii refringuntur magis, alii minus; et primo quidem loco fuse admodum pertractantur, quae pertinent ad primum caput.

Ostenditur primo loco, atmosphaeram terrestrem esse plenam vaporibus etiam tum, cum Coelum apparet serenum. Vapores ii sub aspectum cadunt, ubi Coelum obruitur nubibus; at accidit nonnunquam, ut, flante Austro, et Coelo obducto nubibus densissimis, repente incipiat flare Boreas, ac nubes ipsae citissimè attenuentur, et evanescant ex oculis, quin alio abeant. Saepissime accidit, ut videamus in medio sereno Coelo nubes oriri novas, vel veteres evanescere, quin illae ex horizonte physicò adveniant, hae ad ipsum abeant. In hisce casibus patet, illos vapores, ex quibus nubes coalescunt, esse in aëre etiam tum, cum aër serenus est: dilatantur, et turgéscunt, ubi in nubes coeunt, ac attenuantur, ubi evanescunt; nam ad reflectendum lumen requiritur certa quaedam crassitudo corpusculi interjecti, et lamellae cujuscunque substantiae etiam densissimae, si certa crassitudine tenuiores sint, uti Newtonus invenit, lumini reflectendo sunt impares.

Porro haec intumescentia vaporum, quae ex pluribus caussis provenire potest, et ex fer-

Frigore sed Getico adstringit, molemque minutam
Ex oculis rapit, ac rutilum transmittere lumen
Imperat, inductumque Polo dissolvere velum. 455
At licet [24] adstricti vanescant, non tamen omnes
Phoebeae illaesos transmittunt lampadis ignes.
Partem aliam aethereas longe, lateque per oras,
Per campos, montesque altos, vallesque profundas,
Dispergunt flexu vario, partemque recondunt 460
In gremio demum restinctam: libera restat
Pars tenuis, Coelo et vix tandem erumpit aperto.

Nonne vides, Phoebo aversas cum saepe fenestras
Multa tegit tenui tantum pellucida vitro
Lamina; per conclave imum, perque atria, perque 465
Divûm aedes, sanctosque aditus, quam laeta nitenti
Fulgeat ore dies? Sparsi per inane vapores
Accipiunt, redduntque jubar, partesque per omnes
Diffusum secreta subit penetralia lumen.

Hinc etiam roseis Aurora invecta quadrigis 470
Solis equos primo praecedit mane, sub undas
Cumque idem occiduas sero jam vespere currum

mentationibus in primis, ac admixtione aliarum substantiarum volatilizatarum, et elevatarum in aërem, potest itidem provenire a calore australium ventorum, et tunc ventus septentrionalis frigidior potest eos ad minorem molem redigere.

24 Licet ii vapores ita attenuati evanescant ex oculis, et non intercipiant totum lumen; adhuc tamen intercipiunt magnam ejus partem: cujus partis interceptae partem reflectunt quaquaversus, et partem etiam intra se restinguunt. Lumen reflexum, potissimum ab atmosphaera, est illud, quod per fenestras ingreditur, et domos, ac templa illuminat. Id potissimum patet in nostro Romano templo, quod Pantheon appellarunt Veteres, in quo unica habetur fenestra horizontalis in medio fornice, quae, ubi Solem nubecula obducit, nullos admittit radios, praeter eos, quos atmosphaera terre-

Abdidit;

Abdidit; adventantem objecta crepuscula noctem
Longum arcent, tristesque vetant extendere pennas.
Scilicet extantes summi dorso aëris auras 475
Suspicit, affusoque irrorat lumine Titan,
Ille quidem nobis latitans, sed vertice ab alto
Conspicuus, maris ob curvam, Terraeque figuram.
Exceptos aurae radios jaculantur, et imos
Respergunt Terrae tractus, oculosque tuentûm. 480

Partem [25] igitur densi suscepta e luce vapores
Dispergunt, sed partem etiam intra viscera condunt.
Namque calent Phoebo expositi. Lux multa latentes
Permeat anfractus, crebrisque reflexibus errat
Discurrens: tenues incluso agitantur ab igne 485
Particulae, trepidusque oritur calor. Ast ubi longum
Per vacuos post mille vices distracta meatus
Se tulit hac, illac celeri lux incita motu,
Stat demum, atque ipsis jam fessa adjungitur auris.

Ergo quod [26] superat, longoque per aëra tractu 490
Progreditur lumen, mulctatum, ac debile languet,
Exerit et tenues objecta in corpora vires.

stris reflectit, et tamen templum ipsum clarissimo lumine illustratur. Idem autem multo clarius patet in aurora matutina, et vespertino crepusculo, in quibus, Sole infra horizontem delitescente, non aliud habetur lumen, quam illud, quod atmosphaera ab illo adhuc illuminata reflectit.

25 Praeter radios reflexos, illud arbitror, quod et apud Newtonum me alicubi legisse, credo, multas luminis particulas remanere in ipsis vaporibus veluti irretitas: plurimis enim internis reflexionibus eunt, et redeunt hac, illac, quod calorem auget, excitatis majoribus tremoribus internis, quam unica reflexio excitare possit, ac in spiras etiam abire possunt, donec demum et motum amittant, ac ipsis particulis vaporum adhaerescant.

26 Hinc illud fit, ut radius, qui ingentem atmosphaerae tractum percurrat, ingentem amic-

Sic

Sic ubi ferventem Cancri devenit ad orbem,
Produxitque dies Titan; dum clarus ab alto
Emicat, et medio Terras despectat Olympo; 495
Findit agros, urit segetes, glebasque resolvit.
Idem cum rigidi brumam advexere Decembres,
Vel cum mane novo, vel cum jam vespere sero
Vix caput attollit Coelo, et supereminet undis,
Torpet hebes, nec sive oculos splendore tuentes 500
Distinet immodico, seu membra calore perurit.
Nam quo se Terris magis erigit aethera in altum
Arduus, hoc obliqua minus, breviorque per auras
Detinet aërias radios via: proinde minorem
Immissa objecti partem de luce vapores 505
Dispergunt, conduntve sinu: via longior obstat
Obliquis contra radiis, illaesaque coeptum
Pars tenuis cursum tenet, atque obstacula vincit.

tat sui partem. Bouguerius in opere posthumo de luminis gradatione, quod hoc ipso anno Caillius vulgavit Parisiis, determinat partim ex observationibus nonnullis, partim ex hypothesibus, quota pars luminis intercipiatur in dato quovis tractu atmosphaerae terrestris, immo et aliorum etiam diaphanorum corporum quorumcunque.

Verum hunc defectum radii permeantis longum tractum atmosphaerae terrestris, satis ostendunt ea, quae hic proponuntur, nimirum tanto minor vis radiorum Solis etiam meridiani per hyemem, quam per aestatem, et mane, vel vespere, quam in meridie; nam mane quidem, vel vespere, saepissime Solem ipsum impune admodum intuemur, cujus vim in meridie ferre omnino non possumus. Id omnino provenit ex eo, quod radius Solis eo longius iter per atmosphaeram habet, quo obliquior advenit; prorsus ut si acum defigas in malum citrinum ad perpendiculum, ea multo citius ad succum interiorem devenit multo breviore via per illam ejus crassiorem extimam cutim, qua convestitur, quam si eandem defigas admodum obliquè.

Hinc

Hinc et, [27] quae Terrae dorſum legit (aëre denſo
Nam terit obliquo tam longum tramite callem) 510
Quid mirum, poſtquam aethereas erupit in auras,
Vix tenui Phoeben ſi lux aſpergine tingat?
Adde, [28] quod et flexu non intorquentur eodem,
Aëra qui tranant radii; proin tramite longo.
Diſtracti fugiunt ſeſe, et tenuantur eundo. 515
Scilicet ille magis deflectitur, aëra denſum
Qui ſecat interior, Terraeque propinquat, at ille
Qui tantum in tenues vix quidquam immergitur auras
Altior, à recto vix quidquam calle recedit.
Hìc ergo, hìc etiam e radiis tibi ſelige binos 520
Omnibus, extremas ſtringentes aëris oras,
Qui ſummo nulla vi flexus in aëre liber
Progreditur, rectusque fugit, Telluris et altum
Qui radit dorſum, ac triſtem ſubit intimus umbram.

27 Sponte jam hic patet applicatio eorum, quae huc uſque ſunt dicta ad radios, qui tranſeuntes per atmoſphaeram abeunt in Lnnam in umbra poſitam, qui nimirum, cum admodum ingentem atmoſphaerae tractum percurrant, maxima eorum parte intercepta, ad ſummam tenuitatem rediguntur.

28 Hic jam exponitur ſecunda illa ratio petita a diſtractione luminis ob inaequalem refractionem. Invenitur tanta ea diſtractio, ut radii, qui pertinent ad ſolam craſſitudinem atmoſphaerae terreſtris paucorum milliariorum, diſpergantur per ſpatium aequale toti ſemidiametro Terrae.

Ut id evincatur, concipiuntur hic etiam bini radii; alter, qui tangit ſuperficiem extimam atmoſphaerae terreſtris exercentis actionem ſenſibilem in lumen; alter vero, qui tangit ſuperficiem ipſius Terrae. Ille tranſit irrefractus; hic vero ita refringitur, ut inclinationem mutet per unum circiter gradum, uti diximus hic adn. 22. Quare ſi concipiatur hic poſterior retro continuatus in ea directione, cum qua exit ex atmoſphaera; continebit cum illo priore angulum unius circiter gradus, cujus nimirum crura interciperent unum gra-

Clauditur

Clauditur his, medio quod flectitur aëre lumen. 525
Illi se fugiunt longe, flexuque recedunt,
Unam e ter decies bissenis partibus orbis
Qui capiat, si summum imo caput inferat orbi.
Hinc ubi devenere locos, quibus ardua cursum
Dum movet, horrenti Phoebe nigrescit ab umbra, 530
Diversi fugère, ac tantum interjacet ollis
Jam spatii, quantum medio Telluris ab imo
Pertinet ad summam faciem, et revolubile dorsum.
Nam spatiis îsdem decies cum Cynthia senis
Assurgat; vix, quo terras ea circuit, orbis 535
Ter superat gyro decies bissena recurvo.
Filum etenim tereti si circumduxeris orbi
Advolvens, medio dein tensum aptaveris axi,
Invenies triplum, septemque ex ipsius axis
Partibus una super, nec pars ea tota manebit. 540
At flexus, binos radios qui distrahit, illi

dum peripheriae circuli habentis centrum in vertice anguli ipsius, sive unam e 360 ipsius partibus, cum peripheria cujusvis circuli contineat gradus 360.

Porro vertex illius anguli, nimirum illorum radiorum concursus, esset proximus ipsi Terrae, quae est centrum orbitae lunaris habitae pro circulari; adeoque illi radii in distantia Lunae interciperent inter se unum gradum ejus orbitae lunaris, sive unam e 360 partibus ipsius. Sed ipsa orbita continet paullo plus, quam 360 semidiametros terrestres, cum distantia Lunae a Terra, quae est semidiameter ejus circuli, sit semidiametrorum terrestrium 60, uti jam toties diximus, et cujusvis circuli peripheria sit paullo major, quam tres diametri, sive sex semidiametri; nam ex Archimede continet quamproximè tres diametros, et paullo minus, quam unam septimam ipsius diametri partem; sexies autem sexaginta sunt 360. Una igitur ex ejusmodi partibus est circiter aequalis uni semidiametro Terrae; et proinde radii, intercepti iis binis radiis distantibus a se invicem per solam at-

Si

Si redeant retro, inque apicem jungantur acutum,
Haud procul à Tellure caput defigeret, ejus
Scilicet à medio, quem Cynthia permeat, orbis.
Cruribus ergo idem ſpatium, quod diximus, unum 545
Concludit flexus, ſpatioque recedet eodem,
Qui radius ſummas vix attigit aëris auras,
Quique imo Terrae interior dedit oſcula dorſo.
His [29] animadverſis, nil jam mirabere Phoeben
Squalentem in media vix internoſcier umbra. 550
Flexum etenim aëriis, lumen, quod prodit ab auris,
Jam tenue, et tanta mulctatum parte, per amplum
Pluſquam centenis paribus magis, aëra primum
Quam ſubiens, ſpatiis diſtenditur intervallum.
Quid dubitas? Radios aër torquere citatos 555
Qui valeat, minus hinc conſurgit in aethera, quam qui
Pergenti dominam ſignat quid reſtet, ad Vrbem,
Qui quartò eſt decimus, diſtet lapis, ardua qua ſe

moſphaerae craſſitudinem, diſperguntur per ſpatium circiter aequale uni ſemidiametro Terrae, quod quidem probandum propoſueramus.

29 Colligitur jam hic tota vis hujuſce argumenti. Id lumen, quod in atmoſphaera terreſtri refractum ſubit umbram Terrae, et ad Lunam devenit, diſpergitur per ſpatium ſaltem centuplo latius. Nam atmoſphaera Terreſtris omnino non aſſurgit ultra 40 millia paſſuum, quorum ſingula continent 5 pedes pariſienſes, et ſemidiameter Terrae continet quamproximè 4000 eorundem milliariorum.

Ad deſignanda 40 milliaria, nominavi pontem, quem ſane magnificum Xyſtus V. Tiberi impoſuit ad quadrageſimum ab Urbe lapidem, unde factum eſt, ut eum tunc dixerint ab ejus nomine, et adduc dicant *pontem Felicem*; nam ipſe ante Pontificatum appellabatur Felix. Porro cum hunc poëmatis locum elaborarem, per ipſum tranſibam pontem Romam regrediens ex eo itinere, cujus facta eſt mentio ſuperius adn. 12. quod quidem huic expreſſioni occaſionem dedit, ut et alibi ſaepe mihi contigit.

Attollit

Attollit Coelo Felici nomine moles,
Subjectumque jugo Tibrim premit; at via ad imum
Terraï medium dorso si tendat ab alto, (560
Mille quater lapides tanto longissima lapsu
Objiceret, centum et paribus majora videres
Intervalla viae, quam quo extimus eminet aër.

Haec 30 Coeli, ac Terrae mensóribus omnia dudum
Sat comperta; docent, aër quam celsus Olympo (565
Assurgat, serae postrema crepuscula noctis,
Aut Coelo primum exoriens Aurora sereno.
Quaeque suis tentata modis sic caetera longus

30 Ea, quae in superiore calculo assumpta sunt, jamdudum innotuerunt et Astronomis, et Geographis, nimirum distantia Lunae a Terra, magnitudo semidiametri Terrae, longitudo coni umbrosi ipsius Terrae, quantitas refractionis horizontalis determinans decurtationem coni penitus carentis omni luce. Quod autem pertinet ad altitudinem atmosphaerae, id perficitur ope crepusculorum, et methodus est satis nota, quam ego exposui in mea dissertatione de Aurora Boreali, et in adnotationibus ad carmen P. Noceti, de quibus mentionem feci etiam lib. III. adn. 22. Crepusculum matutinum incipit, et vespertinum definit Sole depresso infra horizontem per gradus circiter 18. Si lumen, quod tum defertur ad oculos nostros, habuit unicam reflexionem ita, ut Sol immediate tum illuminet illam partem atmosphaerae, quam nos intuemur illustratam, contemnatur autem omnis curvatura radiorum per atmosphaeram, qui neglectus atmosphaeram ipsam exhibet aliquanto elevatiorem justo; invenitur calculo trigonometrico altitudo atmosphaerae eorum milliariorum quamproxime 40; sed si illud lumen devenit ad nostros oculos per duplicem reflexionem ita, ut illa pars atmosphaerae a nobis visa illustretur ab alia parte, quam immediate illustrat Sol; illa altitudo provenit quadruplo minor, sive eorum milliariorum proxime 10.

Hoc posterius ego quidem probabilius censeo ob aliud etiam argumentum, quod exposui in mea dissertatione, cui titulus *Nova methodus adhibendi phases in eclipsibus lunaribus*, et tunc quadruplo major esset dilatatio illa luminis refracti intra atmosphaeram terrestrem.

Eduxit

Eduxit labor, atque educent plura nepotes. 570
At qua [31] se densam lux aëre flexa per umbram
Distribuat lege, et Phoeben perfundat opacam,
Proh quantus latiis labor est efferre Camoenis!
Cerata rursum tela, calamoque nigranti
Esset opus, mollive inscriptis littore sulcis. 575
Tentabo tamen, et plectrum, nervosque sonantes
Expediam, duro saltem concludere versu
Si multa, si forte, sinat prece victus Apollo.
In primis teretes [32], et acuta cuspide conos,
Contemplare duos: gremio concluditur alter 580

Illud tamen hic omnino notandum, hanc dilatationis proportionem pertinere tantummodo ad latitudinem spatii, per quod totum lumen distrahitur: verum ratio densitatis luminis, quae pendet ab utraque dimensione areae, per quam id lumen dividitur, est longe alia, ob circularem coni figuram, in qua longitudo ejusdem areae non manet constanter eadem: praeterea ea ratio est admodum diversa in diversis partibus ejus luminis, cum multo magis distrahantur partes propiores superficiei Terrae, ob multo majorem ibi refractionum inaequalitatem. Adhuc tamen plurimum ex hoc etiam capite plerumque attenuatur lumen, quod in Lunam incurrit.

31 Multo difficilius est exprimere versibus diversam hujusce luminis distributionem per ipsum conum umbrosum, a qua pendet diversa ejus intensitas per umbram Terrae, quae quidem omnino Geometriam requirunt, et, si accurate ejusmodi problema solvendum sit, Geometriam admodum sublimem. Innuam in sequentibus tantummodo praecipua capita, quae cadunt sub consideratione.

32 Tres coni considerandi proponuntur, sed hic incipitur a duobus tantummodo, quorum alter continetur intra alterum, et ambo eundem habent axem, nimirum rectam lineam ductam e centro Solis per centrum Terrae, et productam ultra ipsam Terram. Interior terminatur a radiis, qui transierunt per imam partem atmosphaerae terrestris, et globum Terrae ipsius tetigerunt, ac incurvati per continuam refractionem ingressi sunt, uti diximus, in loca debita umbrae terrestri; exterior vero terminatur a radiis transeuntibus per summam at-

Alterius, geminosque apices, atque intima Terrae
Viscera pervadens idem secat axis utrumque.
Terraï circum conradit flexile dorsum
Interior, densa et penitus nigrescit ab umbra
Luce carens: summi exterior legit aëris auras, 585
Et non inflexos Phoebeae lampadis ignes
Distinct. At spatium, teretes quod clauditur inter
Conorum facies, jubar excipit aëre flexum,
Temperat et tristes tenui splendore tenebras.
Non tamen 33 et partes aeque se lumen in omnes

mosphaeram, quam ita tetigerant, ut directionem sui motus servaverint, qui nimirum sunt omnium proximi ipsi Terrae ex iis radiis, qui nullam refractionem sunt passi.

Ille primus conus continet illam partem umbrae terrestris, ad quam nulli pertingunt radii nec directi, nec reflexi: secundus terminat radios irrefractos ita, ut, quod spatium continetur inter superficies horum conorum, totum habeat aliquos e radiis refractis intra atmosphaeram terrestrem, nisi nubes transitum impediant, de quo casu agemus inferius. Hic secundus conus est conus umbrae, qui adhibetur ab Astronomis pro eclipsi Lunae, et est potius conus umbrae atmosphaerae terrestris, quam umbrae ipsius Terrae. Idcirco Astronomi, ubi ipsam umbram definiunt, umbrae, quae deberetur soli globo terrestri, addunt aliquid, alii plus, alii minus, pro diversis sententiis circa ipsius atmosphaerae altitudinem, cujus milliariis singulis debentur circiter singula secunda.

33 Jam vero in ejusmodi spatio admodum inaequalis est distributio ipsius luminis: ejus inaequalitatis duo omnino sunt fontes, qui hic exprimuntur ambo.

In primis radii, qui magis inflectuntur axem versus, sive qui sunt propiores cono interiori penitus obscuro, debent esse tenuiores ex duplici capite: nimirum, quia transmissi per partem atmosphaerae inferiorem plus luminis amittunt in ea restincti, vel per reflexionem distracti, et quia magis divaricantur ob majorem differentiam inflexionis ortae a refractione. Prima autem ratio duplex adhuc habet caput, nam radii, qui transeunt per partem inferiorem atmosphaerae, et habent iter longius intra ipsam,

Diffundit

Diffundit spatio in toto, tenebrasque nigrantes
Non una radiorum aspergine mollit ubique.
Primum etenim ad conum quo se magis interiorem
Demittunt radii, hoc densum magis aëra tranant,
Et vincunt crassos damno graviore vapores. 595
Illi etiam magis, atque magis curvantur, apertoque
Usque magis fugiunt sese, et panduntur hiatu.
Inde minus rutilat, medium, quod lumen ad axem
Accedit magis: at rursum dispendia tanta
Pensantur, brevior dum contrahit annulus, orbe 600

et hoc iter habent in ejus parte magis densa, et crassis vaporibus obruta, adeoque minus diaphana.

Deinde radii prope axem e contrario addensantur idcirco, quod ibi coadunantur intra spatium multo arctius radii inflexi introrsum circumquaque a tota fasciola circulari terrestris atmosphaerae ambiente totam Terram, ac ipse axis est quaedam veluti continuata series focorum, in quibus colligitur totum lumen totidem circulorum ambientium totam Terram, quot sunt puncta ipsius axis. Concipiatur sectio quaedam circularis coni illius exterioris facta supra interiorem, qui sit divisus in quemcumque numerum annulorum circularium. Totum lumen, quod advenit ad totum ipsum circulum, est illud totum, quod transiit per annulum atmosphaerae terrestris, cujus latitudo aequatur toti altitudini atmosphaerae; at ad singulas illas partes annulares sectionis umbrae deveniunt radii, qui transierunt per totidem partes annulares atmosphaerae. Si hic annulus totius atmosphaerae concipiatur sectus itidem in totidem annulos arctissimos, quorum singulis respondeant illi annuli sectionis excipientes lumen, quod ipsi transmittunt; horum sectionis annulorum latitudo erit major, ob illam distractionem, quae oritur ab inaequali refractione; at longitudo eorum respondens circumferentiae circuli terminantis ipsorum singulos erit minor, quam longitudo annulorum atmosphaericorum superans nonnihil totum ambitum Terrae; et ea tanto magis decrescet, quanto magis descendetur ad centrum sectionis, per quod transit axis coni.

Ad habendam rationem intensitatum luminis in iis annulis, oporteret in calculo involvere ipsam etiam latitudi-

Quod circum aërio deflectitur undique lumen.
Quin etiam, conorum axis qua se inter acutos
Fert apices, lucro ingenti damna omnia cedunt.
Namque illic gyro, terras qui circuit omnes,
Deflexi, puncto radii sistuntur in uno, 605
Et vincunt caecam collato robore noctem.

nem annuli, in quod lumen colligitur, respondentis annullo atmosphaerico datae latitudinis, per quod id lumen transiit, quae latitudo prioris annuli respondet distractioni radiorum inductae ab inaequali refractione, tum et rationem luminis intercepti in itinere per atmosphaeram ad lumen residuum, quod transit. Esset enim intensitas luminis in quovis situ sectionis ad intensitatem luminis solaris in regione Terrae directè, uti est pars residua luminis, quae transit, ad lumen totale, et ut est magnitudo annuli almosphaerici, qui esset ad sensum constans, ob exiguam altitudinem atmosphaerae, cujus omnes circuli sunt fere aequales inter se, ad magnitudinem annuli sectionis, computatam ex illa latitudine, et ex longitudine circuli eam terminantis. Quamobrem si ejusmodi problemata resolverentur, haberetur facile ratio, in qua mutatur intensitas luminis in accessu ad centrum sectionis.

Ejusmodi problemata sublimiorem Geometria requirunt; sed solvi possunt per theoriam adhibitam a Bouguerio in opere cujus mentionem fecimus supra adn. 26; ac pendent in primis a natura curvae, quam radius per atmosphaeram describit, et haec a curva, quae exprimat densitates atmosphaerae in diversis altitudinibus a superficie Terrae, verum haec ipsa pendent ab hypothesibus pluribus, quae non sunt accuratè verae, et differentia caloris in primis, et diversa natura exhalationem ad diversas altitudines ascendentium perturbant plurimum omnes ejusmodi perquisitiones, ubi accuratum aliquid requiritur.

Quamobrem iis omnibus omissis, quae itidem sublimiora sunt, quam ut huc pertineant, addam illud tantummodo, quod in poëmate innuitur, intensitatem versus centrum sectionis, sive versus axem coni, omnino crescere compensatis reliquis omnibus damnis ab exiguitate annuli, in quem lumen colligitur. Nam et distractio radiorum, et quantitas partis residuae luminis, quae transit, mutantur in accessu ad axem in ratione utique finita; at cir-

Axe

Axe 34 quidem medio circum omni ex parte retortum
Colligitur lumen: radios at plurima binos
Inter se aversis transmissos aëris oris
Puncta loci excipiunt; aliisque allabitur uno 610
Aëris in puncto flexum jubar: usque adeo se
Non aequa radii diffundunt mole per umbram.

cellus terminans annulum sectionis, et definiens ejus longitudinem, ac una cum latitudine per distractionem definita determinans ejus magnitudinem, decrescit in infinitum, adeoque intensitas ipsa luminis in infinitum augetur in accessu ad axem ipsum, si spectetur theoria.

Infinitum id incrementum revera non habebitur, tum quia nec Terra, et atmosphaera habent formam penitus circularem, nec refractio circumquaque circa Terram in eodem annulo atmosphaerico est prorsus eadem ob diversam atmosphaerae constitutionem, nec Sol est unicum punctum lucidum, sed ex omnibus disci partibus radii exeunt, et totidem habentur coni, et axes nonnihil a se invicem divergentes, quot sunt ipsius disci puncta; multo autem minus percelletur oculus infinita vi, cum oporteat ad ejusmodi vim definiendam assumere quantitatem radiorum percellentium oculum, quae non pendet a sola intensitate radiorum, sed etiam a spatiolo, ad quod appellunt, et a quo reflexi discedunt ad oculum, spatiolum autem id decrescit in infinitum, dum ea intensitas ob id ipsum ejus decrementum augetur in infinitum.

Eorum omnium oporteret habere rationem ad determinandam mutationem intensitatis, quam oculus debet deprehendere in diversis partibus ejus sectionis, ac posset investigari problema huc pertinens, quae sit distantia ab axe, in qua percipi deberet maxima luminis vis: verum iis itidem omissis, ut minus certis, et altioribus, dicemus illud tantummodo, videri omnino, quod ingens saltem augmentum intensitatis luminis in accessu ad centrum, debeat efficere, ut ibi, nisi quid obstet impedimenti, ut nubes, debeat etiam percipi lumen majus, quam in distantia ab ipso centro aliquanto majore.

34 Praeter ea in aequalitatis capita, quae dicta sunt, adest aliud, quod hic exprimitur, et cujus limites deinde designantur, quantum possunt sine schemate, quo delineato res evaderet evidentissima, et admodum facilis intellectu. Ni-

Quod circum aërio deflectitur undique lumen.
Quin etiam, conorum axis qua se inter acutos
Fert apices, lucro ingenti damna omnia cedunt.
Namque illic gyro, terras qui circuit omnes,
Deflexi, puncto radii sistuntur in uno, 605
Et vincunt caecam collato robore noctem.

nem annuli, in quod lumen colligitur, respondentis annullo atmosphaerico datae latitudinis, per quod id lumen transiit, quae latitudo prioris annuli respondet distractioni radiorum inductae ab inaequali refractione, tum et rationem luminis intercepti in itinere per atmosphaeram ad lumen residuum, quod transit. Esset enim intensitas luminis in quovis situ sectionis ad intensitatem luminis solaris in regione Terrae directè, uti est pars residua luminis, quae transit, ad lumen totale, et ut est magnitudo annuli almosphaerici, qui esset ad sensum constans, ob exiguam altitudinem atmosphaeraè, cujus omnes circuli sunt fere aequales inter se, ad magnitudinem annuli sectionis, computatam ex illa latitudine, et ex longitudine circuli eam terminantis. Quamobrem si ejusmodi problemata resolverentur, haberetur facile ratio, in qua mutatur intensitas luminis in accessu ad centrum sectionis.

Ejusmodi problemata sublimiorem Geometria requirunt; sed solvi possunt per theoriam adhibitam a Bouguerio in opere cujus mentionem fecimus supra adn. 26; ac pendent in primis a natura curvae, quam radius per atmosphaeram describit, et haec a curva, quae exprimat densitates atmosphaerae in diversis altitudinibus a superficie Terrae; verum haec ipsa pendent ab hypothesibus pluribus, quae non sunt accuratè verae, et differentia caloris in primis, et diversa natura exhalationem ad diversas altitudines ascendentium perturbant plurimum omnes ejusmodi perquisitiones, ubi accuratum aliquid requiritur.

Quamobrem iis omnibus omissis, quae itidem sublimiora sunt, quam ut huc pertineant, addam illud tantummodo, quod in poëmate innuitur, intensitatem versus centrum sectionis, sive versus axem coni, omnino crescere compensatis reliquis omnibus damnis ab exiguitate annuli, in quem lumen colligitur. Nam et distractio radiorum, et quantitas partis residuae luminis, quae transit, mutantur in accessu ad axem in ratione utique finita; at cir-

Axe

Axe 34 quidem medio circum omni ex parte retortum
Colligitur lumen: radios at plurima binos
Inter se aversis transmissos aëris oris
Puncta loci excipiunt; aliisque allabitur uno 610
Aëris in puncto flexum jubar: usque adeo se
Non aequa radii diffundunt mole per umbram.

tellus terminans annulum sectionis, et definiens ejus longitudinem, ac una cum latitudine per distractionem definita determinans ejus magnitudinem, decrescit in infinitum, adeoque intensitas ipsa luminis in infinitum augetur in accessu ad axem ipsum, si spectetur theoria.

Infinitum id incrementum revera non habebitur, tum quia nec Terra, et atmosphaera habent formam penitus circularem, nec refractio circumquaque circa Terram in eodem annulo atmosphaerico est prorsus eadem ob diversam atmosphaerae constitutionem, nec Sol est unicum punctum lucidum, sed ex omnibus disci partibus radii exeunt, et totidem habentur coni, et axes nonnihil a se invicem divergentes, quot sunt ipsius disci puncta: multo autem minus percelletur oculus infinita vi, cum oporteat ad ejusmodi vim definiendam assumere quantitatem radiorum percellentium oculum, quae non pendet a sola intensitate radiorum, sed etiam a spatiolo, ad quod appellunt, et a quo reflexi discedunt ad oculum, spatiolum autem id decrescit in infinitum, dum ea intensitas ob id ipsum ejus decrementum augetur in infinitum.

Eorum omnium oporteret habere rationem ad determinandam mutationem intensitatis, quam oculus debet deprehendere in diversis partibus ejus sectionis, ac posset investigari problema huc pertinens, quae sit distantia ab axe, in qua percipi deberet maxima luminis vis: verum iis itidem omissis, ut minus certis, et altioribus, dicemus illud tantummodo, videri omnino, quod ingens saltem augmentum intensitatis luminis in accessu ad centrum, debeat efficere, ut ibi, nisi quid obstet impedimenti, ut nubes, debeat etiam percipi lumen majus, quam in distantia ab ipso centro aliquanto majore.

34 Praeter ea in aequalitatis capita, quae dicta sunt, adest aliud, quod hic exprimitur, et cujus limites deinde designantur, quantum possunt sine schemate, quo delineato res evaderet evidentissima, et admodum facilis intellectu. Ni-

Quod si etiam haec libeat loca contemplarier, atque
Singula sese inter componere, mensurasque
Supposuisse oculis; facili ratione licebit, 615
Ni pigeat tenui rem consignare papyro.

Pinge 35 tibi terrarum orbem, pinge aëra, conum
In medio coni pallentis pinge nigrantem:
Adde axem tranantem apices, et viscera Terrae:
Quinque aequis coni primi de partibus, alter 620
Interior, terris dum sese attollit ab imis,
Tantum unam tereti concludat fronte, per axem
At reliquum vertex à primi vertice distet,
Ac videat partes supra se extare quaternas.
Tum vero aethereas longe latera omnia in auras 625

mirum illud spatium clausum inter superficiem coni exterioris umbrae atmosphaericae, et superficiem coni interioris penitus obscuri dividitur in duas partes, et ad singula puncta alterius ex iis partibus defertur lumen refractum in unico puncto atmosphaerae terrestris, ad singula vero alterius defertur lumen refractum in binis punctis hinc, et inde e diametro oppositis.

35 Schema, quod id exhiberet, esset hujusmodi: haberetur circulus exprimens orbem Terrae, et alius aliquanto major ipsi concentricus exprimens terminum atmosphaerae terrestris, tum duo anguli, alter exprimens conum factum a radiis tangentibus exteriorem circulum, alter exprimens conum factum a radiis in atmosphaera ita incurvatis, ut contingant orbem ipsius Terrae: hi autem multo citius uniri debent; delineato enim axe conorum transeunte per centrum Terrae, et per ipsorum conorum apices, axis coni interioris, eo conclusus, erit pars quinta totius axis coni exterioris, reliquis quatuor partibus extantibus versus verticem coni ipsius exterioris. Delineatis hisce binis conis, producendi essent radii exprimentes interiorem ultra ipsius verticem, qui quidem ita producti tertium conum concludent oppositum ad verticem cono secundo, qui tertius conus habebit idcirco cuspidem obversam Terrae, et hiatum spectantem partes oppositas ipsi Terrae.

Interior

Interior conus si protrahat, exorietur
Tertius inversa conus tibi cuspide, primi
Atque apicem patulo assurgens spectabit hiatu,
Tertia qua terras laterum pars spectat ad imas, 630
Suspiciuntque apicem bini, et supera alta trientes.
Ter tribus at quatuor faciei è partibus aequis,
Ac totidem ferme spatii, quod flexa pererrat
Aëre lux, Coelo extantes concludet, et alto
Quinque alias gremio excludet de partibus ipsis, 635
Telluri, ac densis obversas aëris oris.
Intentas jam fige acies, et singula vultu
Contemplare vigil prono, spatiumque retortis
Perfusum radiis, quod coni à fronte secundi

Porro superficies hujus tertii coni secabit superficiem coni primi alicubi, cum haec progrediendo perpetuo dilatetur, illa coarctetur. Hic locus hujus interfectionis maxime hic notandus r latus quodvis productum, adhibendo eosdem superiores numeros, ita secabit latus coni primi exterioris, ut ejus lateris pars tertia remaneat versus Terram, reliquae autem binae versus verticem, et, quod inde facile deducitur, e novem aequalibus partibus superficiei ipsius coni exterioris quatuor extabuut supra versus cuspidem hujus novi tertii coni, eo inclusae, et reliquae quinque remanebunt extra ipsum inferius Terram versus, ac in eadem fere ratione dividetur ab hac nova tertii coni superficie ipsum spatium inclusum inter priores binos conos, per quod distrahitur, uti diximus, lumen in atmosphaera nostra refractum.

Jam vero ex hisce binis partibus hujusce spatii illa, quae remaneat infra superficiem coni tertii Terram versus, habebit lumen simplex delatum ex altera tantummodo atmosphaerae parte; pars reliqua, quae extat supra eandem superficiem versus apicem, habebit in omnibus suis punctis lumen geminatum proveniens e binis partibus oppositis atmosphaerae terrestris; ad quaevis autem puncta axis deferetur lumen collectum ex omnibus punctis circuli integri atmosphaerae.

Pertinet ad primi frontem, conoque recenti 640
In geminas ſciſſum partes diſtinguitur, acri
Scrutare obtutu, et menti tibi ſiſte ſagaci.
Pars, quae Tellurem inferior deſpectat, et auras
Aërias, quacumque ſui regione retortos
Admittat radios, tantum una ex aëris ora 645
Excipit, et nuſquam geminato lumine gaudet.
Altera, quae puri pars altior aetheris auras
Suſpicit, et coni gremio concluſa recentis,
Ad primi ſupremum apicem ſeſe ardua ſurſum
Porrigit attollens, duplicato lumine ubique 650
Gaudet, et averſis deflexos aëris oris
Conſociat jungens, addenſatque ignibus ignes.
Aſt axe in medio coëunt circum undique mille
Detorti, et puncto radii junguntur in uno. (655
Nunc age [36], jam, mentique Deam tibi ſiſte meantem.

36 Quae huc uſque ſunt dicta, pertinent ad legem, qua lumen illud dividitur per eam partem coni umbroſi atmoſphaerae terreſtris: hic jam exponitur, per quam ejus ſpatii partem Luna tranſeat. Orbita Lunae tranſit infra illam interſectionem ſuperficiei coni tertii cum primo, et ſupra verticem coni ſecundi penitus umbroſi, qui eſt vertex communis huic ſecundo cono, et illi tertio nato ex continuatione radiorum ipſius Retinendo enim eoſdem numeros, quos adhibuimus adn. 22, conus primus protenditur ad diſtantiam diametrorum Terrae 111, conus ſecundus ad diſtantiam 22, quae eſt pars quinta 111; interſectio autem illa ſuperficiei coni tertii cum ſuperficie primi ad diſtantiam 37, quae eſt pars tertia numeri 111. Diſtantia autem Lunae eſt diametrorum 30, media inter 22, et 37. Quare ſi Luna recta tendant ad axem communem conis omnibus, quod accidit in eclipſibus centralibus, primo quidem ingreditur illud ſpatium, quod habet lumen ſimplex ex unica parte, donec nimirum verſatur inter ſuperficiem coni primi, et tertii; tum ultra hujuſce tertii ſuperficiem incedit per ſpatium habens lumen e binis partibus

Illa

Illa quidem teretis campos pertingit ad umbrae,
Et subit, ac primum tenebris perfunditur, infra
Illa loca, inversi quae frons secat extima coni.
Dein cursu ad medium si fors se dirigat axem,
Hanc ipsam frontem subit ardua, et illius imum 660
Supra apicem (nam versus apex despectat opacae
Telluris dorsum, ac Coelum suspectat hiatus)
Ingreditur, dum frontem ipsam progressa relinquat,
Ac primi demum septis jam libera coni
Erumpat, penitusque atra se exsolvat ab umbra. 665
Ergo Dea et spatio graditur, quod lumine tantum
Aërii tractus una de parte retorto
Spargitur, et geminis flexo quod gaudet ab oris.
Ac medio in cursu radiis circum undique tortis
Per gyrum, punctoque nitet coëuntibus uno. 670
Quin 37 etiam, flexus si rite notaveris omnes

oppositis, donec ex eo tertio cono egressa deveniat iterum ad spatium, quod habet lumen simplex, et inde egrediatur ad lucem plenam.

37 Hic affirmatur, viam Lunae intra primum conum dividi in tres partes fere aequales a cono illo tertio inverso, adeoque binos ejus viae trientes remanere hinc, et inde in illo spatio, quod habet lumen ex unica parte, et trientem medium in illo spatio, quod id habet ex binis partibus oppositis. Revera si iidem numeri retineantur, pars illa intemedia invenitur multo major reliquis binis: at ubi Luna versatur in perigeo, et Sol in apogeo eadem est illis minor. Idcirco aliquando est accurate aequalis. Tum vero, cum illa via sit, uti diximus, fere tripla diametri Lunae, facile illud consequitur, ubi totus Lunae discus desierit ingredi in umbram, tum partem ipsius anteriorem incipere ingredi in conum illum inversum, in quo habetur lumen duplicatum, et e contrario cum pars anterior ejus disci incipiet egredi ex umbra, tum partem ejus posteriorem debere egredi penitus ex eodem cono inverso duplex habente lumen.

Luminis intorti, rectique, Deaeque meatum
Supra apicem coni penitus nigrantis, et infra
Illa loca, in superas queis dum se tertius oras
Erigit, inversoque Polum suspectat hiatu, 675
Irrumpens primi faciem secat orbe rotundo;
Nec numeros Phoebo, et Pindi felicis alumnis,
Pieridumque choro invisos tractare recuses;
Invenies tantum inversi per viscera coni,
Et loca per, duplici quae ditia lumine, Divam 680
Ingredier, quantum sive hinc, sive inde per illud
Incedit spatium, radio quod simplice pallet.
Cumque fere triplo, ut supra memoravimus, umbrae,
Qua Phoebe regione meat, sit crassior orbis,
Quam crasso tumeat Dea corpore; donec in umbram 685
Non penitus toto condens se immerserit ore,
Haud conum inversum attinget: cum tota subibit
Nigrantes umbrae tractus, pertinget ad oram
Illius extremam irrumpens, ac duplice primum
Incipiet frons anterior clarescere luce: 690
Ac pariter prima cum Diva emergere fronte
Coeperit è primo; inversum postrema relinquet
Frons conum, et duplici perfusos lumine campos.
His animadversis, jam [38] quae sponte inde sequantur

[38] Inde autem deducuntur mutationes, quae ex ejusmodi theoria haberi debent in lumine illo maligno, quod Luna habere solet in eclipsibus. Initio quidem, quo Luna magis immergetur in umbram, eo umbra erit obscurior; subibit enim sensim loca, ad quae defertur lux transmissa per crassiorem atmosphaerae partem, et post iter longius, ac cum majore inaequalitate refractionum, adeoque majore divergentia radiorum: deinde cum jam tota se immerserit in umbram, incipiet pars disci anterior illustrari aliquanto plus, delata nimirum

Accipe

Accipe, et emersus duris anfractibus, aequo 695
Perge alacer campo, ac prono delabere cursu.
· Principio tristem cum primum senserit umbram
Diva means, conoque ruens caput inferet atro,
Quo magis umbraï medium procedet ad axem,
Hoc magis et tenebris frons prima nigrescet opacis.
Nam radios sensim denso magis aëre flexos, (700
Distractosque, ut ut et gyro breviore receptos,
Excipiet: dein se cum toto immerserit orbe
Diva means; tum prima iterum clarescere fronte
Incipiet magis, atque magis, penitusque nigranti 705
Horrebit gremio squalens: at limbus uterque
Uberiore atras perfundet luce tenebras.
Nam duplici anterior radios ex aëris ora
Colliget; at summo excipiet vix aëre flexos
Posterior, densis tenuata vaporibus aura 710
Qua caret, immissos, et vix intercipit ignes.
At medium medio cum corpore Cynthia ad axem
Appulerit, limbus contra squalebit ab omni
Circumquaque plaga, ac gremio collecta sub imo
Undique per gyrum multo lux igne nitebit. 715
Mox iterum, tristi cum jam emersurus ab umbra
Frontis apex primus teretem pertinget ad oram,

ad loca luminis geminati, et satis propiora axi, ubi lumen colligitur; ubi vero aliquandiu processerit, erit clarior in binis marginibus, et obscurior in medio; nam margo interior accipiet lumen duplicatum, exterior vero, adhuc multo propior superficiei primi coni excipiet radios transmissos per altiorem atmosphaerae partem, adeoque ob rationes toties dictas minus attenuatos.

In media autem umbra erit multo clarior prope centrum, et multo obscurior circa margines, cum in centro tum accipiat radios usque adeo acutos

Nigrescet

Nigrescet gremium, limbusque nitebit uterque.
Quodlibet at magno Phoebes de corpore punctum
Dum graditur, primum tenui squalore nigrescet, 720
Tum magis, atque magis tenebrae intendentur: at ipsas
Mollibit rursus duplex jubar, in mediaque
Clarescet magis usque via: tum deinde tenebrae
Excrescent, gradibus mox et minuentur iisdem. (725
Quod si obliqua 39 meet Phoebe, et se flectat ad Austrum
Imbre gravem, Boreamve gelu, nivibusque rigentem,
Clarescet minus in medio, et si forte nitentem
Non penitus tristi vultum demerserit umbra,
Illa quidem nusquam duplicati luminis ictum
Sentiet: hinc atris postquam squalere tenebris 730
Coeperit, usque magis perget nigrescere limbus
Interior cursum ad medium, tum deinde fugatis
Sensim, perque gradus tenebris emerget eosdem.
Haec tibi 40 si totus, qua circum flexile dorsum

prope axem. Demum prope initium emersionis erit iterum obscurior circa medium, et clarior circa margines, quorum alter erit adhuc in situ duplicati luminis, alter erit in situ luminis transmissi per altiorem atmosphaeram.

Haec ad totum pertinent Lunae discum; sed si consideretur unicum punctum disci lunaris, id punctum initio, dum umbram subit, erit minus obscurum, tum obscuritas crescet, donec deveniat ad loca luminis duplicati; ubi obscuritas decrescet usque ad medium, tum iterum crescet usque ad certum limitem, ac iterum decrescet in accessu ad marginem exteriorem prioris coni.

39 Quae diximus, pertinent ad eclipses centrales: in eclipsibus autem partialibus, in quibus Luna non immergitur tota, res aliter se habebit. Limbus interior erit obscurior, nec ulla ejus pars deveniet ad loca luminis duplicati, quae nimirum diximus distare a margine Lunae per intervallum circiter aequale ejus diametro.

40 Ex iis, quae dicta sunt, facile redditur ratio plurium phaenomenorum, quae saepe observantur, ut illius, quod sae-

Terrae

Terrae Luna videt, niteat sine nubibus aër, 735
Ordine provenient: at si qua parte retortum
Praeripiant nubesve graves, nebulaeve volucres
Forte jubar; pars illa Deae, quae aspergine rapti
Luminis orba caret, caeca se nocte recondet,
Atque oculos suspectantis deludet inanes. 740
Hinc quoniam sparsae nullo ordine in aëre nubes
Hac, illac circumvolitant, ac partibus îsdem
Jam nebulae rapiunt jubar, et jam fronte serena
Laeta dies sine faece nitet; saepe ordine nullo
Ipsa etiam Lunae facies, qua luce retorta 745
Tingitur, et caeca penitus qua nocte nigrescit. (bra
At numquam [41] aut prima cum vix immergitur um-
Cynthia, vel summam cum jam devenit ad oram

pe notavi ego ipse, quod nimirum aliquanto post immersionem totalem incipiat augeri plurimum lumen ipsius Lunae, quae saepe in media eclipsi ita inclarescat, ut etiam ejus maculae discerni possint. Et ea quidem phaenomena haberentur semper, uti theoria requirit, si semper atmosphaera terrestris circumquaeque esset serena sine ullis nubibus hinc, et inde in illo circulo terrestri, qui terminat hemisphaerium e Luna visum. Sed quoniam saepissimè habentur nebulae crassiores, quae plus luminis intercipiant, ac nubes, quae illius transitum penitus impediant, et eae sunt hac illac dispersae sine ullo ordine; satis patet debere etiam in Luna haberi saepe mutationes luminis admodum irregulares, ut sine ullo ordine partes aliquae illuminentur plurimum, aliae omni etiam luce destitutae penitus nigrescant.

Fortasse et montium diversa positio turbabit theoriam, altissima enim quaedam montium juga, ut eorum, qui ad 4 milliaria assurgunt in America hinc, et inde a Quitensi valle, ad eam altitudinem deveniunt, per quam lumen deberet transmitti ad centrum sectionis umbrae; et alibi reflexio radiorum Solis facta in mari ad angulum perquam exiguum potest augere nonnihil lumen in locis positis inter axem, et superficiem.

41 Sunt tamen quaedam phaenomena, quae videntur debe-

Progressura

Progreſſura brevi, radiis caret aëre tortis:
Namque illuc alto deflexam in vertice lucem 750
Tranſmittunt tenues aurae, quo nulla vaporum
Aſſurgit gravior moles; denſataque turpem
In nebulam, nubemque coit, radiosque retortos
Progredier vetat, et caligine ſiſtit opaca.
Inferior nebulae, et denſis obnoxius aër 755
Nubibus umbriferi detorquet ad intima coni
Viſcera diſperſum jubar, et medium imbuit axem.
Ergo ubi jam cono triſti ſe immerſerit alte
Cynthia: tunc tantum penitus nigreſcere quondam,
Et poterit fruſtrare oculos ſupera alta tuentûm. 760
Nempe illuc quacumque infractum ex aëris ora
Deberet properare jubar, ſi nubila ubique
Opponat ſeſe, et curſum interjecta morentur;
Luce carens, tenebris ſe Diva recondet opacis.
Quin axem 42 licet ad medium circum undique gyro
Deflexum immani tendat jubar; axe ſub ipſo (765

re conſtanter haberi ſemper, ut illud, quod hic exprimitur: nimirum illa pars Lunae, quae erit ſatis proxima margini umbrae, quod accidit limbo praecedenti prope initium immerſionis, et emerſionis, nunquam erit penitus deſtituta omni lumine; nam illuc advenit lumen tranſmiſſum per altiorem atmoſphaerae terreſtris partem, ad quam nec montes aſſurgunt, nec nubes.

42 Hic redditur ratio phaenomeni, quod aliquando invenitur in monumentis Aſtronomiae, quo Luna in eclipſi ita evaſerit obſcura, ut videri omnino deſierit. Id quidem provenire poteſt etiam ab aëre imminente obſervatori, cujus illa pars, quae Lunam reſpicit, habeat majorem vaporum copiam; quae nebula ſi non late extendatur, apparebunt alibi fixae eodem tempore admodum vividae, quin omnino Luna appareat: et id quidem, oportet, acciderit in nonnullis caſibus, in quibus eodem tempore nonnullis obſervatoribus Luna prorſus diſparuit, dum alii

Diva

Diva poteſt penitus nigreſcere, nubila ſi fors
Illum ipſum ingentem complerint aëris orbem,
Extantem immenſo Terrae quem Cynthia dorſo
Spectat, et unde ſolet radios haurire retortos. 770
Ne tamen [43] haec, ne poſſe putes contingere ſaepe:
Vix tot habet totis, quamquam tam dives uterque,
Aëris in campis diſperſa Auſterque, Notusque
Pallentis nebulae, aut nigrantis ſemina nubis
Ut tantos una poſſint obducere tractus. 775
Dum ruit hìc pleno denſiſſimus imber ab Axe,
Et ſegetes grando, et teneri nova germina Bacchi
Sternit humi; Titan aliis ſe tempore eodem
Oſtentat terris effulgens, atque ſereno
Ore nitet, flores tenui levis aura ſuſurro 780
Lambit, odoratis Zephyrus ſecat aëra pennis,
Frondentesque agitat ſylvas, herbasque virentes.
Adde [44], quod extantem Terrae dorſo aëris orbem
Qua Phoebe videt alta Polo, circumſpicit omnes

longe alibi poſiti eandem adhuc ſatis illuſtratam viderint luce illa per atmoſphaeram tronſmiſſa. Verum aliquando fieri poteſt, ut Luna omne prorſus lumen amittat, ſita etiam in axe umbrae, ſi nimirum omnis illa atmoſphaerae pars, per quam radii deberent deferri ad ipſam, denſis obducta nubibus, omnes radios praeripiat.

43 Oſtenditur hic, cur id phaenomenon debeat eſſe rariſſimum: quia nimirum, uti etiam diximus lib. II. adn. 14, non poteſt in tam ingenti tractu ſimul ubique Coelum eſſe nubilum: deeſt enim fere materies tam multis nubibus ſimul procreandis, et deſunt ea, quae ad vapores inflandos requiruntur, qui in nubes dilatentur, atque idcirco dum alibi obductum eſt Coelum, et imbres decidunt denſiſſimi, alibi ſolet eſſe purus aër, et Sol vividiſſimus.

44 Rationi ſuperiori, quae generalis eſt, accedit peculiaris ratio petita à diverſa admodum conſtitutione earum par-

Quinque

Quinque plagas, mediam vicino Solis ab igne. 785
Quae fervet, gremioque ardens exaestuat imo,
Et gelidis quae cardinibus loca proxima torpent,
Aeternamque ferunt hyemem, glaciemque perennem
Horrida, quaeque ollis felici intersita gaudent
Temperie, alternisque annum, et nova tempora mutant.
Scilicet haec plenis late flaventia aristis, (790
Obruta dum nivibus, duroque rigentia squalent
Illa gelu, haec Bacchi, et Pomonae ditia donis,
Illa novas primis pingunt dum floribus herbas. (795
Ergo locis îsdem nebulae quoque, nubila, et imbres
Alternis redeunt, abeuntque, et Cynthia semper
Parte aliqua flexum puro jubar aëre, vultu
Excipit, ac Phoebi pallentia transpicit ora.
Haec ita 45 proveniunt, si stent immota parentis

stium Terrae, quibus imminet atmosphaera, quae radios ad Lunam transmittit. Eae partes pertinent ad marginem hemisphaerii terrestris e Luna visi. Porro quotiescunque Luna versatur inter tropicos, quod in eclipsibus fit fere semper, in quibus ea parum admodum potest recedere ab ecliptica, quae intra tropicos continetur tota; ille circulus, qui id hemisphaerium terminat, transit per omnes quinque zonas, quod satis patet; et quidem si Luna sit in ipso aequatore, is circulus transit per ipsos polos. Notum est autem, dum in altero hemisphaerio est hyems, vel autumnus, in altero esse aestatem, vel ver; adeoque si alibi in eo circulo Coelum est nubilum, admodum probabile est, alibi simul esse serenum; et proinde fere semper aliquod lumen ad Lunam deveniet.

45 Hoc episodium sponte mihi obvenit ex occasione ipsa, nec unquam magis, quam tum, expertus sum illud, *facit indignatio versus*; exponenda est autem occasio ipsa, ut ea, quae plures ejusdem episodii partes respiciunt, percipi possint. Anno 1751 dimensus sum una cum P. Christophoro Maire doctissimo viro e nostra Societate, et summo in primis, ac diligentissimo a-

Naturae

Naturae jura, aeternas et tempora leges 800
Observent immutata, ac se foedere certo
Excipiant, varientque vices. Turbata sed omnis
Jamdudum rerum ratio, et labefacta videtur
Aut ruere, aut certe casum Natura minari.
Ecce novum auratis Aries jam cornibus annum 805
Nequidquam dudum vocat, et progressus Aprilis
Ver notum quaerit frustra, Zephyrosque morantes.
Vix unquam rigidi tantam videre Decembres
Vim nivium summis in montibus, atque perennes
Usque adeo late campis undantibus imbres. 810
Ningit adhuc, crebri pluviis, et grandine densa
Praecipitant nimbi, et Coelo solvuntur aperto.
Quin etiam posuere suos Austerque, Notusque
Desueti mores: en tristia fallere cantu

stronomo basim octo circiter milliariorum in ipsa veteri via Appia inter Romanam, et Albanam urbem, quae fuit altera e binis adhibitis ad determinandum meridiani gradum Romam inter, et Ariminum interjacentis, et corrigendam mappam geographicam Pontificiae ditionis, quem duplicem scopum nostrorum laborum hic innui: pertinet ad hunc posteriorem illud, *in tenuique papyro Pingere, adhuc Dominae quae parent Oppida Romae*, et ad primum illud *Terrae deprendere molem*, cum peripheria circuli maximi, et diametro, quae quidem cognoscuntur cognito uno gradu, si Terra sit sphaerica, et gradus ubique aequales sint; sed si gradus in diversis locis diversi inveniantur, uti revera inveniuntur, oportet, ipsius Terrae figura recedat a sphaerica magis, vel minus, pro majore, vel minore graduum inaequalitate, et eo spectat illud *deducere demum Non aequam penitus formam*: tum autem figura, et magnitudo Terrae determinatur per binos gradus, si ea supponatur elliptica, aliter per plures, et quidem plurimi requiruntur, si habeatur irregularitas aliqua, quam ego haberi censeo in Telluris figura.

Ipsam hujus basis dimensionem fusius exposui in volumi-

Taedia

Taedia dum, curasque animi conamur acerbas 815
Castalia mollire lyra, bacchatur uterque,
Et verrit tristes furiali turbine campos;
Nec tamen igne calent Libyco, assuetoque vapore
Membra soluta gravant: Aquilonem frigore duro,
Atque gelu Boream vincunt: ipsa hæc mihi plectra, 820
Contractique tremunt digiti, et vox gutture torpet.
Deprensum in mediis turbo namque horridus arvis,

ne *de Litteraria Expeditione per Pontificiam ditionem* opusculo 1. cap. 2, et opusculo 4. cap. 3. Bis autem eandem dimensionem coacti abrumpere, Martio, ac Aprili mense ob ingentem Coeli inclementiam, quae quidem ibi eo anni tempore nunquam solet esse tanta, vix demum cum successu absolvimus mense Majo.

Secundae dimensionis tempore superiores versus elucubraveram tam in ipsa vespertina commoratione in Albana urbe, in quam nos recipiebamus per noctem, quam inter equitandum, ut tempus fallerem: et postremos quidem perfeceram ipso mane ejus diei, quo demum censui abrumpendum omnino opus, quod pluribus jam vicibus intermissum fuerat superioribus diebus imbrium vi, ac Romam redeundum. Instrumenta expedita jam fuerant, et dimensioni molestissimae data opera per duas horas, cum ingens nos repente procella oppressit, Coelo circumquaque obducto nubibus, grandine primum densissima, tum imbre effuso praecipiti, qui ad plures horas perduravit obstinatissimus. Aegre nos recepimus in tabernam, quam appellant *Torre di mezza via*, ubi equi cursorii mutantur Romanam inter, et Albanam urbem, in quo nullum omnino habetur conclave honestis hominibus recipiendis idoneum; sed foeda omnia, et turpia, fossorum, messorum, bubulcorum, rhedariorumque compotationibus apta. Cum et imber, et immanis ventus debaccharetur, rigidissimus sane, licet et Aprilis jam mensis progressus esset, et Libycus flaret, qui aërem e calidissimis Africae partibus deferens solet esse plerumque calidus (finitimos autem Appenini montes videre adhuc erat nivibus obrutos praeter morem), ac progredi ex aedibus non permitteret; assedi ad angulum foetidissimae longioris mensae, ad cujus caput plures rustici comessantes, et compotantes as-

Appia

Appia 46 qua quondam steterat via, marmoreumque
Urbe iter à domina veterem signabat ad Albam;
Crebra inter monumenta virûm, cineresque sepultos, 825
Quadrupedum ad stabula, atque haec foeda cubilia adegit.
Quid non tempus edax, quid non fata aspera vincunt?
En modo diffractae vix tenvia signa supersunt
Pauca viae, eversisque alti cernuntur acervi
Molibus: incurvo volvuntur grandia aratro 830

sederant, et ex impetu quodam, ac animi aegritudine priores, centum circiter, versus effudi, ac ibidem conscripsi; reliquum episodium partim in itinere inter redeundum in Urbem sub vesperam, partim domi ante, quam irem cubitum, perfeci, et primo mane nitide exscriptum detuli totum ad Cardinalem Valentium primum Pontificis administrum; de quo ibi, expeditionis nimirum meae et auctore primo, et fautore perpetuo, ut et de ipso Summo Pontifice, adeo honorifica mentio habebatur.

46 Appia via, apud veteres etiam Romanos celebratissima, marmore omnis constrata erat, ut et reliquae militares Romanorum viae, et plures ipsius tractus adhuc illaesi conservantur, potissimum in mediis Pontinis paludibus aqua obruti. Is tractus Romae proximus ante hosce 30 annos adhuc satis bene conservatus visebatur, licet alia ad ejus latus via per inferiores campos frequentari jam soleret passim, quam ipsam ob causam ea deinde marmora sunt eruta, et in Urbem delata ad consternenda Urbis ipsius compita nova illa tam eleganti methodo, quadratulis inde efformatis. Tum, cum ibi basim metirer, visebantur identidem ejus viae vestigia; et bini lapidum assurgentium ordines, quibus et rectilineis prorsus, et inter se parallelis ea olim concludebatur, adhuc passim supererant. Verum alicubi, erutis iis etiam limitibus, in ipso viae loco, lapidibus aratro summotis, messis succreverat. Ex utroque latere fere perpetua adhuc visitur duplex ingentium ruderum series, e veteribus sepulchris omni ornamento spoliatis, et magna ex parte dirutis, quae apud veteres Romanos plerumque secus publicas vias erigebantur. Plura in proximo aderant pastorum mapalia, a quorum canibus in quanto periculo quodam die fuerim constitutus, exposui in eodem primo opusculo *Expedi-*

Saxa; ovibusque rudis tendit sua retia pastor.
Hic modo bis quatuor metibar millia passus,
Unde omnem liceat Terrae deprendere molem,
Qua circum ingenti protenditur orbe, sub imo
Quaque patet gremio, et crasso se corpore pandit.
Ac certis à mensuris deducere demum (835
Non aequam penitus formam, in tenuique papyro
Pingere, adhuc dominae quae parent oppida Romae.
Scilicet extremis Britonum delatus ab oris
Maerius astrorum cultor, quem prima receptum 840
Diva sinu, mille Uranie dans oscula, fovit,
Atque altum erudiit, perque ardua sydera vexit;
Ille quidem hic mecum exequitur tua grandia jussa,
Magne [47] Pater, nobis quem docta Bononia misit,
Rectoremque sibi, et toti ter maxima Mundo 845
Imposuit Roma, ac felicia saecla reduxit.
Tu semper vastam ingenuas, Benedicte, per artes
Excultus mentem, doctasque evolvere chartas

tionis Litterariae num. 109. ut et aliud multo gravius vitae periculum, quod ibidem subii in summo Metellae sepulchro ad basis initium, ligneo ponte, quem conscenderam confracto, enarravi ibidem num. 132.

47 In laudibus tanti Pontificis (erat is Benedictus XIV.) hic exponendis nequaquam immorabor, quas nimirum exposui et in ejus operis nuncupatoria epistola (ipsi enim, cujus auctoritate, et munificentia opus ipsum perfectum est, clementissimè excipienti, nuncupandum censui opus ipsum communi nomine Mairii, et meo,) et multo fusius in Poëmate, quod, ubi primum, post extremum vitae periculum, visus est convalescere, inter publicam totius Urbis gratulationem typis impressi, adjectis adnotationibus, quibus praecipua ejus gesta carminibus proposita magis illustrarentur. Notissimum est, ejus patriam fuisse Bononiam tot doctorum hominum parentem, ac sedem; notissima est itidem ipsius Pontificis doctrina, in Jure potissimum, ac editorum operum multitudo, et pretium.

Assuetus

Assuetus, calamosque manu tractare disertos;
Alma foves; Genitor; studia, atque ad grandia natus
Ingenti grandes molitis pectore curas. (850
Stat lateri affixus, tanti cui credere partem
Imperii magnam voluisti, Silvius [48], undis
Tuta suis, Divini et clara Aeneïde vatis
Mantua quem genuit; sed libertate perenni, 855
Grandibus ingeniis, et nobilitate vetusta,
Atque opibus totum pariter celebrata per Orbem;
Dulce mihi natale solum Ragusa, superbos
Jactat avos, atavosque. Viri jam olim tibi tanti
Mens patuit te digna, et rebus grande gerendis 860
Ingenium, ac placidi mores, quo nempe ministro
Securus docto potes indulgere labori.
Ille tuam vigilans in laudem, et publica curans
Commoda, credo equidem, ille ipse haec ingentia coepta
Suggessitque tibi primus, stimulosque volenti 865
Addidit: ille mihi jamdudum haec ipsa paranti,

48 Silvius Cardinalis Valentius immortalis memoriae vir, quo idem summus Pontifex usus est primario administro; Secretarium status appellant, usque ad ejus obitum; qui Pontificis ipsius mortem biennio fere praecessit; et in quem unum alia multa praecipua sane munera congesserat; erat enim inter caetera Camerarius, ut appellant; et Praefectus Congregationi de Propaganda fide. Ita autem eo in omnibus sui Principatus negotiis utebatur; ut omnino videretur Pontificia sibi decreta tantummodo; et librorum conscribendorum; ac edendorum curam reservasse; reliquis omnibus sui regiminis partibus ipsi uni relictis: quo spectat illud; *Quo nempe ministro, Securus docto potes indulgere labori*.

Nulla autem mihi suppetunt satis idonea vocabula; quibus tantum virum pro merito celebrare possim, cujus et perspicacissimam mentis vim, atque capacitatem amplissimam, et paratissimam semper in difficillimis quibusque negotiis consiliorum multitudinem, et suavissimam indolem, ac ingenii

Ac Brasilos, Mundi et confinia summa patenti
Mentem, animumque tuum primus patefecit, et Urbe
Continuit: nunc urget opus, tunc ille labores
Providus immodicos mollit, viresque ministrat. 870

tam humanitatem suspexit, non Roma tantum, sed et universus Christianus Orbis, quibus accessit et summus litterarum, ac bonarum artium amor, ac cultus, et, quod caput est, summa itidem vitae integritas, atque probitas, sincera religio, et pietas, opum contemptus et liberalitas, quorum omnium exempla plurima perspexi ego ipse luculentissima sane, pro ea, qua mecum egit humanitate maxima, qua mihi semper aditum ad se patere voluit, saepe et ad mensam adhibens, et ad familiarissimas cum paucis amicorum confabulationes; quibus animum a tot curis fatigatum recrearer.

Quantum autem ipsi debeam, nunquam itidem verbis satis efferre possum. Exhibui quidem, sed admodum tenuem grati animi significationem tam in epistola nuncupatoria opusculi de Turbine, quod eidem inscripsi, quam in Stayanae Philosophiae voluminibus, et in opere *de Expeditione Litteraria per Pontificiam ditionem*, cujus, ut paulo superius monui, is primus et Auctor fuit, et Fautor. Ipse enim, uti hic innuo, id ipsum Pontifici suggessit, ipse fundum ad expensas necessarias invenit, ipse pecuniam, quotiescunque opus haberem, continuo subministravit, nullas unquam rationes exquirens, ipse mecum habere voluit commercium litterarum perpetuum, cui bis in hebdomada et observationum seriem communicarem per litteras, et si quid opus esset, significarem, humanissimis ejus litteris incitatus semper, et auctoritate suprema adjutus, qua omnia, quae se identidem offerebant, impedimenta summovit, donec et Pontificiae ditionis mappa, et volumen complectens totius expeditionis scopum, ac fructum, ejus itidem auctoritate impressa, prodierunt.

Hic ipsam occasionem innui, qua me is ad dimensionem gradus Meridiani, et correctionem mappae geographicae ditionis Pontificiae adhibuit. Petierat Lusitaniae Rex Joannes V. decem e nostra Societate Mathematicos a nostro supremo Praeside, Praepositum Generalem appellamus, qui in Brasiliam navigarent, et mappas delinearent regionum cum Hispanis commutandarum, ac limites definirent: ego me ad id opus obtuleram ei, qui Regium Legatum agebat tum Ro-

Nequidquam,

Nequidquam, arcanas fors indignata latebras
Scrutantem, sanctosque aditus, penetralia et ima
Tentantem audaci gressu, Natura repellit.
En quoties domina progressus ab Urbe laborem,

mae apud Pontificem, eratque itidem e Societate nostra, ea conditione, ut mihi simul liceret metiri Meridiani gradum, quem cum Quitensi conferrem definito paullo ante a Parisiensibus Academicis; et quidem non solum annuerat ipse, sed facultatem illico ab ipso Praeposito Generali mihi impetraverat. De discessu cogitantem Cardinalis Valentius continuit in Urbe, et Pontificis nomine imperavit, ut, quae pro Brasilia meditabar, in ditione Pontificia exequerer; quare in re quantum ipsi debeam, cognoscet sane, quicunque perpenderit ea, quae insequentibus annis in Lusitania acciderunt.

Porro haec Valentiorum familia Mantuana nunc quidem, originem tamen ducit ex ipsa Ragusina urbe mea patria. Mente adhuc retineo locum, quem legi apud Agnellium celebrem Mantuanum Historicum, qui de hac familia loquens, antiquiorem alium Historicum ejus et nobilitatis, et originis testem adhibet; sed ejus nomen nunc quidem non teneo, nec Agnellium hic invenire potui, cujus integrum locum exscriberem; sed verba fuit omnino haec: *famiglia, che il... chiama nobilissima proveniente dall' antico Epidauro oggi Ragusa*.*

Ipsius autem patriae laudes paucis quidem versibus, sed et maximas sane complexus sum, et verissimas, quod omnino novit quicumque Geographorum opera perlegat, et Ragusinorum litteraria monumenta evolvat. A barbarie incultissima undecunque circumsepti, et severiores disciplinas, et humaniores in primis litteras diligentissime excolimus tam latino idiomate, quam Illyrico, quo domi utimur. Omitto vetustiores, ut Marinum Ghetaldum, inter Geometras celebrem illo ipso tempore, quo nobilissima facultas a paucis admodum excolebatur; Stephanum Gradium elegantissimum latinum poetam eo ipso superiore saeculo, quo usque adeo conciderant in Italia humaniores litterae corruptae penitus, ac depravatae; Bandurium e Benedictinorum familia tot voluminibus in Gallia editis celebrem; aliosque quamplurimos, qui mihi fru-

 Commissumque

* *Valenti Famiglia detta dal Janelli nobilissima, e discesa dall' antico Epidauro, oggi Ragugia*. Annali di Mantova scritti da Scipione Agnello Maffei, lib. 11 cap. 7.

Commissumque opus aggredior, furit ilicet, atque
Assidua prospectandos caligine montes (875
Occulit, Aeolio rabidos procul evocat antro,
Committitque simul fratres, et praelia miscet,
Imbre ruit, nimbisque ferox, nivibusque, geluque.
Ipse 49 Pater Tibris, hinc pluvia, nivibusque solutis

stra sese offerunt properanti; unus instar millium esse potest in latina poësi, et omni doctrinae genere Benedictus Stayus, de quo mentionem feci lib. I. num. 29, cui et Christophorum ejus fratrem latinum scriptorem nitidissimum, et alios quamplurimos itidem adhuc superstites possem adjungere; sed unum, quem ego quidem plurimi facio, Romae vigentem, et notissimum, omnino commemorabo P. Raymundum Kunichium egregium e nostra Societate et Oratorem, et Poetam, pluribus impressis speciminibus clarissimum. Vernacula autem nostra lingua habemus etiam bina Epica poemata egregia sanè, Osmaniadem, atque Christiadem, et alia quamplurima summi pretii omnium generum, inter quae plura edita ab Abbate Giorgio Benedictino plurimum excellunt, qui quidem et latinis operibus editis hoc nostro saeculo maximam sibi eruditionis et sacrae, et profanae famam comparavit.

Atque hic mihi haud ita quidem temperare possum, ut domesticam laudem omittam; circumferuntur enim satis multa elegantissima carmina Petri fratris, quem anno 22 aetatis suae amisimus incredibilis juvenem spei, inter quae versiones plures et Ovidii ex latino, et Molierii ex Gallico Illyricis versibus conscriptae celebrantur: impressa sunt ante hosce duos annos Annae sororis adhuc viventis Illyrica carmina Venetiis, quae itidem satis bene excepta sunt a nostrae linguae cultoribus; ac inter poemata P. Caroli Rotii, Societatis nostrae Scriptoris sane non vulgaris, impressa Patavii nitidissimis Comini typis, habentur binae Latinae elegiae P. Bartolomei Boscovichii mei et natura fratris, et Religioso instituto socii, adhuc superstitis, recusae iterum alibi, et habitae inter elegantissima Recentiorum Scriptorum monumenta; usque adeo humaniores litteras Ragusini et excoluerunt semper, et adhuc excolunt cum successu.

49 Quae huc pertinent, acciderant ante tres circiter menses, quae quidem exposui in

Turgidus,

Turgidus, Hetruſcis retro inde repulſus ab undis, (880
Ventorumque furore gravi percuſſus, ab imo
Jam toties indignatus caput extulit alveo,
Et vaſtos late campos, vallesque profundas
Obruit: ipſa etiam magnae per compita Romae 885
Erupit ſine lege furens, miſerosque Quirites

opere toties nominato *de Expeditione Litteraria*, opuſculo 1; atque inde huc transferam, quae habentur num.102,103,105.

" Sub finem Januarii menſis " anni 1751 ad Tiberis oſtium " miſſi ſumus, ubi in poſtre- " ma exundatione Tibris prae- " cedenti menſe repagula om- " nia labefactaverat, quibus in " ipſo ingreſſu in Tyrrhenum " mare coercetur, ut naves, " velocitate fundum excavan- " te, et aggeſtas a mari are- " nas dimovente poſſit excipe- " re. Eo libenter profecti ſu- " mus, tum ut, ſi quod im- " minenti malo remedium ſe " offerret, proderemus, et Ur- " bis commercio conſuleremus, " tum etiam, ut finitima lo- " ca, et utrumque Tiberis o- " ſtium, ac oram littoris, et " maritimarum turrium ſitus de- " finiremus. Vix eo devenera- " mus, cum iterum imbribus " aſſiduis confluente undique " immani aquarum vi exunda- " re amnis, et alveo relicto " univerſos circum campos ob- " ruere: quo quidem tempore " Roma iterum cymbulas vidit " per Urbis compita circum- curſantes (bis nimirum per eos menſes intra Urbem exundavit Tibris, ſed per inferiores campos ſepties ſe effudit, quam ob rem poſui illud: *Jam toties indignatus caput extulit.*)

" Abeſt is locus a Portuenſi " urbe binis paſſuum millibus, " nec ullas fere habet aedes " praeter publicas quaſdam et " arctas, et humiles, in qui- " bus diverſabamur, ac turrim " ad oſtii tutelam extructam " olim in ipſo littore, jam " arenarum aggeſtione facta, " aliquanto remotiorem ab ip- " ſo mari. Caeterum tuguria " tantummodo viſuntur aliqua, " et ſtramineae caſae, in qui- " bus tum quidem trecenta cir- " citer capita piſcatorum, nau- " tarum, et operarum ad oſtii " ipſius tutelam ac reparatio- " nem pecunia publica condu- " ctarum verſabantur.

" Ubi primum erupit fluvius, " ita brevi excrevit, ut caſas " omnes, et tuguria occupa- " ret: noſtrae etiam domus " atrium impleverat aqua, et " jam ſcalis ad ſuperius tabu- " latum conſcendebat, non " ſine aliquorum metu, ne nos

Terruit obsessos mediis circum undique tectis,
Perque fores frustra conclusas, perque fenestras
Irruit, undantique ima ad penetralia fluctu
Irrupit victor: nullo discrimine et alta 890
Atria, marmoreisque superbae mollibus aedes;
Angustique lares inopum, et simul ipsa natabant
Templa Deum tumidis alte demersa sub undis.
Quin etiam, adversum qua se devolvit in aequor,
Aggeribusque amplis, valloque coërcitus ora 895
Stringitur, et vasto delatas aequore merces,
Excipit, ac dominam dorso transmittit ad Urbem,
Fraena furens morsu disrupit, et impete primo
Dissolvit compagem, ac dura repagula fregit;
Inde trabes fundo evulsas disjecit, apertos 900
Perque maris campos, vicinaque littora sparsit:
Vidi ergo, cum tenues per rimas insinuaret
Spumanti sese fluctu, cum cornibus altis

" obrueret, quod in tanta maris vicinia, quo se aquarum moles effundebat, fieri omnino non poterat; nisi forte ipsarum aquarum vis convulsas potius aedes evertisset. Longe gravius a fame periculum: per octo integros dies obsessi constitimus; et nobis quidem annona non defuisset, sed miserabilis nos angebat tot inopum turba omni alimento destituta, cum quibus, quaecumque parata pro nobis fuerant, partiri erat opus. Admodum difficulter ad Portuensem urbem contra fluminis impetum per undantes campos naviculam misimus, ut panem adveheret; sed vix ullus ibidem inventus panis, in urbe nimirum penitus diruta, intra quam vix nunc quidem viginti homines vivant. Ipse ille pistor, qui panem rusticis circumjacentibus, et ipsum ostium Tiberinum incolentibus sufficit, profugerat per eos dies aere alieno gravis, nec farinae quidquam, nec frumenti relique-

Obnixus

Obnixus primos aditus sibi quaereret; inde
Dimotis victor trabibus jam corpore toto 905
Irrueret, vulsamque inferret in aequora molem.
Me quoque namque illa obsessum regione repente
Exiguo inclusit tecto; jamque ima tenebat
Limina, perque gradus assurgens ardua visus
Velle minax tabulata domus conscendere, meque 910
Et socios tumidis rabidus demergere in undis:
Ille quidem incassum: sed sparsa mapalia circum,
Stramineasque casas invasit, et omnia fluctu
Obruit, ac limo turpi, mersurus et ipsam
Piscatorum inopem turbam, miserosque colonos, 915
Provida ni casum fuga praevertisset acerbum.
Ast ubi nequidquam obniti, et vim sensit apertam
Nil prodesse, locum dura obsidione teneri
Posse ratus, tristique fame, et sic denique perdi,
Quos frustra insano tentârat mergere fluctu, 920
Immotus tumida longum circumstetit unda.
Quae facies rerum fuit illa; e culmine summo

" rat. Res erat sanè commi-
" seratione dignissima, et quae
" lacrymas vel invitis eliceret,
" cum tantam miserorum tur-
" bam videremus in summis
" tuguriis, in cymbarum malis
" pallentes, trepidantesque,
" ac panem inclamantes exau-
" diremus.

" Ingravescente malo, et
" Tiberis tumore obfirmato,
" de nuncio Romam mittendo
" per affusos campos, neque
" enim contra fluminis impe-
" tum licebat ascendere, diu
" consultatum, ac demum aegre
" inventus est, qui cymbula
" exigua vectus cum binis re-
" migibus tantum adiret peri-
" culi, qui quidem vix inte-
" gro die per quinque millia-
" ria ad proximos evasit col-
" les, unde Romam citato cur-
" su perrexit. Verum jam ex
" Urbe Magistratus de nobis,
" de militibus, de tanta in-
" opum turba solliciti ingen-
" tem annonae vim validiori
" navi impositam secundo flu-
" vio demiserant, quae qui-

Hinc

Hinc pueri, et miserae matres, ac rustica turba,
Una omnis, nautae è male tutis navibus inde,
Cum macie obducti vultus, et voce trementi 925
Frugem inclamarent, frugem vicina sonarent
Litora, et affusi fluctus, atque improbus imo
Insultans frugem Tibris resonaret ab alveo!
Nulla aderat frugis jam copia; nec ferus altam
Posse dabat dorso conscendere Tibris ad Urbem. 930
Ergo per undantes hinc campos fluctibus, atque hinc,
Arboreas inter frondes, et cespite multo
Densa loca exiguam bino cum remige contra
Ire ratem libuit, collesque exponere ad altos,
Qui tanto dominam rerum in discrimine ad Urbem 935
Iret, opemque malis peteret, promptamque medelam.
 Qualis ubi auratum vellus raptura per aequor
Se juvenum manus ignotis concredidit undis,
Attonito vultu circumspectabat euntes
Turba affusa, novi et tot certa pericula callis 940
Mente agitans tristi pallebat; talis et illam
Ire ratem insuetum per iter, contraque furentis
Insidiasque, iramque hostis communia vota,
Ac vehere extremis spem rebus, vidit, et omnes
Turba obsessa Deos pallens in opem vocitavit. 945
 Attamen interea tanti haud ignara pericli
Subsidium jam Roma vigil submiserat: aedes
Attigit obsessas felici navita cursu:
Haud etenim prono contra se opponere fluctu,

" dem ad extremam necessita-
" tem adductis peropportunè
" advecta est; nec ita multo
" post undarum resedit furor,
" et Tibris alveo sese suo re-
" stituit. "

Evaluit

Evaluit Tibris, aut altam submergere puppim. 950
Ergo pudore gravi, furiisque agitatus acerbis
Demisit caput, et noto condidit alveo.
Persequitur tanto egressum e discrimine, et omnes
En iterum, atque iterum vires Natura furenti
Impete congeminat, si qua terrere minaci 955
Scrutantem possit vultu, atque avertere demum.
Incassum tamen usque furit: rabiemque, minasque,
Auspiciis, Benedicte, tuis tutissimus, acri
Insidiasque animo contemnam: denique cedat
Ira fessa sua, et se victam agnoscat oportet. 960

FINIS LIBRI IV.

DE SOLIS AC LVNAE DEFECTIBVS.

LIBER V.

NUNC age [1] cur multo turpatos sanguine vultus
Inficiat, tristem dum Cynthia permeat umbram;
Quid radios fuco saturet, lucemque coloret
Aëriis deflexam auris, et fila retexat,

1 Totius hujusce postremi libri argumentum est color, qui plerumque apparet rubeus in Luna deficiente: dicitur autem *lucemque coloret Aeriis deflexam auris*, quia superiore libro ostensum est, lumen, quo Luna adhuc cernitur in umbra ipsa, esse lumen refractum in atmosphaera terrestri; ac additur, *et fila retexat*, ad indicandam NeWtonianam luminis theoriam, in qua lux plena, ut infra videbimus, componitur e diversis coloratis filis, quae, ubi ab aliis separantur, suum singula colorem exhibent, omnia vero simul unita album efficiunt.

Porro jure NeWtonus ipse hic invocatur, a cujus immortali theoria repetuntur rationes hujus phaenomeni: illud autem *Tu decus Angligenum, atque humanae gloria gentis*, quod ante hosce novem annos conscripsi in Italia inscius inscriptionis ejus sepulchralis, quam huc delatus inveni ad ejus tumulum auctoritate publica erectum, cum ea consonat mirum in modum: in qua nimirum inter caetera habetur illud *Sibi gratulentur Mortales extitisse tale, ac tantum humani generis decus*.

In sequenti velut hymno, cujus mentionem feci lib. I. adn. 4, innuuntur fere omnia ejus physica comperta, quae potissimum continentur in ejus Philosophiae Naturalis Principiis,

Jam

Jam canere, atque operi supremam impendere curam 5
Aggredior. Non hic Pindi pater, atque sororum
Docta cohors, non Pegasus aliger, et mendacis
Numina Parnassi veniant in carmina. Grande
Tu decus Angligenûm, atque humanae gloria gentis,
Tu majus mihi numen eris, NEWTONE, repostos 10
Cui primo penetrare aditus, penitusque latentes
Sponte dedit vires Natura, arcanaque jura
Discere, et attonitum late vulgare per Orbem[1].
Tu vacuas [2] nôsti primus qua lege per auras
Attracta arcano se foedere sydera ducant, 15
Inflectantque [3] viam, mediumque immobile circum

et in Optica; et exordium sumitur a gravitate generali, quae ad illa priora pertinet.

2 Gravitatem generalem, quam attractionem mutuam appellant, ipse deprehendit primus, et ex Keplerianis legibus motuum coelestium deduxit legem directam massae attrahentis, et reciprocam quadrati distantiae, quam exposuimus lib. I. adn. 45. Eam autem tractavit, ut phaenomenum quoddam, vel Naturae legem, cujus causa ignoretur, et idcirco posui illud *Attracta arcano foedere*.

Addidi *vacuas per auras*, ut exprimerem fluidum illud aetherum, in quo planetarum motus peraguntur, quod ita tenue est, ut resistentiam sensibilem non pariat; ac proinde sint quidem *aurae*, sed aequivalentes vacuo spatio. Newtonus enim non admisit verum vacuum, cum habeat inter caetera illud Princ. l. 2. *Majora autem planetarum, et cometarum corpora in spatiis minus resistentibus motus suos conservant diutius*.

3 Si nulla ejusmodi gravitas haberetur, abirent planetae per rectas lineas: curvatura orbitae provenit a perpetuo nisu gravitatis motum deflectentis. *Medium* autem *immobile*; circa quod *renovant gyros aeternos*, est centrum commune gravitatis, quod solum remanet immobile, ut innuimus lib. I. adn. 42, juxta elegantissimum theorema a Newtono inventum, quod, si quotcumque corpora impellantur utcumque, et agant in se invicem viribus mutuis contrariis, et aequalibus quibuscumque debeat illud punctum, quod appellatur centrum

Aeternos

Aeternos renovent gyros, per inane 4 Cometae
Quo fugiant, longo donec post tempore tristem
Restituant terris vultum, crinesque cruentos.

commune gravitatis omnium simul, vel quiescere perpetuo, vel moveri uniformiter in directum. Hinc in Newtoni theoria movetur etiam ipse Sol motu absoluto non rotationis tantummodo circa proprium axem, sed etiam translationis circa illud commune centrum gravitatis; in quo ejus theoria differt a Copernico, Galileo, et reliquis omnibus, qui ante ipsum movendo Terram, posuerant Solis centrum immobile.

Gyri autem *renovantur* a planetis, ut et a cometis, non quidem penitus accurate iidem, nam mutua gravitas, et resistentia ipsa medii, utcumque exigua, orbitas turbat nonnihil; sed satis proximè, cum perturbationes sint admodum exiguae: fieri autem potest, ut sit aliqua longissima periodus, in qua omnia nostri hujusce systematis corpora redeant ad aliquam positionem respectivam penitus eandem, quo casu omnes gyri omnino renovarentur, et essent natura sua *aeterni*: fortasse resistentia ipsa ad id conducit, sine qua ex summa aberrationum, quae oriuntur ab attractionibus mutuis, et ex differentia aliqua legis gravitatis a reciproca quadrati distantiae, juxta adn. 89. lib. I, motus fortasse accelerarentur; et fortasse haec distributio massarum, distantiarum, eccentricitatum, quae videtur prorsus arbitraria, erat ad id necessaria. Quidquid sit de ea vel suspicione, vel conjectura, periodus ejusmodi deberet esse in immensum longior anno Platonico, cum tam multae nobis jam innotescant inaequalitates, quae nullam prae se ferant proportionem accuratam per numeros exprimibilem; quae quidem si vere incommensurabiles sunt invicem, nulla unquam periodus accurata haberi potest.

4 Newtonus itidem omnium primus veram cometarum theoriam deprehendit, et ab ejus generali gravitate desumitur methodus ab ipso tradita; et ab aliis tantummodo expolita computandi orbitas ex tribus observationibus, qua Hallejus est usus in suis calculis.

De cometarum orbitis admodum oblongis, et recessu perihelia, ac regressu, et caudis, ac crinibus egimus lib. I. adn. 15. Porro Newtonus deprehendit, quo fugiant, cum ostenderit, quo pacto determinari debeat positio axis ad aphelium tendentis.

Nosti

Nôsti etiam, [5] Coeli cum parte feruntur eâdem 20
Jupiter, et multo genitor jam tardus ab aevo,
Cur turbent motusque suos, comitumque catervas:
Non illi irarum memores, sed amore novato,

[5] Notissimum erat Astronomis ante Newtonum etiam, perturbari motus Jovis, et Saturni, ac eorum satellitum, potissimum circa tempus conjunctionis, de quibus perturbationibus loquens Newtonus ipse illud addit, *ut ad ipsas Astronomi haereant*: is quidem nec earum leges definivit, quod fuit argumentum ab Academia Parisiensi propositum pro praemio anni 1750, et iterum pro 1752, qua occasione omnem earum theoriam evolvi opere, quod ibi quidem habuit illud eorum *Accessit*, Eulero referente praemium, sed paullo post Romae edidi, cum editio ab Academia decreta plus aequo differretur, quae nunc demum prodibit Parisiis post annos 8, ut audio: ibi solius Geometriae infinitesimalis ope inveni formulas omnes necessarias ad computandas aberrationes, et tabularum, quae construi possent, formam exhibui, quae quidem pertinent ad illud problema trium corporum, quod innui lib. I. adn. 48.

Adhuc tamen Newtonus invenit caussam ejusmodi perturbationum, nimirum gravitatem generalem mutuam ipsius Jovis, et Saturni.

Hic adhibui illam eorum veluti reconciliationem per attractionem mutuam post iras veteres, quam innui lib. I. adn. 32. Eo respexi in versu, quem adjeci ad designandum illud opus de more, ubi id ad Academiam sine meo nomine transmisi: erat autem is; *Olim irae, nunc turbat amor natumque patremque.*

Si non haberetur velocitas tangentialis, nec gravitas in Solem; vi mutuae gravitatis Jupiter, et Saturnus ad se invicem accederent, et convenirent in centro communi gravitatis: ea velocitate pergunt describere suas orbitas fere circulares, et a se invicem recedunt, cum Jupiter moveatur celerius. Nova autem conjunctio fit post annos circiter 20: cum enim tempus periodicum Saturni sit annorum proxime 30, is annis 20 percurrit respectu Solis duos trientes zodiaci, sive 8 signa; Jupiter autem, orbitam suam duodecim annis absolvit, adeoque circiter singula signa singulis annis percurrit, nimirum 20 annis circulum integrum, et 8 signa; unde fit, ut circa finem signi octavi assequatur Saturnum lentiorem.

Quo

Quo rursum amplexus, rursum oscula mutua poscunt.
Fata vetant conferre globos, jubet ire per auras 25
Impetus, et rursum oppositas discedere ad oras,
Dum se iterum juncti quatuor post lustra revisant.
Nequidquam [6] incertos dubiis erroribus orbes
Implicuit, curasque diu delusit inanes
Cynthia: tu retegis, tu certis legibus arctas. 30
Quid memorem [7] alternos motus, quibus alta tumenti
Objicibus ruptis consurgunt aequora fluctu,
Tum redeunt retro, rursumque in se ipsa residunt?
Quid pressam [8] Terrae formam, circum undique dorso

6 Lunae aberrationes implicatissimas, et earum causam pendentem a mutua gravitate Newtoniana, ac ipsius Newtoni felices conatus, et elementa tabularum ad eas computandas ab ipso proposita, persecuti sumus lib. I. ab adn. 47.

7 Maris aestum derivari itidem a mutua gravitate Newtoniana innuimus lib. I. adn. 20. Intricatissimi phaenomeni, quod usque adeo torserat Philosophorum ingenia explicationem primus omnium invenit Newtonus, ac lib. III. Principiorum evolvit: eam theoriam mirum in modum promoverunt Mac-Laurinus, Eulerus, Bernoullius in iis dissertationibus, quae habentur inter praemio donatas ab Academia Parisiensi anno 1740; et quidem hic postremus ipsas etiam diurnas anticipationes, et posticipationes felicissime sane eruit e theoria gravitatis, exhibita elegantissima analytica solutione problematis, quo quaeritur locus Terrae intermedius inter loca subjecta Soli, et Lunae, in quo ex utriusque actione conjuncta debet consequi maxima intumescentia; cujus quidem problematis solutionem e sola Geometria petitam cum simplicissima constructione geometrica dedi ego in Romano Litteratorum diario.

8 Newtono itidem debetur theoria figurae Telluris ad polos compressae, et elevatae ad aequatorem. Ubi Richerus anno 1672 deprehendit gravitatis vim minorem sub aequatore, quam versus polos; Hugenius, et Newtonus deduxerunt inde compressionem figurae Telluris ad polos, et figuram determinarunt debitam vi centrifugae ortae a rotatione diurna; sed Hugenius solvit problema pro

Quae

Quae tumet in medio, atque polo subsidit utroque? 35
Diversis diversa 9 locis quid pondera? vel quid
Vim 10 cuncta Eoas urgentem sydera in oras,
Annuaque imbriferi celerantem exordia veris?

casu gravitatis constantis, et directae ad unicum centrum, in quo id problema est admodum facile: at Newtonus determinavit calculo quantitatem compressionis etiam pro casu gravitatis mutuae particularum omnium, posita materia Telluris homogenea, licet figuram ipsam determinare non potuerit, quam deinde determinavit Mac-Laurinus elegantissimè. Perquisitionem promoverunt plurimum deinde multi, inter quos eminent in primis Clairautius, et D' Alambertus. Quid in eo genere solius Geometriae ope praestiterim et ego, etiam pro casu nuclei heterogenei, videre poterit, qui velit, opusculo 5 mei operis *de Expeditione Litteraria*; ubi et illud fuse exposui, quod lib. IV. adn. 45 indicavi, cur ego quidem suspicer ejusmodi figuram esse admodum irregularem.

9 Ex ipsa theoria gravitatis pendet etiam genuina determinatio inaequalitatis gravitatis in diversis Terrae locis. Newtonus pro casu figurae Terrae ellipticae invenit in eodem lib. III. Principiorum, debere incrementa vis gravitatis ab aequatore ad polos sequi rationem duplicatam sinus latitudinis locorum, quam quidem rationem observationes exhibent satis proximè; quae cum non praestent idem in incrementis graduum Meridiani, ut deberent; ego inde argumentum deduxi in eodem opusculo *Expeditionis Litterariae*, quod denotat, irregularitatem Terrae pendere a dispositione irregulari partium potius proxima superficiei, quam alte infra ipsam defossa.

10 Exposuimus lib. I. adn. 21. motum communem omnium astrorum lentissimum in Orientem circa polos eclipticae, et diximus adnot. 25. vocari eum motum etiam praecessionem aequinoctiorum, cujus ipsius nominis rationem ibidem exhibuimus. Eum Newtonus deduxit primus ex sua theoria gravitatis in eodem libro: et vim quidem, ex qua is motus oritur, egregie determinavit; quod ad ipsam praecessionem aequinoctiorum pertinet, eam calculo eruit consentientem cum observationibus usque ad unicum minutum secundum; sed D' Alambertus habet multa, quae in eo calculo desideret, quem longe alia via instituit, et tam ipsam praecessionem aequinoctiorum,

Omnibus haec [11] ignota olim mortalibus, acri
Vidisti ingenio primus: nunc te duce molles 40
Jam pueri in ludis, primoque docentur ab aevo.
Nec minus illa [12] quidem vel quondam incognita, vel
Per te jam pueris, teneris et nota puellis (nunc
Aeternum peperere tibi nomenque, decusque,
Scilicet [13] in prima nascentis origine Mundi 45
Quae niveis Charites digitis tenuissima lucis
Fila colorato duxerunt stamine, et aureo
Texuerunt fulvam nectentes pectine telam,

quam ejus inaequalitatem, ex qua pendet alius perquam exiguus astrorum motus a Bradleyo detectus, invenit ipsis observationibus admodum conformem. Adhuc tamen omnis ea etiam determinatio NeWtono debetur, qui primus docuit; unde is motus proveniat, et viam exhibuit in ea perquisitione adhibendam.

11 Haec sunt praecipua omnia consectaria gravitatis generalis pertinentia ad generale Mundi systema, quae NeWtonus persecutus est in tertio Principiorum libro, et nunc jam passim proponuntur in ipsis scholis: faciendus jam transitus ad ea, quae pertinent ad lucem, et colores, quae habentur in ejus Optica.

12 Quae ad luminis naturam pertinentia NeWtonus detexit, et protulit, non solum fuerunt olim nihilo minus incognita, quam, quae pertinent ad gravitatem generalem, sed fuerunt omnino multo magis; nam licet NeWtonus et leges, et consectaria ejus vis deprehenderit, praefulserant quodammodo, velut quaedam aurora, quae Keplerus de magnetismo Solis, Galileus de motu gravium, Hugenius de vi centrifuga protulerant; at nihil omnino ante ipsum inventum fuerat, quod ego sciam, unde admirabilis ille lucis textus, et diversa, ac permanens filorum coloratorum natura derivari posset. Haec autem Philosophiae NeWtonianae pars minus sublimiore Geometria indigens, vulgo etiam est notior, quae cum ipsis quoque puellis nota dicitur, alluditur ad Algarotti opus, quod ipse inscripsit, *Il Neutonianismo per le Dame*, in quo is potissimum egit de luce, et coloribus.

13 NeWtonus invenit illud, ut innuimus supra adn. 1, radium luminis constare filis quamplurimis diversae naturae, quae

Inspiciens

Inſpiciens oculo diſpeſcis primus acuto,
Filaque diſſocias, atque acri ſingula ſiſtis 50
Obtutu contemplanda, et [14] quem quodque colorem
Exhibeat, quantumque; doces, de tramite recto
Intortum deflectat iter; vel [15] quanta requirat
Intervalla viae, ut certa vice, ſi nova ſeſe
Corporis objiciat facies, aut pergere porro, 55
Aptius, aut retro fiat reſilire repulſum:
Tum ſi [16] plura ſimul coëant, quem mixta colorem
Component, vel quo percellent lumina niſu.

fila ope priſmatis a ſe invicem ſeparata contemplatus, invenit diſcrimen ipſum illorum filorum, et naturam ſingulorum, conſtantem potiſſimum binis proprietatibus, quarum utraque hic nobis neceſſaria eſt ad explicandum ruborem Lunae in eclipſibus. Utramque hic attigi, inferius autem fuſe explico, et experimentis confirmo.

14 Prima proprietas filorum luminis: permanens refrangibilitatis gradus in ſingulis conjunctus cum permanente colore; et haec quidem eſt vulgo notior, ac ope priſmatum demonſtratur.

15 Secunda proprietas: vices facilioris tranſmiſſus, et facilioris reflexionis; ex quibus pendet tota naturalium colorum theoria, quae in communibus Phyſicae inſtitutionibus vel prorſus omittitur, vel vix attingitur.

Radius luminis, ut infra videbimus, dum progreditur, acquirit binas diſpoſitiones contrarias, quas mutat per vices poſt certa intervalla, quae pro aliis coloratis filis in iiſdem circumſtantiis, et in aliis circumſtantiis pro eodem etiam colorato filo, diverſa ſunt, et ſi is radius adveniat ad novi medii ſuperficiem cum altera ex iis diſpoſitionibus, facilius reflectitur; ſi autem cum altera, facilius tranſmittitur, ingrediens hoc novum medium. Ea omnia hic attigi.

16 Newtonus propoſuit admodum ſimplicem conſtructionem problematis, quo quaeratur ſpecies, et intenſitas coloris, qui oriri debet ex mixtione datae quantitatis radiorum ſpeciei datae; et ea ſolutione eſt uſus ad determinandam ſeriem colorum, quos exhibent laminae ſenſim attenuatae, ut in bullis ex aqua craſſa conflatis, quas nominavimus lib. III. adn. 14, et in coloribus craſſarum laminarum, quae ſe-

His ita perſpectis, prono jam caetera victor
Perſequeris curſu, et campo expatiaris aperto. 60
Nam quodvis filum [17] quae lamina materiaï
Tranſmittat, reddatve, magis prout craſſa, minusve;
Deinde doces, pleno radius cum venerit albens
Lumine, quae coeptum producant ſtamina curſum,
Quae redeant, qui proinde color ſeu tranſpiciatur, 65
Sive oculis ſeſe reflexo lumine ſiſtat.
Hinc formas [18] rerum externas, et particularum
Deprendis variam molem, textumque, et opaco
Quae ſint caeca ſinu, quae corpora pervia luci,
Quae certum ſervent, et quae variata colorem 70

ries inventae ſunt admodum conformes phaenomenis. Ejus conſtructionis fundamentum, quod ipſe prorſus ſuppreſſit, exhibui in mea diſſertatione de lumine edita anno 1748, ubi tamen ipſi conſtructioni adhibendam omnino cenſui correctionem quandam debitam inverſioni numerorum quorundam, quam puto NeWtono effugiſſe, quod ipſum, arbitror, me ibidem demonſtraſſe. In ſua autem diſſertatione de lumine P. Carolus Benvenutus Societatis noſtrae vir doctiſſimus, calculis ex illa mea correctione reſtitutis, invenit ſeries colorum obſervationibus itidem admodum conformes.

17 Ex ſuperioribus principiis illud deduxit NeWtonus, e radiis datam materiae laminam ingreſſis, ubi deferuntur ad finem ejuſdem laminae, alios reflecti, et alios progredi; prout nimirum eo appulerint in certo gradu diſpoſitionis facilioris reflexionis, vel facilioris tranſmiſſus. Inde autem determinavit pro data quavis craſſitudine, qui radii debeant reflecti, qui vero progredi: tum qui color oriri debeat ex mixtione reflexorum, qui ex mixtione tranſmiſſorum; et verò, ut infra videbimus, invenit, ubi laminae ſint craſſae, omnium colorum fila aliqua tam reflecti, quam tranſmitti, et ex utriſque gigni radium allapſo ſimilem; ſed ubi tenues ſint laminae, ſeparari colores; et ipſas colorum ſeries definivit pro variis craſſitudinibus, uti ſuperiore numero innuimus.

18 Inde NeWtonus deduxit, et rationem naturalium colorum, qui quidem colores ſunt quaedam externae formae cor-

Pro

Pro vario positu mutent oculique; suique.
Cur tenerae viridi frondes velentur amictu,
At nimio exustae flavescant Solis ab igne;
Unde rosis ardens vultu rubor; unde, nigrantes,
Purpura, quae violas tristi circumsidet umbra, 75
Canaque cur puro niteant candore ligustra;
At contra tenerae cur laevia colla columbae,
Et bullae pueris lusus, tenuesque capilli,
Filaque, quae molli deducit aranea succo,
Et gemmae, et pluvio pendentes aëre guttae, 80
Mille trahant varios adverso Sole colores.

Haec primus comperta vides, simul abdita [19] pandis

porum; et internum eorundem textum, nimirum magnitudinem, et dispositionem particularum, ex quibus ea constant, et discrimen inter corpora pellucida, et opaca, inter ea, quae habent colorem permanentem, et ea, quae variabilem; quae omnia inferius explicabuntur singillatim uberius.

Si corpus est ita homogeneum, ut non habeantur satis magna intervalla vacua, vel diversae densitatis, inter particulas densitatis alterius, id corpus, cujuscumque densitatis sit, est pellucidum: si illa intervalla adsint, est opacum: colorem autem habebit eum, quem exposcit crassitudo lamellarum, ex quibus ejus particulae constant, quae crassitudo saepe definitur determinatè ex illis superioribus seriebus superioris adnotat. Et quidem si particulae multò densiores sunt inclusae in vacuo, vel in medio multo rariore, color est permanens; si particulae rariores, vel vacuum in medio densiore, color est variabilis.

Posui autem plura exempla tam colorum permanentium, quam variabilium ad carmen adornandum.

19 In binis voluminibus haud ita magnis, nimirum in eo, quod continet Principia Philosophiae Naturalis, et in eo, quo continetur Optica, habentur vera comperta maximi momenti ad veram Physicam pertinentia, utique multo plura meo quidem judicio, quam in monumentis omnium Physicorum, qui ipsum praecesserunt. In iis autem quamplurima et ad Geometriam, et ad Analysim pertinentia continentur; ut inter caetera fundamentum to-

Mille alia, atque alia accumulans, totumque per Orbem
Diffundis late. Stupet alta mente volutans
Attonitum mortale genus tam multa repente 85
Educta, atque adeo brevibus concredita chartis:
Plus unum vidisse hominem, quam viderit omne
Naturam inquirens Sapientûm turba per aevum.
Ergo novum Coelo delapsum ut Numen ab alto
Te supplex unum veneratur, Apollinis ara 90
Posthabita, tua scripta terit noctuque, diuque
Evolvens, te in vota vocat, te oracula poscit,
Dona tibi, tibi thura parat studiosa juventus,
Altaque marmoreis meditatur templa columnis.
Huc ades o igitur, vatemque inventa canentem, 95
Magne, tua, atque almae tua tenvia stamina lucis
Tu praesens moderare, incertos tu rege gressus,
Da facilem venam, et cantum, versusque sonantes.
Principio [20] albenti radius qui lumine fulget

tius calculi directi, et inversi fluxionum, sive calculi differentialis, et Integralis. Mirum autem, quam multa alia habeantur in tot aliis ejus opusculis, in Arithmetica universali, In enumeratione curvarum secundi generis, in tractatu de quadratura curvarum, et aliis, quae simul collecta prodierunt Lusannae in pluribus ejus opusculorum tomis.

Qui haec omnia noverit, atque perpenderit, et ante omnia mundani systematis evolutionem ex legibus gravitatis, et totam luminis theoriam, facile percipiet nullis laudibus satis celebrari posse ejus In Remp. litterariam promerita. Promeretur sane poëticam hanc apotheosim potiore jure, quam tot mendacia Veterum Numina, quae adhuc ad carmen adornandum invocantur. Libri, ab eo relicti, sunt quaedam velut oracula, a quibus responsa redduntur vera, non mendacia illa, quae dabantur per tripodes, et cortinam.

20 Exordium hic desumo a natura radii albi, qui utcunque ad sensum tenuissimus sit, et appareat simplex, adhuc tamen componitur ex innumeris filis diversae naturae: eorum

Candidus

Candidus, ille quidem quamquam tenuissimus, atque
In speciem prorsus simplex, quamplurima caeco (100
Juncta inter sese nexu mage tenvia fila
Continet, atque oculos collatis viribus urget.
His autem, quamquam numero sunt innumerali,
Omnibus est dispar filis natura, nec una 105
Pergendi recto vis tramite, nec color unus.
Namque dedit filo ingenitum natura colorem
Cuique suum, nulla quem vi, non flexibus ullis
Exuat, atque oculos mutato ludat amictu.
Nec minus et vires, et recti callis amorem 110
Cuique suum Natura dedit, quem singula fila
Aeternum servant nullas mutata per artes.

Atque ea [21] si penitus libeat cognoscere; primum
Huc iterum revoca, atque animo tibi siste sagaci
Luminis ingenium recolens. Dum corpore ab uno
Scilicet egressa alterius lux aurea frontem (115

autem filorum singula habent suum innatum colorem, et suum itidem innatum refrangibilitatis gradum, quem ego exprimo per vires, et *amorem callis recti*, cum alia magis, alia minus ab hoc recto itinere detorqueantur, ubi appellant in eodem prorsus angulo ad eadem media, adeoque diversa vi resistant mutationi directionis sui motus.

21 De luminis refractione, et vi refringente egimus lib. III. adn. 4. ac lib. IV. adn. 18. Porro ad habendam refractionem, ut ibidem diximus, illud requiritur, ut radius deveniat ad superficiem dirimentem duo media heterogenea, et deveniat obliquus; si enim ingrediatur per lineam perpendicularem; nulla habetur refractio, et hoc exprimitur per illud *inclinata subit*. Requiritur autem et illud, ut binorum illorum mediorum vis in lumen non sit prorsus eadem, *quod vix eveniet* in mediis heterogeneis. Ea vis, caeteris paribus, est major in mediis densioribus, et itidem, caeteris paribus, major in mediis magis sulphurosis, et unctuosis; quamobrem posset e binis mediis alterum esse ita densius altero,

Corporis inclinata subit, nisi forte trahenti
(Eveniet quod vix) aequa vi pollet utrumque,
Torquet iter, rectoque infracta à calle recedit.
Ergo ubi [22] cum filis radius devenerit albens 120
Omnibus, atque viam mutaverit, hoc magis, illud
Torquetur minus, atque minus, nexuque soluto
Omnia diversas distracta feruntur in oras;
Sive quod haud aequo contendant incita cursu,
Viribus atque adeo haud aeque inflectantur iisdem,
Sive [23] quod et moles, et textus particularum (125

et simul ita minus sulphurosum, vel unctuosum, ut vis utriusque esset prorsus eadem, quo casu in transitu ab altero ad alterum utcumque obliquo nulla haberetur refractio. Verum rarissima sunt corpora, quae eo pacto accedant ad aequalitatem virium, et fortasse nulla omnino sunt, quae ejusmodi aequalitatem habeant omnino accuratam.

22 Igitur ubi radius integer albus deveniat inclinatus ad ejusmodi superficiem ita, ut refractus mutet directionem sui motus, ita distrahitur, ut alia e filis ipsum componentibus refringantur magis, alia minus, et proinde per diversas vias progressa recedant a se invicem.

23 Innuuntur binae causae, ex quibus provenire posset hujusmodi diversa refractio: nam primo quidem, si diversae luminis particulae ferrentur diversis velocitatibus, eâdem vi illae deflecterentur minus a recto itinere, quae velocius moverentur; nam ea vis ageret breviore tempore, adeoque minorem gigneret motum, qui praeterea cum majore praecedente motu compositus, minorem induceret deflexionem novi motus compositi a motu priore: deinde vero, si eâdem etiam velocitate ferrentur omnes, et vis, qua corpus refringens in eas agit, esset diversa, ob diversam nimirum ipsarum molem, et diversum textum punctorum eas componentium (nam vis in totam particulam pendet a vi in singula puncta, et colligitur ex summa hujusmodi virium, quae pro varia distantia, positione, et numero eorundem punctorum varia esse debet), alius in aliis particulis generaretur motus novus componendus cum priore, adeoque alia in aliis mutatio directionis motus compositi.

23 Hic non definio, utra sit

Sint

Sint aliis alii, ducantur et impare nisu.
Quidquid id est, fugiunt sese, in diversaque tendunt.
Tum verò 24 sociis si singula fila relictis
Adveniant, feriantque acrem longo ordine visum; 130
Protinus exoritur series tibi certa colorum,
Et varia pulchras depingit imagine formas.
Nec vero 25 sejuncta semel rutilantia fila
Ingenium mutant, et mores. Corpore ab uno (135
Quod semel intortum magis est, id semper ab omni
Corpore torquetur pariter magis, atque colorem,

discriminis causa, verum in se cunda parte meae dissertationis de lumine, puto, me demonstrasse id non pendere a sola diversa celeritate: sed et illud facile demonstratur, velocitatem post quamvis diversam refractionem fore diversam, etiamsi ante eam aequalis fuisset. Hinc est admodum probabile, haberi utrumque simul etiam in eo lumine, quod per tenuissimam aetheris substantiam primo emissum deferatur ad primum medium refringens.

24 Haec fila ita separata per refractionem, si ad oculum deveniant singula, sive nimirum moveatur oculus ita, ut alia excipiat post alia, sive excipiantur superficie aliqua pura, et candida, ad cujus alias partes alia deferantur; excitant alia colorem alium, et oritur certa quaedam series horum colorum, quam paullo inferius proferemus.

25 Jam vero fila singula servant semper post ejusmodi separationem eundem refrangibilitatis gradum, quem habuerunt initio, et eundem colorem. Si nimirum novis superficiebus excipiantur singula in eodem angulo alia post alia, filum, quod in prima refractione magis refractum est, semper refringitur magis, et manet unicum, non iterum in plura discerptum. Servat autem eundem colorem, quem primo habuit, quotcunque novas aut refractiones, aut reflexiones habuerit, et, quod infra uberius explicabitur, ubi hae proprietates, quae hic tantummodo proponuntur, confirmabuntur experimentis; si illud filum appellat ad superficiem quamcumque, quae in plena luce soleat esse coloris cujuscumque, sed appellat ipsum solum, ad quod requiritur, ut illa superficies collocata sit in loco penitus obscu-

Quem

Quem semel exhibuit, semper, quocumque feratur,
Exhibet, et quovis (dictu mirabile!) fuco
Illita se objiciant venienti corpora, semper
Nativum servat filum quodcumque colorem. 140
Haec autem [26], quamquam sua sint discrimina filis
Omnibus, et numero careant, ceu diximus ante,
Nominibus tantum septem complectimur, atque
Dissimiles minus in classem conducimus unam.
Atque age jam, seriemque, et nomina disce colorum.
Quae minus à recto discedunt tramite fila, (145
His Rubeus color est, quali cum prima sereno
Urget equos Aurora die, Solemque sequentem
Nunciat, aut quali se celsa papavera jactant,
Sanguineusque ardet venis turgentibus humor. 150
Proximus huic, fulvo nomen qui duxit ab auro:

ro, ad quem nulli radii adveniant praeter illum; in illa superficie non apparebit ille color solitus illius superficiei, sed color debitus illi filo luminis separato.

26 Haec fila diversae naturae in quovis tenuissimo radio albo sunt ita multa, ut numerum omnem videantur excedere: ductus enim ille luminis colorati, in quem is radius dividitur, videtur esse prorsus continuus, adeoque divisibilis in infinitum. Est sane admodum ingens eorum filorum numerus, quorum singula diversum habent et refrangibilitatis gradum, et colorem innatum. Adhuc tamen inter hosce diversos colores innatos multi ita parum a se invicem differunt, ut eodem nomine nominentur. Rubei, ex. gr., dicuntur quamplurimi, quorum alii magis, alii minus, ut ita dicam, rubei sint, et a colore unius nominis ad colorem alterius transitur per quosdam velut gradus continuos, sive, ut Galli appellant *par nuance*, vel, ut Itali, *con una sfumatura*.

Classes horum coloratorum filorum, quibus diversa nomina sunt imposita, sunt septem, adeoque septem sunt primitivi, et simplices colores, *Rubeus*, *Aureus*, *Flavus*, *Viridis*, *Caeruleus*, *Indicus*, *Violaceus*, quorum ordinem facile memoria retinebit, qui ex initialibus litteris barbaram sibi vocem ef-

Immitis

Immitis color! heu quantis mortalia corda
Exagitat curis acuens! quae dira per Orbem
Bella movet, turpesque dolos, atque impia furta!
Pone subit fessis solamen dulce colonis, 155
Qui falcem vocat, et maturas Flavus aristas
Ostentat late campis, finemque laborum.
Infert se medium Viridis, quo vere novato
Luxuriat Natura, et frondes montibus altis,
Et teneras pratis herbas convestit apricis; 160
Quove nitent multo commixti adamante smaragdi,
Sive coronati stent alta fronte tyranni,
Mollia seu tenerae ludant per colla puellae.
Insequitur Viridem, vasti per caerula ponti
Qui placido regnat fluctu, cum forte furentem 165

formet *Rafucin*, et meminerit viridem *v* esse in medio, non in fine.

Ea quae ad enumerationem adornandam adjecta sunt, patent fere omnia. Flavas esse, et ita a Poëtis appellari aristas jam messi maturas, satis constat: a caeruleo colore appellata sunt *caerula ponti* a Veteribus, sed is non habetur, si undae a ventis excitatae spumas agant. Coelum itidem, quod, si nebula inficitur, pallescit; si nubibus obtegitur non ita densis, albet; flante Borea satis serenum, caeruleo plerumque est colore admodum saturo; quin immo dici censetur *caeruleus*, tanquam *caeluleus*, nam et *Caelum* scribitur pro *Coelum*. Indicus parum differt a caeruleo, cum quo etiam confundi solet, quemadmodum et flavus cum aureo, ut idcirco aliquando illa septem genera colorum primitivorum reducantur ad quinque. Violaceus est ita languidus, et nigricans, ut accedat plurimum ad nigrum, qui est defectus totius luminis, et umbram, in quam is color desinit, qui est postremus. Quoniam is maximè omnium refringitur, habebit omnino celeritatem omnium minimam, si etiam a celeritate diversa pendet diversa refrangibilitas; idcirco autem etiam obscurus is erit, quia si celeritas luminis esset prorsus nulla, nulla itidem haberetur impressio in oculum, quod pertinet ad tenebras, et nigredinem.

Conclusit

Conclusit caeco turbam rex Aeolus antro,
Nec fervent fractae spumis albentibus undae;
Vel quem, cum nullae texerunt aëra nubes,
Sed rigidus purum Boreas reclusit Olympum,
Suspiciens, Caelo Saturum miraris in alto. 170
Caeruleo vultum assimilis subit ilicet alter
Pone sequens: Tellus olli dedit Indica nomen.
Postremus, Violae qui tristia lumina nigrae,
Lumina, sordentesque artus confundit, et inde
Nomen habet: fusco sordescit turbidus ore 175
Ille quidem, noctemque refert, tenebrasque nigrantes,
Ac demum in caecam paullatim desinit umbram.
Fors etenim lento tardus pede, luce maligna
Vix urget spectantûm oculos, viresque trahentes
Ante alios sentit, rectoque à tramite flexus 180
Torquetur magis, et magis omnibus unus aberrat.
Atque [27] hos, adveniunt cum dissociata, colores

[27] Si omnia ejusmodi fila uniantur; habetur iterum color albus: si autem plura, et non omnia; tunc oritur color aliquis ex eorum mixtione compositus; et huc pertinet illa NeWtoni constructio, de qua egimus adn. 16. Color autem compositus aliquando est admodum similis cuipiam e simplicibus ita, ut oculus discrimen non agnoscat, si eos simul intueatur sibi etiam invicem proximos, sed ad eos discernendos opus sit nova refractione, quae compositum dissolvit in sua fila primigenia, simplicem autem relinquit semper unicum sine ulla nova distractione: at aliquando color compositus differt plurimum ab omnibus simplicibus.

Ubi conjungantur simul duo, vel tres non ita a se invicem remoti; oritur color intermedius inter ipsos: sic caeruleus, et flavus commixti aequis partibus exhibent intermedium viridem, viridis, et aureus flavum itidem intermedium. At ex extremis, rubeo nimirum, et violaceo, oriuntur colores quidam purpurei admodum diversi ab omnibus simplicibus. Origo autem unica colorum omnium in NeWtoni theoria est

Fila

Fila ferunt, quae si rursum simul omnia in unum
Conveniant, rursum candens tibi nascitur albor,
Obruit et nimio perculsos lumine visus. 185
Quod si plura quidem, sed non simul omnia fila
Junxeris; exoritur mixtus color, isque vel uni?
Simplicium assimilis, vel qui discedat ab illis
Omnibus, atque nova percellat lumina forma.
Caeruleus, flavusque color si partibus aequis 190
Conveniant, viridem cernes exsurgere; at ipse
Restituit flavum viridis, si jungitur olli
Aureus, et vena foecundum divite spargit.
Mille novos generat, violae si fusca nigrantis
Purpura cum roseo coëat permixta rubore; 195
Cunctorumque idem sunt fons, et origo colorum
Unica, distractae coëuntia stamina lucis.

sola mixtio quorundam ex filis illis coloratis primigeniis praeter album, qui est omnium conjunctio, et nigrum, qui est omnium defectus.

Hic tamen cavendum ab aequivocationibus, ob quas nonnulli Physici inutiles quaestiones instituunt, quaerentes, an colores sint in rebus ipsis. Coloris nomine quatuor inter se admodum diversa denotari solent; nimirum 1° idea illa coloris, quae excitatur in anima, et quam immediate cognoscimus, et in hac acceptione color adhibetur in animastica, ac est in ipsa anima; 2° illa impressio, quam lumen allapsum efficit in nostro sensorio, et in hac acceptione color est in sensorio ipso, ac in Physica quandoque in eo etiam sensu adhibetur; 3° illa dispositio, quam habet quidam determinatus luminis radius, ad efficiendam quandam determinatam impressionem in organis nostri sensorii, quae quandam determinatam ideam excitet in anima, et in hac acceptione adhibetur ab Opticis potissimum Newtonianis, ac ita acceptus color est in ipsa luce: pronum est autem videre, cur bini colores eandem impressionem faciant, quam tantundem radiorum intermediorum, prorsus, ni fallor, ut eundem sensum excitant impositi humero bini

Neve

Neve [28] haec arbitrio mentis conficta feracis
Esse putes. Fuit illa dies, qua quisque latentis
Naturae arcanas meditando extundere leges 200
Speraret caecam per noctem. Nunc aliter jam
Res agitur. Procul à doctis commenta lyceis,
Ingeniosa licet, caecus procul exulat ardor
Naturam fingendi animo, secretaque jura (205
Edendi tamquam ex tripode, atque ab Apollinis ara.
Scrutamur Naturam ipsam, quaeque objicit ultro
Illa suos peragens cursus noctuque, diuque
Servamus vigiles, aciesque intendimus ambas
Instantes operi, et longas producimus horas.

lapides, alter unius librae, alter trium, ac bini duarum singuli, 4° coloris nomine accipitur illa dispositio, quam habet certus certi corporis textus ad reflectenda certa colorata fila, ex quorum compositione oriatur certa illa impressio, quae certam illam ideam excitet; et in hoc sensu accipitur nomen coloris à pictoribus, qui ad certos inducendos colores certas substantias adhibent, in quo sensu colores sunt in rebus ipsis.

28 Huc usque proposita est proprietas radiorum luminis pertinens ad refrangibilitatem, et colores; transeundum est nunc ad eandem probandam; quod ante, quam praestem, propono methodum rectè philosophandi.

Hypotheses prorsus arbitrariae nunc quidem a bonis Physicis rejiciuntur omnes, ac in Naturam inquiritur per observationes, et experimenta. Observationes fiunt spectando id, quod Natura per se ipsam sponte exhibet: hujusmodi sunt observationes pertinentes ad Astronomiam, et Historiam Naturalem: experimenta fiunt ponendo per artem Naturam in eas circumstantias, in quibus debeat agere, et nobis ostendere id, quod quaerimus, quod pertinet ad Physicam Experimentalem.

Porro et ferro, et igne utimur, ac dissolvimus per vim compagem corporum potissimum in Chemia, et Naturam quodammodo velut torquentes cogimus revelare sua secreta. Utrumque investigationis genus conatus sum exprimere hisce versibus.

Per ejusmodi investigationes quaerimus analytico more prin-

Nec

Nec satis hoc: varias mille instrumenta per artes
Tractamus facili dextra, densisque domamus (210
Vulneribus confossam, arcanaque pandere jura
Cogimus, et rerum caussas aperire repostas
Torquentes: neque enim ferro, neque parcimus igni
Solventes compagem, abscissaque membra secant s.
Ergo oculis lustrare tuis quae diximus, atque (215
Singula non dubias poteris tentare per artes,
Si libeat: primum sed quaae satis apta videndo
Instrumenta, caram: tu mentem adverte canenti.
Principio 29 è pura vitrum tibi selige massa, 220
Intima cui sparsae non turbent viscera bullae,

cipia quaedam generalia, et leges generales, ex quibus pendent reliqua Naturae phaenomena, quae inde per synthesim deducuntur, cujus generis bina egregia sane exempla Newtonus dedit in gravitate generali, et natura radiorum luminis, tam analysi, quam synthesi usus prorsus admirabili. Porro aliquando observationes, et experimenta immediate nobis exhibent principia, quae quaerimus; sed aliquando etiam hypotheses in auxilium vocamus, non tamen penitus arbitrarias, sed conformes iis, quae observantur, et quae supplentes immediatarum observationum defectum, viam investigationi sternant, tanquam divinantibus; ut si ea, quae ex ipsis deducuntur, inveniamus re ipsa, easdem retineamus, et progrediamur ad nova consectaria; secus vero, ipsas rejiciamus. Et quidem plerumque hanc esse arbitror methodum omnium aptissimam in Physica, quae saepissime est velut quaedam enucleatio epistolae arcanis notis conscriptae, ubi per attentationem, et per errores etiam plurimos paullatim, et cautè progrediendò ad veram ejus theoriam devenitur; cujus rei specimen admodum luculentum exhibui in mea dissertatione de lumine, agens de rectilinea luminis propagatione, ac in Stayanae Philosophiae tomo I, agens de generalibus proprietatibus corporum, et de vi inertiae in primis, tomo vero II agens de totius Astronomiae constitutione.

29 Primum ex instrumentis necessariis ad hanc luminis theoriam demonstrandam, est prisma, quod fieri solet triangu-

Nec

Nec vario undantes sinuentur tramite venae.
Proh quantum sinuatae undae, quantum obfuit olim
Dispersis clausum bullis vel inane, vel aër!
Ipsum autem in ternas facies procurrat: at illas 225
Attritu exaequa multo, tenuique subactae
Pulvere fac niteant, qualis nitet alta quieti
Fontis aqua, atque imas pellucida monstrat arenas.
Usus erit 30 vitreae lentis quoque, quae tibi massa
E parili tumeat laevissima parte ab utraque, 230
Ac radios medium compellere possit ad axem;
Qualem sublimi defixam in vertice Coelo,
Erigit, aethereos qui terris admovet ignes
Nocte tubus tacita, vel qualem instante senecta
Ante oculos mos est suspendere caligantes. 235

lare, sed satis esset etiam cujuscumque figurae, dummodo haberentur binae facies planae, et politae, ad se invicem inclinatae in angulo non ita exiguo. Quid haec forma praestet, et cur vitra binis superficiebus planis terminata non dividant colores ad sensum, fuse exposui in adnotationibus ad poëma de Iride P. Noceti, et fortasse innuam inferius.

Id, quod est prorsus necessarium ad habendum experimentorum successum, est omnino vitri constitutio, quae debet esse penitus uniformis, et carere tam venis, quam bullulis inclusis, ne nimirum radii in primo ingressu in prisma separati deflectantur, dum permeant ipsam massam vitri, et iterum commisceantur. Pluribus Physicis id imposuit, ut Mariotto in Gallia, Comiti Rizzetto in Italia, et ea fuit potissima ratio, cur tandiu tam multi obstiterint egregiae huic theoriae Newtonianae de luce, et coloribus, quae, experimentis institutis per satis bona prismata apud omnes Academias, demum jam omnino communiter recepta est.

30 Lens etiam adhibetur in hujusmodi experimentis, ut paullo infra videbimus, ad radios homogeneos colligendos, et ab heterogeneis magis separandos. Necessariae sunt autem lentes non ita multum convexae, uti sunt nimirum eae, quae adhibentur pro vitro objectivo telescopii augentis ima-

Jam

Jam vero [31] occlusis amplum conclave fenestris
Fac tibi nigrescat: tantum per tenve foramen
Irrumpat radius tenuis, parvaque rotundum
Exhibeat [32] rite exceptus sub imagine Solem.
Protinus oblongo venientem intercipe vitro 240
Obliquam objiciens faciem: flectetur in ipso
Ingressu primo, distractaque fila recedent
Diversas molita vias, ac rursus ad auras
Regressa aërias, rursus non flexibus aequis
Ad calles detorta novos magis avia tendent, 245
Ac demum opposito secreta in parjete sistent.
Tum vero manifesta fides: nam Solis imago
Non niveo candore nitens, non orbe rotundo,
Verum septenis distincta coloribus, atque

ginem objecti, quod idcirco apparet propius, vel pro specillis primo senescentium, quae nos in Italia appellamus *di prima vista*; nam in utroque lentium genere curvatura est exigua.

31 Haec instrumenta adhiberi debent in conclavi bene occluso, et multo adhuc melius succedit res, si nigro panno obducantur parietes, ne ulli habeantur radii, sive directi, sive reflexi, praeter unicum, circa quem experimentum capitur, qui per tenue foramen intra conclave ipsum admittitur.

Et id quidem utcumque expressi; illud addi posset, quod pertinet ad reddendam faciliorem observationem experimenti: extra fenestram collocari solet speculum mobile, in quo radius ita reflectatur, ut deinde ingrediatur conclave ipsum directione, quae sit maxime commoda, quae directio conservatur per motum ipsius speculi, licet interea moveatur Sol. Est autem et machina motum habens ita temperatum per rotas dentatas, et pendulum, ut speculum ipsi affixum sponte habeat motum necessarium ad conservandam radii reflexi directionem constantem, quae machina dicitur *Heliostata*, tanquam Solem sistens.

32 Radius Solis, qui ingreditur per illud foramellum, habet figuram conicam, cujus basis ante ingressum est discus Solis, et vertex ipsum foramellum, in quo radii decussantur

Longior excurret: cernes è pluribus illam 250
Solis imaginibus coalescere: prima rubebit,
Sordenti violae postrema nigrescet amictu,
At mediae medios referent ex ordine fucos.
Hinc summae incurvos frontes flectentur in orbes:
Ast illos recto conjunget tramite, et oram 255
Hinc, atque hinc, dorsumque leget revolubile limes

in ingressu, ac intra conclave efformant alterum conum rectum priori ad verticem oppositum. Hinc si is radius excipiatur plano perpendiculari ad ejus axem, habetur imago Solis circularis.

Si jam ad ipsum foramen applicetur prisma ita, ut una ex ejus superficiebus planis excipiat ipsum radium obliquè, quae autem obliquitas sit omnium optima, dicetur paullo inferius; in illa ipsa superficie radius ingrediens refringitur accedendo ad perpendiculum, et ea refractione dividuntur colorata fila, refractis omnium maxime violaceis, omnium minime rubeis; sed cum differentia refractionum sit exigua, angulus, quo continentur fila omnia pertinentia ad radium e quovis dato Solis puncto digressum, est ex guus; et cum itidem iter intra prisma sit exiguum, separatio est exigua; verum in egressu ex altera superficie polita, et itidem obliqua viae fili cujuslibet, habetur altera refractio cum recessu à perpendiculo.

Si binae superficies essent parallelae, refractio in egressu esset prorsus aequalis, et contraria refractioni in ingressu: hinc quodvis filum egrederetur per rectam parallelam illi, per quam advenit: adeoque distantia filorum pertinentium ad radium egressum ex quovis unico puncto Solis, esset exigua, et in progressu radii extra vitrum perseveraret eadem sine ullo augmento, quam ob caussam etiam si unicus haberetur radius pertinens ad unicum punctum Solis, nulli colores separati apparerent, nisi vitri crassitudo aliquanto major induceret separationem aliquanto majorem. At in prismate, in quo superficies sunt ad se invicem obliquae, refractio in egressu diversa est à refractione in ingressu: hinc remanet filorum divergentia post egressum, quorum idcirco distantia à se invicem augetur in progressu semper magis; et si rite adhibeatur prisma, refractio in egressu ad partes easdem inflectit radios, et auget divergentiam, ac separationem, quod

Arcubus

Arcubus innumeris, rutilam qui lampada Solis
Quisque suo pictam concludet in orbe colorans.
Non tamen 33 hac penitus disjuncta in imagine fila
Aspicies, et secretos fulgere colores. 260
Purus erit curvis in frontibus hinc rubor, inde
Purpureus violae nigror, ac genus omne colorum
Limitibus purum in rectis; sed lumen in îsdem

exprimitur per illud *magis avia tendunt*.

Hinc ubi ad majorem distantiam devenit ille conus radiosus egressus e prismate, ut ad oppositum parietem; oritur illud, quod appellari solet spectrum coloratum. Nimirum pro imagine Solis rotunda, et alba, habetur ductus quidam oblongus, et distinctus illis septem primigeniis coloribus.

Statim autem ex ipsa ejus spectri forma apparet illud, ipsum componi ex serie ad sensum continua circulorum, quorum singuli referunt imaginem Solis suo determinato colore expressam. Ejus enim figura est oblonga: binae frontes terminantur binis semicirculis obvertentibus cavitatem sibi invicem, quorum alter est rubeus, alter violaceus: latera autem sunt lineae ad sensum rectae, et inter se parallelae, quae contingunt et illos extremos circulos, et omnes intermedios.

Dixi autem circulos, cujus figurae non erit accuratè, nisi ad summum unica ex tam multis imaginibus coloratis, ea nimirum quae habeat filum pertinens ad radium Solis centralem, et transeuntem per centrum foraminis rotundi perpendicularem plano, quo excipitur: reliquae omnes erunt ellipticae: verum si planum illud fuerit ad sensum perpendiculare radio tendenti ad medium spectrum, ellipticitas erit perquam exigua, et insensibilis.

Omnium vividissima, et distinctissima evadit forma hujusce spectri, si prisma ita objiciatur cono radioso, ut ejus axis post ingressum in ipsum prisma percurrat intra ipsum rectam tertio lateri parallelam, sive ut is aeque inclinetur ad utramque superficiem refringentem. Ea positio facile acquiritur convertendo prisma circa proprium axem qua conversione movebitur ipsum spectrum progrediens aliquandiu, tum regrediens. Illa positio, in qua progressus in regressum mutatur, est illa ipsa quaesita positio.

33 In hujusmodi spectro colores primigenii non sunt satis separati, nam fila singulorum

Tenve locis acies vix quidquam impellet acutas.
Collectum in medio jubar, et densata coibunt 265
Multa quidem, at varios miscentia stamina fucos.
Namque superpositi vicinis orbibus orbes
Parte sui, implexique simul, contermina jungent
Fucorum genera, et variorum fila colorum.
Ergo adhibent 34 lentem: similes lens vitrea fucos 270
Colligit, et flexum densat jubar, absimilesque
Disjungit radios simul, et variantia fila.
Illa etenim vitro amoto, quod triplice fronte
Procurrit forma triquetrum, si forte nitentem
Sat procul à tenui disjuncta foramine Phoebum 275
Excipiat, flectit torquens fugientia sese
Fila decussatae lucis, formamque rotundam,
Crescentemque fuga punctum compingit in unum;
Quoque magis radiorum aditu removetur ab arcto,

colorum pertinentia ad omnia puncta disci solaris efformant imaginem Solis circularem, et hi circuli commiscentur alii aliis superpositi. Separatio accurata habebitur utique solum in illis lateribus rectilineis, quae circulos omnes contingunt; sed ibi tenuissimum est lumen, et sensum effugit, cum eo adveniant singula tantummodo fila pertinentia ad punctum extremum hinc, et inde solaris disci. In ipsis extremis frontibus erunt itidem purissimi hinc primus rubeus, et inde postremus violaceus; sed ob eandem rationem ibi etiam tenuissimum erit lumen. In medio lumen erit vividius ob superpositionem plurium circulorum; sed ob eandem erunt commixti colores proximi, et multo magis diversi gradus coloris ejusdem.

34 Ad majorem igitur separationem adhibetur lens vitrea, quae apponitur prope prisma in distantia a foramine, quae sit major radio curvaturae ipsius lentis. Illa lens sine prismate excipiens radios omnes transeuntes per illud exiguum foramen, debet illos colligere in quoddam exiguum spatiolum, et velut punctum physicum in certa quadam distantia juxta id, quod diximus lib. II. adn. 40, et 41; quae distantia,

Hoc

Hoc citius medium inflexos conducit ad axem. 280
Illi iterum fugiunt sese, rutilique, rotunda
Syderis ingentem pingunt sub imagine formam:
Ergo, qua coëunt, candentem oppone papyrum
Excipiens Phoebi radios, punctumque coruscans;
Dein triquetrum lenti vitrum adjice: protinus omnes
Diffugient fuci, longe, textuque soluto (285
Punctorum in seriem tenui se tendet imago
Tramite multicolor, purosque ex ordine fucos
Objiciet contemplanti: variantia fila
Disjunget triquetri frons vitri, at contrahet alto 290
Assimiles circum dorso curvata colores
Undique lens, totidemque in puncta nitentia coget,
Quot diversa latent in plena stamina luce.

Hic age 35 jam, tenuique acie pertunde papyrum;
Ut liceat, quoscumque libet, transmittere fucos, 295

ut ibi diximus, eo minor debet esse, quo lens magis distabit à foramine.

Hinc imago Solis, quae sine illa lente deberet esse circulus quidam, nec ita exiguus in distantia aliquanto majore à foramine, et eo major, quo ea distantia est major, evadit sine prismate punctum tenue. Accedente jam prismate, oritur statim illa eadem series imaginum, quae constituebat spectrum, sed hae imagines sunt totidem veluti puncta, quot filorum species. Habetur igitur et intensitas luminis, collectis à lente singularum imaginum filis omnibus homogeneis in spatiolum perquam exiguum, et separatio filorum heterogeneorum facta à prismate, quod alias imagines ab aliis removet. Pro spectro lato oritur tenuis velut funiculus distinctus coloribus admodum vividis, et satis puris.

35 Post hujusmodi accuratiorem separationem habentur jam colores admodum simplices, circa quos experimenta institui possint. Licebit enim excipere spectrum coloratum papyro crassiore, in qua sit exiguum foramen. Per id foramen licebit transmittere quemvis e radiis coloratis, et ipsum novis prismatis, vel speculis, detorquere,

Sive rubescentes malis, viridesve, vel atram
Languentes tristi violam qui lumine tingunt.
Hos iterum, atque iterum triquetris intercipe vitris,
Mille viis agitans versa, partesque per omnes
Contorque inflectens: nunquam se distrahet unus 300
In plures color, aut laeso mutabitur ore.
Attactu viridis fuci viridantia cernes
Cana ligustra, rosas, et purpureos hyacinthos:
Igne novas frondes rubeo, violasque nigrantes,
Liliaque aspicies ardescere: coccina tristi, 305
Sylvarumque comas involvet purpura velo,
Quidquid et attigerit fusco foedabit amictu.
Qualis [36] cum sero fumantes vespere fessus

ut libuerit, refringendo, vel reflectendo: nunquam ille radius novis refractionibus discindetur in duos, nec unquam mutabit colorem suum: et quod magis videtur mirum primo aspectu, ad quamcumque superficiem corporis cujuscumque deflectatur, semper retinebit colorem suum, uti supra innuimus adn. 25. et hic exemplis illustratur.

Duo tantummodo hic iterum adnotanda: primo quidem, ut experimentum satis bene succedat, necessariam omnino esse accuratissimam exclusionem omnis alterius luminis, praeter illum radium simplicem, circa quem observatio instituitur; aliter enim non apparebit is solus radius, sed mixtum quoddam ex eo, et reliquis aliunde allapsis: deinde illud, colorem fore vividum, cum radius adducitur ad superficiem corporis, quod in pleno lumine solet exhibere illum ipsum colorem, quem is radius innatum habet, ut si radius rubeus cadat supra minium, et multo languidior, cum adducitur ad alias superficies, ut si idem cadat supra frondem viridem, vel violam. Id autem inde omnino provenit, quod, ubi radius integer allabitur ad superficiem cujuspiam corporis, ea quidem reflectit omnium generum fila aliquot, sed in multo majore copia illud, quod habet innatum eum colorem, quem exhibet id corpus; quod quidem non modo explicat illud phaenomenum, sed ab eo directe, et immediate probatur.

36 Nox quidem tollendo omne lumen confundit omnia,

Urget

Urget equos Titan, radiosque extinxit in undis,
Lurida nigrantes Coelo Nox explicat alas, 310
Omniaque horrificis confundit foeda tenebris:
Jamque suus periit rebus color: aequoris undae
Caerulei, virides per summa cacumina frondes,
Et picti pratis flores, pictaeque volucres
Mille genus, pecudesque, feraeque, et celsa domorum
Culmina, marmoreisque alte suffulta columnis 315
Templa Deûm, aurataeque trabes, auroque supellex
Illita, et aggestis cumulata altaria donis,
Indiscreta latent simul omnia: nox tegit atro
Involvens pariter velo, et discrimina tollit. 320
Quod si plura [37] simul diversae stamina formae

subducendo illa oculis, nigerrimo nimirum colore inficiens, qui non est color, sed omnium colorum defectus. Radius itidem coloratus simplex, et bene separatus a reliquis omnibus confundit itidem omnia objecta ea inficiens illo colore unico, quem habet innatum, sed non subducit oculo. In eo, quod tollatur omne discrimen, conveniunt; sed in eo discrepant, quod alterum adimit omnem positivam actionem in oculos, alterum relinquit unicam uniformem.

[37] Si pro uno foramine in illa papyro fiant plura; poterunt transmitti plures simul radii simplices quicumque, et in quacumque quantitate, quae dabitur ex data magnitudine, et positione singulorum foraminum. Hi radii pergent separati, et divergentes a se invicem ultra illa foramina; sed si adhibeatur lens altera ultra foramina illa ipsa, poterunt colligi simul, et tum constabit, qui ex data mixtura oriatur color compositus, et an solutio problematis, quam Newtonus proposuit, respondeat phaenomenis.

Invenitur autem illud, si omnia fila a prismate separata colligantur simul, oriri colorem album. Id autem mihi primum indicium fuit correctionis adhibendae solutioni Newtoni, quam innui adn. 16. Si enim in ejus constructione adhibeantur omnes radii separati a prismate, non redit accurate color albus, nisi numeri in ea adhibiti mutentur certa quadam ratione, quam in illa dissertatione exhibui. Adhuc tamen correctio fere semper admodum

Trajicias tenuis per plura foramina chartae;
Lente alia rurſum conjungere, compoſitosque
Quotlibet è puris dabitur ſpectare colores.
His animadverſis 38 unam cognoſcere binis 325
Jam licet e cauſis, caeca Telluris in umbra
Quae merſam ardenti perfundunt ſanguine Phoeben,
Luminaque aërias tingunt traſmiſſa per auras.
Nam radii aetheriis ſubeuntes aëra ab oris
Dum flectunt iter, et medium torquentur ad axem,
Diſtracta in varios diſſolvunt fila colores. (330
Quae violas, quae coerulei placida aequora ponti
Languida nigranti confundunt ſtamina fuco,
Flexa magis, magis ima petunt: referentia contra,
Ardentesque roſas, et fuſi ſanguinis undam, 335
Divitis et venam quae tingunt fulva metalli,
Vi retinent majore viam, ac de tramite recto
Diſcedunt minus, et minus inclinantur in umbram.
Illa igitur ſpatium diffuſa per amplius, atque

exiguam variationem inducit; unde provenit illud, ut ad ſenſum cum utriuſque conſtructionis calculo congruant phaenomena.

38 Expoſita hac diverſae refrangibilitatis theoria, pronum jam eſt, videre alteram e binis cauſis, quae ruborem inducunt in Lunam deficientem. Concipiantur radii illi omnes, qui refracti in atmoſphaera terreſtri praetervolant ſiti in plano quopiam tranſeunte per axem umbrae. Supremus quidem, cujuſcumque coloris ſit, pergit irrefractus: ex infimis violacei refringuntur omnium maximè, rubei omnium minimè; adeoque violacei omnium maxime deſcendunt intra ipſam umbram, et appellunt ad punctum axis maxime propinquum Terrae.

Hinc illud conſequitur, ut radii violacei diſtrahantur omnium maxime, et diſpergantur per ſpatium omnium maximum; rubei verò omnium minimè.

Aſcendendo a Tellure per axem coni umbroſi primo quidem haberetur umbra totalis,

Languida

Languida distractu tanto, et tenuata, minore 340
Percellunt oculos nisu, haec mage densa, minusque
Dissociata, magis pollent, servantque vigorem.
Ergo qua penitus nigrantis stamina coni
Dorsum prima legunt, sola atrae partibus illis 344
Fila meant violae, atque unum, quamquam igne, colo-
Pertenui, inveniat, qui primum emergat ab umbra, (rem,
Attollens Coelo, sese, terrasque relinquens.
Indica dein violae fuco permixta videret
Stamina progrediens, tum quae vada caerula pingunt,
Quaeque novas frondes, tum flava, atque aurea sese 350
Miscerent sensim, ac demum, qua Cynthia tristes
Fusca regit bijugos, mixtum genus omne colorum
Pervolat, et tenui conspergit lumine Divam.
Ast ibi cum distracta minus, quae sanguine fervent,
Fila magis vigeant; Phoeben quoque sanguine tinctam
Ostentant oculis, et caetera robore vincunt. (355
Ne tamen 39 hanc solamve putes, primamve coloris

sine ullis radiis; tum primi occurrerent soli radii violacei, superata jam quinta axis parte; deinde violacei et indici simul commixti, tum superius violacei, indici, et caerulei; tum ii terni, et virides; deinde ii quaterni, et flavi, tum ii quini, et aurei, ac demum omnes simul: is autem locus omnium simul adhuc est inferior eo loco axis, ad quem Luna appellit; et quoniam adhuc ascendendo sursum, semper debet occurrere mixtum quoddam ex omnibus coloribus; in Lunam incurrunt omnium colorum fila. Sed quoniam rubea minus distrahuntur, et dispergunter per minus spatium; ipsa in ejusmodi mixtura praevalent, adeoque ille color compositus debet ad rubeum accedere.

39 Haec causa, quam primo loco proposui, praestat aliquid, sed non ita multum. Nam discrimen illud refractionis radiorum extremorum rubei, et violacei est exiguum. Newtonus in experimentis, quae instituit suis prismatis, invenit

Sanguinei

Sanguinei caufam imprudens: perturbat et illa
Languentis Phoebes vultum, affunditque ruborem,
Sed tenuem: neque enim fpatii difcrimina tanta 360
Purpureus violae pofcit, rubeusque cruoris,
Dum fe diftractus fundit color: ille rubenti
Vix addit novies ternis de partibus unam.
Ergo quid aërias tingat delata per auras
Fila magis, turpique afpergat fanguine Divam, 365
Accipe: nunc almae lucis Natura fub imis
Occultata diu latebris, penitusque repofti

hoc difcrimen effe ejufmodi, ut differentia finuum anguli incidentiae, et anguli refracti effet in filo rubeo extremo minor, quam in violaceo per $\frac{1}{27}$ fui partem. Id quidem ille cenfuit: in omnibus vitris, et vero etiam in omnibus fubftantiis conftanter evenire; et id ipfum expreffi. Eulerus non differentiae rationem conftantem, fed relationem quandam potentiarum cenfuit confiderandam ibi effe, et inde theoriam deduxit telefcopiorum, quorum objectivum vitrum conftaret binis menifcis aquam includentibus, quod fucceffum non habuit. Dollondus longe majore fucceffu aliquanto pofterius invenit illud, in aliis fubftantiis aliam effe, paribus omnibus caeteris, illam diftractionem extremorum colorum ita, ut in quibufdam vitris fit major, quam in aliis in ratione 3 ad 2 et ex iis vitris conftruxit bina objectiva vitra alterum cavum, alterum convexum, et curvaturae majoris, quae fimul conjuncta radios omnium colorum colligunt in unicum punctum: diftantia foci radiorum parallelorum eft pro vitro cavo dimidium, et pro vitro convexo pars tertia diftantiae debitae utrique combinato, et habentur hic ejus generis telefcopia dioptrica pedum 12, quae aequivaleant communibus pedum 60. Credo autem ea ipfa adhuc multo magis perfici poffe, fatis accuratè combinata curvatura binorum vitrorum pro ratione accuratius determinata diftractionis debitae illis ipfis vitrorum fruftris, quae adhibentur, quod ingenti olim Aftronomorum commodo cedet.

Fieri poffet, ut diftractio, quam atmofphaera inducit, fit adhuc major illâ $\frac{1}{27}$ parte, quam diximus, et tunc haec

Nunc

Nunc demum pandendi aditus, frangendaque claustra,
Et reseranda sacris ignota sororibus antra.
Nunc rerum externas dabitur cognoscere formas, 370
Quaeque quibus pleno persusis lumine fila
Pulsa retro redeant, quae per cava viscera serpant.
Principio 40 tenues lucis quocumque ferantur
Particulae, spatio dum progrediuntur eodem,
Alternis geminas permutant dispositiuras, 375

etiam causa majorem haberet partem in efficiendo illo phaenomeno; verum adhuc arbitror, secundae, quam statim subjicio, multo magis tribuendum esse phaenomenum, quam primae.

Porro haec secunda causa pendet ab illa proprietate vicium facilioris reflexionis, et facilioris transmissus, de qua mentionem fecimus adn. 15, et quam nemo ante Newtonum, quod sciam, ne levissima quidem conjectura attigerat, ex qua autem una omnis pendet colorum naturalium theoria, cum ex ea pendeat, quae fila debeant reflecti a particulis corporum, quae transmitti. Mirum sane, quam et ipsa theoria, et consectaria ipsius tam multa, et tanti ad Naturam cognoscendam momenti, in communibus Physicae, et etiam Opticae institutionibus vel tantummodo leviter attingantur, vel etiam penitus omittantur.

40 Proponitur ipsa haec proprietas luminis quaevis particula luminis dum progreditur *spatio eodem*, nimirum per medium homogeneum, acquirit alternatim binas dispositiones, quae redeunt post determinata quaedam intervalla et viae, et temporis: eas redire post intervalla viae aequalia, constat immediate ex observationibus, et experimentis, de quibus infra; redire autem post intervalla temporis aequalia colligi potest ex eo, quod per medium homogeneum lumen debeat moveri uniformiter.

Ejusmodi vicissitudinem binarum proprietatum omnino haberi, immediate, ut diximus, evincunt experimenta; quae autem sit earum causa physica, incertum est. Plures innuo, quarum nonnullas Newtonus profert, ut hypotheses quasdam, ad satisfaciendum iis, qui non possunt in animum sibi inducere, ut aliquod factum in Physica admittant, quin aliquam ejus causam concipiant.

Quae

Quae vicibus redeunt certis post temporis, atque
Post paria intervalla viae; sive [41] aetheris auram
Concitet, alternasque ipsum jubar excitet undas,
Quarum pars olli foveat, cursumque secundet,
Pars contra adverso pugnet contraria fluctu, 380
Sive ipsae [42] in vacuis dum gressum anfractibus ur-
Particulae, variis ciëantur motibus, atque (gent
Aut positum,aut formam mutent, rursumque receptent.
Fors etenim [43] in gyrum jactati turbinis instar
Contorquent sese, jamque hac, jam fronte feruntur

41 Prima petitur ab impressione facta in medium, per quod lumen progreditur. Ea quidem est Newtoni, sed mihi videtur parum probabilis. Est autem hujusmodi in medio per quod lumen progreditur fortasse excitari undas quasdam, quae celerius propagentur, quam ipsum lumen progrediatur, et praevertant radium usque ad ejus medii finem, ubi particula luminis facilius transmittatur per illam superficiem, vel reflectatur retro, prout invenerit undam sibi faventem, vel contrariam. Minus autem probabilis videtur mihi haec causa, quia credo, evinci posse, radium luminis nullam resistentiam pati in medio homogeneo, quam, puto, debere haberi, si ab iis undis determinaretur potius ad reflexionem, quam ad transitum.

42 Reliquae ex iis, quas propono, pendent a forma, et motu particularum ipsarum.

43 Prima ex iis est hujusmodi. Si dum particula luminis progreditur, gyret circa proprium axem, et obvertat superficiei novi medii jam alteram faciem, jam alteram; ipsae autem diversae positiones facierum diversam inducant virium summam, quibus particulae mediorum differentium agant in lumen; diversa autem in diversis casibus longitudo intervallorum determinetur a diversa velocitate, qua particula progreditur, et qua gyrat circa proprium axem. Si, ex. gr. particula luminis habeat, ut magnes, alterum polum attractivum, et alterum repulsivum respectu cujusdam substantiae praevalentis in altero e binis mediis; appellens cum altero polo posset facilius reflecti, et appellens cum altero transmitti facilius.

Aversa:

Aversa: fors 44 et motu trepidante coruscant, (385
Jamque magis rapido properant per inane volatu,
Jam celerem cohibent cursum, et minus incita tendunt.
Fors etiam 45 laxae jam pandunt, atque tumenti
Distendunt sese gremio, jam mole minori 390
Adstringunt pressae alternis variante figura.

44 Potest etiam haberi alternatio quaedam in celeritate particularum progredientium, orta ex actione mutua, quam in se exercent ipsae particulae, et inaequalitate exigua, quae remanet in summa actionum, quas particulae medii non accurate continui, adeoque, nec prursus accuratè homogenei, non penitus eodem semper modo dispositae in sphaeram circa particulam progredientem, in eam exercent. Eae causae in progressu per idem medium possunt compensari post intervalla quaedam, et in mutatione medii reddere faciliorem reflexionem potius, quam transmissionem, vel vice versa.

45 Hanc causam proposui in mea dissertatione de lumine, ex qua etiam facile derivari potest et illud, cur maxima luminis pars refringatur, et reflectatur regulariter certa lege sed aliqua etiam omnino irregulariter dispergatur. Nimirum fieri potest, ut quaevis particula, dum progreditur, mutet figuram suam jam contracta, jam expansa, oscillatione quadam, quae in eadem particula progrediente per idem medium, fiat post aequalia tempora; in diversis particulis, et in diversa medii mutatione diversa sit.

Ejus contractionis, et dilatationis causa habetur omnino in ipsa prima emissione particulae facta per fermentationem corporis emittentis lumen, ubi non omnia puncta constituentia particulam, possunt acquirere eandem prorsus velocitatem emissionis: diversa velocitas disrumperet particulam, divulsis a se invicem punctis, nisi vis mutua, quae in mea theoria Physicae generalis cohaesionem parit per attractionem in majoribus distantiis, et repulsionem in minoribus, ipsa puncta ad se adduceret, minuendo celeritatem in punctis velocioribus, et augendo in tardioribus, donec vis repulsiva agens in distantiis minoribus gignat effectum oppositum. Eo pacto habebitur oscillatorius quidam accessus ad se invicem, et recessus punctorum particulam componentium, adeoque contractio, et expansio regularis: ejus autem lex in mutatione medii mutari potest ex nova inaequa-

Quidquid

Quidquid id eſt, [46] certa mutant vice conditionem;
Et ſi forte novum poſitu ſe corpus in uno
Objiciat; reditus fit promptior, atque repulſus,
Quo relegant iter, et motum in contraria flectant: 395
Dat faciles aditus alter, frontemque ſecundo
Ire per objectam greſſu, et protendere curſum
Adjuvat, atque novi ſuperare obſtacula callis.

li actione in puncta eadem conſtituentia particulam.

Jam vero ſumma virium agentium in particulam, quae pendet a poſitione punctorum omnium, poteſt eſſe admodum diverſa pro diverſitate figurae ipſius particulae. In illa autem expanſione, et contractione oſcillatoria accidet ſanè id, quod in omnibus oſcillationibus, ut nimirum diu conſervetur ſtatus idem ad ſenſum circa maximam contractionem, et maximam expanſionem; ſtatus autem intermedii celerrimè mutentur. Quare maximus particularum numerus deveniet ad ſuperficiem dirimentem diverſa media in illo ſtatu aliquandiu permanente, et tum habebitur, in datis diſtantiis ab ea ſuperficie, data vis, ex quo facile derivatur reflexio ad angulos aequales, vel refractio ad datam rationem ſinuum: multo minor, ſed tamen aliquis numerus adveniet in illa mutatione celeri; et tum vires in iiſdem diſtantiis erunt diverſae pro diverſis particulis, et in regreſſu ejuſdem particulae reflexae vires erunt diverſae ab iis, quas ea habuit in acceſſu, quod inducet refractionem in aliis particulis aliam, et reflexionis angulum diverſum ab angulo incidentiae, adeoque diſperſionem irregularem.

Haec fuſius expoſui in mea Phyſicae naturalis theoria Viennae impreſſa.

[46] Omiſi hic rationes, quas conantur proferre ii, qui lumen putant conſiſtere in undis fluidi elaſtici, ut ſonum; tum quia puto omnino lumen conſiſtere in progreſſu particularum emiſſarum, non in undis ejuſmodi; tum quia in theoria undarum non niſi infeliciſſimam rationem reddi arbitror hujuſce proprietatis luminis.

Sed quaecumque ſit cauſa, effectus, uti diximus, immediatè oſtenditur ab obſervationibus, quae exhibent binas haſce diſpoſitiones, cum quarum altera lumen facilius reflectitur, cum altera facilius tranſmittitur per ſuperficiem dirimentem bina media heterogenea. Porro

Nec

Nec tamen 47 haec cunctis eadem intervalla viarum
Particulis, eadem parti nec semper eidem: 400
Exposcit producta magis quaecumque colorem
Particula exhibeat, dum seu mage pinguia, sive
Densa magis cursum tendit per corpora, dumque
Inclinata magis faciem subit: at nihil istud
Discrimen nostris est aptum hic usibus: illud, 405

notandum illud *facilius*, quod itidem expressi semper in versu; quia non sunt binae dispositiones, cum quarum altera omnino habeatur semper reflexio, et cum altera transmissio, quo casu semper dimidium luminis transmitteretur, et dimidium reflecteretur; sed tantummodo alterum ex iis facilius redditur; sunt autem et alia, quae rem determinent, ut majus, vel minus discrimen mediorum, ac diversa inclinatio incidentiae, nam et majus discrimen, et major inclinatio determinat majorem radiorum copiam ad reflexionem; quae quidem fusius itidem exposui et ego, et P. Benvenutus in ea Dissertatione, cujus mentionem feci supra adn. 16.

47 Longitudo intervalli inter binas oppositas dispositiones non est semper eadem, et discriminis fontes sunt tres. Diversum medium, in quo radius progreditur, diversus angulus, in quo radius advenit ad superficiem refringentem, et diversa natura ipsius radii. Newtonus eas omnes leges determinavit, et primae duae fere nihil pertinent ad causam coloris rubei in Luna deficiente; quae pendet penitus a tertia. Satis est hic illud exprimere pro prima lege, intervalla vicium eo esse majora, quo medium, in quo lumen progreditur, est densius, vel pinguius, caeteris paribus; pro secunda, eo itidem majora esse, quo radius ingreditur magis inclinatus ad superficiem dirimentem bina media: pro tertia lege, in radiis magis refrangibilibus intervalla esse minora, adeoque multo minora in violaceis, quam in rubeis.

Innuo autem originem hujus discriminis: id vel provenit ex eo, quod radii magis refrangibiles moveantur lentius, adeoque, licet aequalibus intervallis temporis succedant sibi invicem binae dispositiones contrariae in omnibus radiis, tamen minora sint intervalla loci in magis refrangibilibus; vel provenit etiam ex eo, quod ipsa dispositio in aliis mutetur

Quod

Quod varia expofcunt variorum fila colorum,
Pertinet huc, illud memori fub pectore conde.
Scilicet intervalla petunt breviora, nigrantem
Stamina quae violam, quam quae vada caerula tingunt.
In reliquis eadem crefcunt ex ordine, quaeque 410
Sanguineam inficiunt undam, vultusque decoros
Pura verecundo fuffundunt fila rubore,
Permutant geminas poft omnia difpofituras,
Dumque vices renovant, fpatio majore feruntur.
Illa quidem ante alios celeri mage concita curfu 415
Forfitan antevolant fucos, pofitusque, vicesque
Permutant fpatiis majoribus, inter utramque
Una licet menfura vicem fit temporis, et fors
Eft fua differitas in tempore, quaeque hyacinthos,
Et violam fucant, citius quoque reftituuntur, 420
Et citius formamque fuam, fortemque refumunt.
Quin etiam, quoniam diverfae ftamina formae,
Quae feptem in claffes conducimus, agmine longo
Se excipiunt, numeroque carent; illa ipfa coloris
Quae fila eiufdem nomen traxere, viaï, 425
Parva quidem, vicibus fua fed difcrimina pofcunt.

At quibus indiciis 48 olim, quibus artibus ufus

breviore tempore, quam in aliis. Puto, demonftrari poffe ex ipfis legibus a Newtono definitis, rem a folo celeritatis difcrimine non pendere.

Porro difcrimen hoc intervalli inter binas difpofitiones, quod in colore rubeo, et violaceo eft ingens, in diverfis filis ejufdem coloris eft itidem aliquod, licet fit exiguum.

48 Tranfit ur hic ad exponenda experimenta, ex quibus Newtonus propofitam luminis proprietatem deduxit, quae quidem mira admodum fagacitate inftituit, et combinavit. E pluribus ejufmodi experimentis praecipuum hic explicandum feligitur.

Extudit

Extudit haec, qui Naturae tam ſancta latentis
Audacem primus tulit in penetralia greſſum?
Ille quidem multa obſervans, tentamina multa 430
Inſtituens, rurſumque iterans, et pectore verſans
Singula, componensque inter ſe plurima, demum
Irrupit, verumque adytis extraxit ab imis
Victor, et immenſo vulgatum prodidit Orbi.
Ipſe tibi hìc pandam delectum ex omnibus unum, 435
Quod facile inſtituas, et rem quod conficit omnem.

Accipe [49], quae tantum praegrandibus apta tuborum
Molibus, ingenti diſtantes aetheris ignes
Augmine demittit Coelo lens vitrea, terrisque
Admovet adducens, cui dorſum hinc ſcilicet, atque hinc
Vix tumeat, plana vix quidquam à fronte recedat. (440
Huic aliam aſſimilem lenti conjungere lentem,
Ne pigeat, planove excurrens aequore vitrum,
Et frontem fronti componere: tanget in arcto (445
Haec illam puncto, et dabit oſcula preſſa; ſed inde
Undique diſcendent per gyrum, atque inter utrumque
Ore tumens patulo circum ſe tendet hiatus.
Aëris hìc velum concluſi, atque ampla patebit
Lamina, quae medio tenuiſſima, quo mage ad oras

49 Experimentum eſt hujuſmodi. Aſſumitur lens vitrea convexa, quae debet eſſe curvaturae perquam exiguae, cujuſmodl nimirum ſunt lentes objectivae in teleſcopiis dioptricis ingentibus plurimorum pedum juxta ea, quae diximus lib. II. num. 45. Huic ſuperponitur altera ejuſmodi lens, vel vitrum ſatis accuratè planum, quod priorem illam lentem contingant in medio. Contactum illum voco oſculum, et quidem preſſum non in ſtricto geometrico ſenſu, in quo circulus, vel alterius curvae arcus diſcitur oſculator curvae cujuſpiam, in quo caſu angulus binorum arcuum eſt infini-

Marginis extremas accesserit, hoc mage crasso 450
Se pandet laxans gremio, et pinguescet eundo.

Nec vero, [50] quacumque libet, quo pandat hiatu
Parte sui sese, quod vitra interjacet inter,
Aërii spatium veli, et quam crassa patescat
Lamina, mensuram capias si rite, latebit. 455
Nam lentes aequum vitreae curvantur in orbem,
Cui tantum medio sese ardua tollit ab imo
Extima frons, quantum aërias consurgit in auras
Ille tubus, celsusque alti petit aetheris ignes.
Ast aequam incurvus qua vertice sustinet orbis 460
Planitiem, et puncto sinuatus tangit in uno,

ties minor angulo, quem circulus utcumque ingens continet in contactu cum alio circulo, vel cum recta linea; sed osculum in sensu quodam poëtico, ut et in lib. IV. versu 163. dixi *Terrestris dorsi post oscula pressa*, et paullo ante *tereti figentes oscula dorso*, ut et alibi; nam contactus in medio, et recessus hinc, et inde perquam exiguus est quoddam velut osculum; in casu autem ejusmodi lentium distantia hinc, et inde est perquam exigua, adeoque est osculum pressum. Contactum autem hic itidem, ut et alibi passim, nomino contactum physicum, non accuratè mathematicum juxta ea, quae et alibi hic innui, et fuse exposui in mea Philosophiae Naturalis Theoria.

Hinc, et inde ab illo contactu intermedio habebitur utique hiatus quidam ortus e vitrorum curvatura, quorum superficies circumquaque distabunt a se invicem, et hic hiatus eo erit crassior, quo magis distabit a contactu, qui fit in centro. In illo autem hiatu habebitur quaedam tenuis velut lamella aëris, cujus itidem crassitudo eo erit major, quo magis recedetur a centro.

50 Ejus lamellae quanta sit crassitudo in quovis loco, facile admodum determinatur: ad ejusmodi determinationem prodesset plurimum schema geometricum; sed conor hic sine ipso schemate methodum ejus determinationis exponere. Consideretur primo casus is, in quo combinetur superficies lentis utrinque aeque convexae cum superficie vitri plani, et concipiantur tres lineae. Prima sit diameter sphaericitatis super-

Mensuras

Mensuras spatiorum animo tibi concipe ternas.
Prima sit, integrum medio quae ducta sub imo
Linea, descensu recto pertunderet orbem:
Altera, contactu, signet, quam distet ab alto 465
Discedens dorsi punctum quodcumque recurvi:
Tertia sit spatii, planae quod ab aequore frontis
Illud idem removet punctum, et designat hiatum.
Aequet uti primam, quoties mensura secunda est,
Aequet ut hanc, toties repetenda est tertia; pandent
Quam numeri, geminas liceat si nôsse priores. (470
At facili ratione licet deprendere primam:
Namque tubo sese tendit bis longior illo,

ficiei ejus lentis; secunda distantia ejus puncti, in quo quaeritur crassitudo lamellae a centro illo, in quo fit contactus; tertia sit crassitudo ipsa quaesita. Illa prior est utique linea, quae pertunderet orbem, ad quem ea superficies est tornata, descendens recta per ejus centrum; secunda est chorda arcus intercepti inter punctum contactus, et punctum superficiei sphaericae, cui respondet crassitudo quaesita; tertia est illud intervallum, quo id punctum distat a superficie plana alterius vitri, quae quidem designat hiatum illum.

Jam vero hae tres quantitates sunt continuè proportionales, nimirum prima toties continet secundam, quoties secunda continet tertiam; nam in circulo est diameter ad chordam, ut chorda ad perpendicularem demissam ex altero extremo ejusdem arcus in tangentem ductam per alterum extremum.

Porro si e tribus quantitatibus continuè proportionalibus innotescant priores binae; facile invenitur tertia per illam, quae in Arithmetica dicitur regula aurea, dividendo nimirum quadratum secundae per primam.

Tota res igitur eo reducitur, ut innotescant priores duae. Prima autem facile invenitur; cum sit quamproxime aequalis duplae longitudini ejus tubi, pro quo illa potest esse lens objectiva: nam ex adn. 40. libri II. lentes utrinque aequè convexae colligunt radios prope centrum sphaericitatis primae superficiei, et telescopium astronomicum est fere ejusdem longitudinis juxta adn. 45. lib.

Vertice qui vitream sublimi ad sydera lentem
Tolleret, et deducta polo demitteret astra. 475
Ipse oculis lustrare potes, digitisque secundam
Prendere, et inciso admotam metirier aere.
Ergo etiam ratione inita, mensura patescet
Tertia, qua curvum discedit ab aequore dorsum.
Quod [51] si se binae contingant vertice lentes 480
In medio; tantum frons curva à fronte recedit,
Discedat quantum simul utraque ab aequore plano,
Quod simul utramque in puncto contingat eodem:
Inde autem [52] disces illud quoque, crescere hiatum
Non îsdem gradibus, queis se mensura secunda 485

II; cum ad id efformandum addatur altera lens multo majoris curvaturae, quae parum addat longitudini ipsi: verum ex Opticae principiis ejusmodi longitudo admodum accuratè determinari potest. Secunda mensura potest assumi ope circini, et definiri ejus magnitudo ope cujuspiam scalae ejus generis, cujus in metallicis regulis solent insculpi plures. Quamobrem et tertia illa mensura quaesita obtinebitur per illam regulam auream, quam innuimus.

51 Superior determinatio exhibet crassitudinem lamellae pro casu lentis convexae impositae superficiei planae; sed ex ipsa facile deducitur determinatio pro casu binarum lentium. Si enim concipiatur planum, quod utramque superficiem contingat, ibi, ubi contingunt se invicem; obtinebitur superiore methodo distantia utriuslibet ab eodem plano, et summa ejusmodi distantiarum exhibeb itdistantiam lentium a se invicem, sive crassitudinem veli aëris interjacentis.

52 Ex ipsa superiore determinatione facile deducitur illud, distantiam binarum superficierum a se invicem, sive crassitudinem lamellae inclusae, esse, ut quadratum distantiae a contactu, nimirum in dupla distantia a contactu quadruplam, in decupla centuplam. Deductio est facilis: nam ex natura proportionis continuae, quadratum illius chordae mediae proportionalis aequatur producto ex diametro convexitatis sphaerae, ad quam vitrum est tornatum, et crassitudinis. Hoc productum est, ut sola crassitudo, cum illa diameter constanter eadem non turbet ratio-

Protendit

Protendit crescens, toties repetendus at idem
Est olli graduum numerus, quot continet ipsa,
Connumeratque gradus: si duplo excreverit, aut si
Haec fuerit triplo magis ampla; bis ille duobus
Terve tribus spatiis se pandit latior îsdem: 490
Cum fuerit decies major mensura secunda;
Producet spatiis decies se tertia denis.
Hinc etiam vitris quod sese interserit aurae
Aëriae velum, quam crassum qualibet extet
Parte sui, nosces, mensuraque certa patebit. 495
Quare 53 age jam, puri filum sat tenve coloris
Excipiens, dorso geminati intercipe vitri;

nem: quamobrem oportet ipsa crassitudo sit, ut illud quadratum chordae, sive distantiae a contactu.

Hoc theorema adhibetur ad probandum mutari dispositionem particularum luminis post intervalla aequalia, ut mox videbimus.

53 Proponitur jam ipsum experimentum, quod ordinatius instituetur hoc pacto. Excipiatur filum tenue, et simplex coloris cujuspiam illis binis vitris conjunctis; et primo quidem adducatur ad centrum, ubi habetur contactus vitrorum; tum ipsa vitra paullatim moveantur in latus. Pars ejus fili reflexa in prima, et secunda superficie primi vitri regredietur retro: de hac hic nullam mentionem facio; sed considero tantummodo illam partem, quae ingreditur lamellam tenuem aëris inclusi inter vitra.

Porro de hac ejus fili parte constabit, initio quidem ipsam, ubi excipitur prope contactum, transire ultra lamellam aëris, et ingredi secundum vitrum; deinde in certa quadam distantia a contactu incipiet reflecti, et redire retro per lamellam ipsam, ac ingredi iterum per superficiem secundam primi vitri: id aliquandiu accidet; tum in alia quadam distantia majore, in qua crassitudo lamellae est adhuc major, incipiet id filum luminis transmitti, et ingredi vitrum secundum: aliquanto ulterius incipiet regredi; atque ita porro alternis vicibus jam progredietur tansmissum, jam regredietur reflexum.

Nimirum dum aliqua particula luminis ingreditur velum aëris, est in vice facilioris

Ac primum, preſſae qua mutua in oſcula frontes
Effundunt ſeſe, fac decidat; inde retracta
In latus à medio paullatim abducito vitra. 500

Principio, qua ſe tenuiſſima lamina clauſi
Aëris adſtringit, purum jubar illius auras
Tranabit tenues: dein craſſior aura ſecundi
Exceptum primas vitri deducet ad oras.
Tum verò geminae ſortes, viciumque regreſſus, 505
Jamque aditus luci facilis mage, jamque repulſus
Promptior, atque viae certa intervalla patebunt.
Primum etenim, dum ſat tenuis tranſcurritur aurae
Lamina, tranſmiſſum jubar aëre in ulterioris
Objectam vitri maſſam pervadet; at aucto 510
Aërii ſpatio veli, jam rurſus in ipſum
Aëra reflexo curſu remeabit, et ima
Objecti primo vitri ſe in viſcera merget,
Jam vice mutata, poſituque, et ſorte novatis.
Scilicet ingrediens auras proceſſerat, atque 515
Tranſgreſſu facili curſum produxerat, at jam

tranſmiſſus: donec lamella eſt tenuior, quam ſit unum intervallum oppoſitarum diſpoſitionum; etiam in fine lamellae eſt in vice facilioris tranſmiſſus, et proinde pergit: at ubi craſſitudo jam uni intervallo aequalis eſt facta: adveniens ad finem lamellae habet diſpoſitionem oppoſitam facilioris reflexionis; et proinde reflectitur, ac relegens idem ſpatium mutat iterum, et appellit ad primum vitrum cum diſpoſitione facilioris tranſmiſſus, ac ipſum ingreditur: ulterius, ubi craſſitudo eſt duorum intervallorum, iterum eſt in vice facilioris tranſmiſſus, et progreditur: adhuc ulterius craſſitudo aequatur tribus intervallis, et in fine lamellae habetur diſpoſitio facilioris reflexionis, et regreditur: atque ita porro debet progredi, vel regredi, prout craſſitudo aequivalet numero intervallorum pari, vel impari.

Sorte

Sorte nova, posituque alio, progressus eunti
Clauditur, ac reditus fit promptior, atque repulsus.
Sed rursum aëriae spatiis crescentibus aurae,
Bis vice mutata, vitro ulteriore feretur 520
Progrediens, iterumque retro post augmina veli
Aërii maiora (vicem nam tertia reddet
Jam spatii mensura novam, et transire vetabit)
Aërios releget tractus, cursumque reflectet.
Atque ita mutatis vicibus dum lamina clausae 525
Auraï sensim se laxat, corpore crasso
Pinguescens magis, atque magis, lux incita cursum
Portrahet admissa alternis, vel pulsa redibit.
Quod si etiam [54] loca certa notes, queis pergere porro
Fas fuerit, vel queis aditus prohibebitur, atque 530
Aërias iterum cursus referetur in auras;
Invenies post aucta aequalibus incrementis
Emensae intervalla viae mutarier ipsas
Usque vices, positusque novos, sortemque redire.
Haec tibi [55], si filum certi quodcumque coloris 535

[54] Quoniam licet determinare loca ipsa, in quibus fit illa transmissio, vel reflexio; licebit ex proportione adnotat. 50 determinare ipsas lamellae crassitudines in iis locis, et constabit, mutationem dispositionis fieri post intervalla aequalia.

Verum haec intervallorum aequalitas deprehendetur etiam sine eo calculo, quo ipsae crassitudines definiantur, atque id ope theorematis propositi adn. 52. Si nimirum notentur distantiae a contactu, in quibus habetur medium luminis transmissi, et reflexi per vices; invenientur eae distantiae ejusmodi, ut earum quadrata habeant rationem numerorum naturalium 1, 2, 3, 4; quam eandem rationem idcirco habebunt et ipsae aëris crassitudines.

[55] Si jam inclinentur vitra ita, ut filum luminis ingrediatur illud velum aëris in diversis angulis, vel si loco aëris includatur aliud medium intra illa vitra, ut aqua, vel oleum,

Junctis excipias vitris, atque aëre clauso,
Provenient: quod si frontem deflexeris ipsam
Vitrorum obliquans, variis ut flexibus auram
Lux subeat, vel si vitris concluseris undam,
Aut oleae succum, aut alios, aliosque liquores; 540
Mutatis semper vicibus reditumque, aditumque
Post paria intervalla viae succedere cernes
Alternis: ast haec ipsa intervalla redibunt
Majora obliquis in flexibus, atque ubi vitris
Corpora clauduntur mage pinguia, vel mage densa', 545
Intervalla vices pariter magis ampla requirent.

Sed [56] quoniam nostris non haec sunt usibus apta',
Ut monui, potius variorum fila colorum
Fac subeant punctae transmissa foramine chartae
Ordine quaeque suo: cernes, ut quodque minori 550
Mutat iter flexu, obliquo nova corpora motu
Cum subit ingrediens, contra majoribus usque
Intervallorum spatiis gaudere viaï',

vel alius quispiam liquor; invenietur, intervalla esse majora caeteris paribus, ubi angulus inclinationis ad superficiem est minor, vel ubi medium est densius, et licebit determinare legem etiam generalem, qua fit ea mutatio longitudinis intervalli, prout pendet ab eo angulo, vel a densitate medii, quod quidem Newtonus praestitit. Verum haec minus faciunt ad rem nostram, quam illud discrimen, quod pendet ab ipsorum radiorum natura diversa, de quo mox agendum.

56 Quod pertinet ad diversa fila colorata, invenitur ope ejusdem experimenti illud, haec intervalla vicium esse longiora in radiis minus refrangibilibus, et breviora in magis refrangibilibus. Et quidem Newtonus legem ipsam definivit, quae respondet certa quadam ratione divisioni octavae in monochordo, ut iisdem rationibus harmonicis alio quodam modo respondent etiam diversi gradus refrangibilitatis radiorum; sed haec innuisse tantummodo sit satis.

Maximaque

Maximaque in roseo, in violae tenuissima fuco.
His ita tentatis, multo 57 jam plura licebit 555
Addere, nec varias cernentem exurgere formas
Invadet stupor ignarum, quae singula longus
Scrutari labor, et latiis celebrare Camoenis.
De genere 58 hoc illud: non tantum tenve coloris
Si filum admittas, ast ampla aspergine primam 560
Vitrorum frontem persuderis, atque papyro,
Transmissumve jubar sistas, retrove repulsum;
Aspicies subito enatas fulgere corollas,
Et circumductos radiantibus orbibus orbes, (565
Queis tamen unus erit color omnibus, ille, per arctum
Admissae lucis tulerant quem fila foramen.
At nigra se rutilis interseret orbibus umbra,
Et circumductos distinguet fusca colores:
Quaque sui nitidas transmittent parte corollas,
Hac umbram retro vitra irradiata remittent: 570
Qua retro rutilos orbes regione reflectent,

57 Huc usque exposuimus experimentum, ex quo deduci possunt principia pertinentia ad hasce vices, quae supra proposueramus, et probanda fuerant; nunc transeundum ad plura egregia sane consectaria, quae inde profluunt, et quae plurium phaenomenorum explicationem exhibent, ac rationem reddunt colorum naturalium tam permanentium, quam variabilium, ex qua demum et rubei Lunae coloris ratio repetitur.

58 Proponitur illud, quod accidit, ubi adveniat ad illa vitra non filum tenue coloris puri, sed amplus radius, quod facile fit, si nimirum fila ejusdem coloris, quae per prisma separata ab aliis, et per lentem unita invicem in spatium tenue, ac transmissa per foramellum, excipiantur iis vitris in aliqua distantia ab eodem, in qua post decussationem satis jam separata sunt. In eo casu si accipiantur deinde super charta munda posita ultra vitra radii transmissi per ipsa vitra; apparebunt in ea orbes quidam circulares ejusdem coloris distin-

Transmittent

Transmittent illa tenebras, orbesque nigrantes.
Non ita 59 si plenum vitris jubar, atque colorum
Immittas simul omne genus : nascentur et orbes
Fucati circum, insertae nascentur et umbrae; 575
Sed non unus erit cunctis color: ille rubebit,
Ille novas referet frondes, violam ille nigrantem:
Atque aliqua e multis rutilabit fascia fucis
Iridis in morem, et quaedam genus omne colorum
Miscebit simul albescens, ac lilia vincet. 580
Perspicuae tenuis quoties nam lamina massae
Excipit illaesum jubar, et conjuncta colorum
Stamina, transmittit partem, partemque repellit,

cti orbibus obscuris: in medio autem erit circellus eodem colore coloratus: coloratos orbes efficient radii circumquaque transmissi ultra lamellam; obscuri respondebunt spatiis, in quibus nulli radii transmittuntur, reflexi nimirum retro juxta adn. 53.

Eadem vicissitudo orbium coloratorum eodem illo colore, et obscurorum, qui illos distinguant, apparebit; si vitris paullulum inclinatis, capiatur super charta posita citra vitra lumen reflexum; sed in medio habebitur circellus, vel potius exigua ellipsis obscurior. In hoc casu et circelli obscuri, et macula in medio non erunt penitus nigri; deveniet enim eo aliqua pars luminis reflexi a superficiebus primi vitri; sed erunt obscuriores orbibus, ad quos deveniet lumen reflexum a posteriore parte lamellae inclusae, adeoque apparebit alternatio orbium eorundem.

59 Diximus, quae accidant, ubi adveniat radius purus coloris certi cujuslibet; hic autem proponitur id, quod observatur, ubi lumen album plenum incidat in ea vitra: tunc nascuntur plures quarundam velut iridum ordines. Cum enim alii colorati radii aliam crassitudinem requirant, ut transmittantur potius, vel reflectantur; combinationes diversae oriuntur diversorum colorum vel transeuntium, vel regredientium, ex quibus oritur color compositus alibi alius, et alicubi accidet etiam, ut nulli radii transmittantur, vel nulli a fine lamellae reflectantur, ac proinde habeantur et fasciae obscurae; alibi vero transmittantur omnes, et oriatur color

Atque

Atque alio tinctam fuco rutilare videbis
Transpiciens, alio si fronte inspexeris illa, 585
Qua radius subit, atque affusam lumine clarat;
Ac varii varia surgent pro mole colores,
Transmissive ultra, retrove redire coacti,
Dum tenuis pressa gracilescit lamina mole. (590
Quamquam eadem [60], fuerit si crassior, omne colorum
Transmittet genus, et retro genus omne repellet.
Id vero si, quae paullo memoravimus ante,
Rursum animo repetas, mentemque ad singula flectas,
Per te ipse invenies, facili et ratione notabis.
Scilicet, ejusdem cum tam sint multa coloris 595
Stamina, staminibusque suum discrimen, iniqua

albus.

Illud autem hic notandum in primis, quod color compositus, qui oritur ex radiis transmissis per certum vitrorum circulum, at exceptis in charta illa ulteriore, observatur admodum diversus ab eo, qui efformatur in charta citeriore ab iis, qui inde reflectuntur, uti patet debere omnino contingere.

Praeterea notandum et illud, dum lamina a margine, ubi ob hiatum amplissimum est maxime crassa, attenuatur perpetuo in accessu ad centrum, debent oriri certae quaedam series colorum compositorum tam ex radiis transmissis, quam ex reflexis, quae series debent respondere illis principiis, quae praemisimus ita, ut illi determinati colores sibi succedant, quos requirit illa attenuatio continua, et qui calculo inito definiri possunt. Et quidem res ita succedit. Newtonus enim eas series computavit, uti supra diximus adn. 16, et P. Benvenutus calculum ex correcta constructione restituit, ac ipsi calculo inveniuntur conformes illae series, quae in ejusmodi experimento observantur, quod quidem omnem hanc theoriam confirmat mirum in modum.

60 Laminae crassae colores non separant, ut lamine tenues; sed in lumine transmisso, quam in reflexo habetur commixtum omne colorum genus; cujus rei ratio ex principiis, quae praemisimus, est admodum manifesta.

Nimirum ejusdem coloris fila, ut initio diximus, in radio al-

Et

Et vicium spatia; haec quamquam tenuissima in una
Est vice differitas, vel ternis, sive quaternis;
Pluribus illa tamen vicium in regressibus aucta (600
Excrescit magis, atque magis; jamque omnibus unam,
Jamque vices geminas, jam centum, aut denique mille
Unius, ejusdemque addunt postrema coloris
Stamina primorum vicibus. Viridantia fila
Hinc aliis, simili vernant quae laeta colore, (605
In vicium praestant numero, et satis ampla viarum
Post spatia adjiciunt jam centum, et mille, novatos
Queis plus alternant positus, formamque resumunt.
Quod simul in rubeoque rosae, ditisque metalli
Evenit in fulvo, reliquisque ex ordine fucis.

Ergo, perspicuae fuerit si lamina massae 610
Crassa satis, filis ex ingredientibus una,
Atque uno tinctis fuco, sub margine demum
Opposito, paribus sortem, formamque resumptam
Plurima signabunt numeris, ac plurima contra,

bo sunt quamplurima, ac ea habent exiguum quidem, sed tamen aliquod discrimen in longitudine intervalli inter binas vices. Hoc discrimen post duo, vel tria, vel quatuor intervalla, duplicatum, triplicatum, vel quadruplicatum, adhuc remanet exiguum; ut idcirco omnia ejusdem coloris fila, quae initio habebant eandem dispositionem, in fine habere debeant itidem eandem ad sensum: at post ingentem numerum intervallorum illud discrimen multiplicatum per eundem numerum id efficiet, ut aliud filum habeat duo, vel decem, vel centum, ac etiam mille intervalla plura, quam aliud quodpiam coloris ejusdem.

Quamobrem si lamina massae perspicuae fuerit satis crassa, ut ingens habeatur in ea numerus intervallorum; inter fila coloris ejusdem cujuscumque simul ingressa primam superficiem, alia mutabunt dispositionem vicium numero pari, alia impare: illa habebunt in fine laminae dispositionem eandem, quam in ingressu,

Et

Et totidem ferme', imparibus: proinde illa priori 615
Quam tenuere vicem, positumque in fronte tenebunt
Tum quoque, jam toties amissam, ac deinde receptam,
Atque adeo transmissa iterum procedere possunt
Promptius, et cursum producere; caetera contra
Oppositam sortita vicem, reflectere gressum 620
Apta magis, massamque iterum pervadere eandem,
Promptius emensas retro referentur ad oras.

Scilicet hinc, per corpus idem si tramite longo
Lux progressa novam ad frontem devenerit, illam
Continuo ferme in geminos discedere cernes 625
Hinc, atque hinc similes radios, quorum alter easdem
Reflexus repetet sedes, procurret at alter
Victor, et objecti per viscera corporis ibit:
Omne genus junctos miscebit uterque colores.

Ast [61] ubi tranandа est tenuis lamella, vicesque 630
Vix geminae positus, seu ternae, sive quaternae
Alternis referunt mutatos, altera rerum

haec oppositam; adeoque omnium colorum fila alia transmittentur per secundam superficiem, et alia regredientur reflexa, uti proposueramus. Inde autem fit, ut radius delatus ad secundam superficiem crassioris laminae, ut laminae vitri, ex qua constant specula, vel quae applicatur fenestris, dividatur in duos similes ingresso, et constantes iisdem colorum speciebus, quorum alter transmittitur, et alter reflectitur.

61 Ubi vero lamella est tenuis, ut contineat pauca admodum intervalla, longe aliter se res habet: cum discrimen inter diversa fila ejusdem coloris sit exiguum; idem erit pro omnibus numerus intervallorum in eo tractu, nimirum vel pro omnibus par, et transmittentur omnia, vel pro omnibus impar, et omnia reflectentur. Sed cum fila colorum distantium a se invicem habeant discrimen multo majus; pro aliis habebitur numerus intervallorum par, pro aliis impar, et idcirco habebitur divisio colorum, aliis transmissis, et aliis reflexis.

Spectanti

Spectanti exurgit facies; namque illita fuco
Quae simili, pariter per primam stamina frontem
Se tulerint progressa, eadem sub fronte secunda 635
Unam itidem sortita vicem ferme omnia, sive
Progressum facilem, seu sunt habitura regressum.
Sed quoniam, vario distant quae fila colore,
Magna etiam in vicium spatiis discrimina poscunt;
Illa pari numero mutant, haec impare, et illa 640
Procurrunt potius, retro haec reflexa recurrunt;
Dividit ac fucos tenuis lamella, coloresque
Ostentat varios varia de parte tuenti.

Nec vero [62], quos transmissu rutilare colores,
Quos fas lamella in quavis remeare, latebit; 645
Si, quae quisque color, quaeve intervalla requirat
Corporis inclusi ingenium, quae luminis ipso
Flexus in ingressu, servata notaveris, atque
Singula per numeros certa versaveris arte.
Praestitit haec, primus qui tot tam mira reperta 650

62 Hic jam habetur id, quod initio innuimus, nimirum posse computari, et a Newtono computatam esse ex intervallis determinatis et speciem, et quantitatem coloris tum transmissi, tum reflexi in determinata quavis crassitudine lamellae, ac inde speciem coloris compositi ex utrislibet, unde oriantur series orbium coloratorum illae eaedem, quae observantur in iis vitris, vel in bullis, quae fiunt tenui velo aquae pinguis, et crassae; cum ibi eundo a circumferentia ad centrum habeatur lamella aëris, vel alterius liquoris inclusi perpetuo attenuata, et hic cutis ipsa attenuetur perpetuo ob descensum aquae, quae efformat in fundo bullae guttam perpetuo crescentem, donec eadem bulla demum disrumpatur. In hac autem bulla videre est series colorum nascentes in summo vertice, ubi cutis est tenuissima, et prout determinatae tenuitatis cujuslibet locus descendit, descendentes itidem, aliis exortis in vertice, qui majori tenuitati debentur: ibidem autem observatur et illud, quod theoria requirit, orbem,

Prodidit

Prodidit educens. Tenuis dum lamina crefcit
Senfim, perque gradus, feries prodire notavit
Ille quidem varias longo ordine, fcilicet illas
Interclufa vitris praebent quas corpora, quasque
Et tenues bullae[f], dorfo dum defluit humor, 655
Atque cutis fenfim gracilefcit, vertice ab alto
Exortas tergo demittunt: orbibus orbes
Nam fefe inferti excipiunt, pulchrasque corollas
Alternant, alios et profpectantibus intro
Tranfmiffos tergo oftentant, aliosque repulfos 660
Convexa dorfi praebent de parte colores.

Hinc etiam [63], quae perfpicuo, quae corpora opaco
Sint gremio, variis varia de parte tuentem
Quae ludant incerta coloribus, et quibus idem,
Curque aliis alius conftet color, omnia ab uno 665
Haufit felici curfu manantia fonte.
Nulla etenim [64] rectis viduata meatibus, atque
Sunt penitus denfa, et venienti impervia luci

qui per reflexionem factam in parte fuperficiei citeriore, exhibet unum colorem, dum continuatur ad partem ulteriorem, quae tranfpicitur intra globum, et ex qua radii ad oculum deveniunt tranfmiffi, non exhibere eundem colorem, fed illum, quem requirunt radii refidui eorum, qui priorem exhibebant.

63 Ex iifdem principiis deducitur difcrimen inter corpora opaca, et pellucida, ac inter ea, quae habent colorem variabilem, et ea, quae conftantem, ut et origo difcriminis inter diverfos colores permanentes diverforum corporum.

64 In primis, quod pertinet ad opacitatem, illa fane non provenit ex eo, quod in corporibus opacis non habeantur pori rectilinei, qui tranfitum permittant radiis progredientibus. Hujus veritatis multa habentur indicia, et probationes fatis manifeftae in communi etiam fententia de continua extenfione materiae; fed in mea theoria, cujus mentionem feci jam pluribus vicibus, id eft omnino evidens. In ea enim conftant corporum particulae

Corpora:

Corpora: materiem permixtum rebus inane
Vincit in immensum, ac radiis via libera semper, 670
In quamcumque plagam sit opus producere cursum,
Panditur. In tenues quaevis, quae maxime opaca,
Nam si lamellas concideris, omnia lucem
Admittunt, coeptoque sinunt procedere cursu.
Exiguas vitreis qui moles orbibus usi 675
Scrutantur contemplantes, satis omnia norunt
Per genera herbarum, per tigna, et membra animan-
Ire jubar, perque et lapides, et dura metalla. (tûm
Progressum anfractus nimii, nimiique meatus
Impediunt luci potius, disjunctaque iniquis 680
Materies spatiis, diversae et fragmina massae
Intermixta simul pariter mage densa, minusque,

punctis prorsus indivisibilibus, et inextensis, a se invicem distantibus per exigua finita intervalla. Hinc puncta spatii sunt infinities plura punctis materiae infinitate ordinis tertii; cum sint numero infinita in quavis linea, et lineae numero infinitae in quavis superficie, et superficies numero infinitae in toto spatio solido. Inde autem facile deducitur, esse infinities improbabilem, et quidem infinitate ordinis secundi, occursum cujusvis puncti materiae cum alio quovis; quam ob causam, uti alibi fusius exposui, quodvis corpus trans aliud quodvis transiret liberrimè sine ullo verae compenetrationis periculo, si nullae adessent vires agentes etiam in aliqua distantia, quarum inaequalitas perturbaret ejusmodi motum, vel si tanta imprimi posset velocitas, quanta satis esset ad reddendum insensibilem earum virium effectum.

Caeterum cujuscunque corporis partes tenues, sed adhuc in immensum crassiores particulis luminis, sunt pellucidae, quod optimè norunt ii, qui microscopia adhibent; adeoque per illas particulae luminis inveniunt rectilineos meatus quaquaversum. Dispositio diversa ipsarum particularum discriminat corpora opaca a diaphanis, et meatus nimii potius officiunt progressui libero luminis. Si enim habeantur inserta inter particulas corporis spatiola justae cujusdam magnitudinis va-

Et

Et facies scabrae, aut incurvae particularum.
Particulam ingrediens quamvis jubar, egrediensve
Parte sui retro pulsum nam flectitur, atque 685
Parte alia producit iter: proin dum nova quaeque
Pergenti objicitur mage densa, ac crassa, minusve,
Pars nova detrahitur de lumine progressuro,
Oppositamque nihil jam ferme appellit ad oram.
Omne jubar variis jam tractum, jamque repulsum 690
Viribus, hac, illac vacuis anfractibus errat,
Imaque perpetuo serpit per viscera flexu.
Adjuvat et positus facierum obliquus, et asper
Mille viis torquens radios, longoque viarum
Circuitu cogit demum consistere fessos. 695

Nonne 65 vides, puri quam sit pellucida vitri

cua, vel etiam plena materia densitatis satis diversae, et potissimum si particulae ipsae sint scabrae, et superficiei irregularis, fit opacum, atque id idcirco, quod in transitu ab uno quovis medio ad aliud diversae naturae habentur et reflexiones, et refractiones, quae progressum rectilineum luminis impediunt, cogendo ipsum motibus admodum perturbatis errare per internam corporis substantiam, donec etiam unjantur fortasse plures luminis particulae cum particulis ipsius corporis.

65 Res facile patet in vitro utcumque pellucido, quod si contundatur in pulverem, evadit opacum, radiis detortis a rectilineo itinere tam in ingressu, quam in egressu cujusvis particulae.

Quin immo etiam sine scabritie, quam inducit illa contusio, facili experimento ostendi potest diaphaneitatem minui per detractionem materiae, quae deberet illam augere, si opacitas proveniret ab obstaculis, in quae lumen incurrat; e contrario autem induci, vel augeri per additionem novae materiae, quae deberet nova addere impedimenta. Si nimirum plures laminae vitreae benè politae conjungantur ita, ut se contingant, constituent unicam laminam pellucidam; sed si alternae subducantur, relictis alternis, pelluciditas vel erit nulla, vel perquam exigua; nam in egressu cujusvis laminae pars

Lamina, qua patulas mos est armare fenestras
Contra imbrem, gelidasque nives, nimbosque sonantes?
Pulveris in tumulum fractam contunde, nec ullos
Transmittet radios jam corpore pulvis opaco: 700
Frons tantum crispata potest, infertus et aër.
Quin etiam laevi si plurima lamina fronte
Consistat, frontesque ipsas conjunxeris; oram
Qui radius primam subiens transcurrerit, omnem
Per massam externas vitri pervadet ad oras, 705
Atque una è multis constabit lamina vitris,
Prospectumque dabit pellucida transpicienti.
Subduc alternas, demptis succedat ut aër,
Seque vitris medium illabens interferat: idem
Flexibus innumeris radius se distrahet, atque 710
Per vitra, infertum per et aëra serpet oberrans,
Nec jam ultra positas res transpectare licebit.
Contra si tenui, quam linea texta papyrum
Contusa ad lympham doctis dant usibus, undam
Affundas, succum potius vel pinguis olivae; 715
Continuo plures radios transmittet, opaco
Sistebat quos ante sinu: namque aëre pulso

luminis reflectetur, adeoque vix quidquam ad postremam postremae laminae superficiem deveniet. Contra vero charta madefacta; et multo magis oleo perfusa, acquirit perspicuitatem, cum is liquor vi agente in lumen minus differat a fibris materiae, ex qua charta constat, quam aër, qui prius aderat in ejus poris.

Quamobrem opacitas consistit in mixtura particularum diversae densitatis, vel habentium majora vacuola intermixta, et pelluciditas in homogeneitate textus, virium inaequalitate ibi detorquente radios, hic nisu circumquaque aequali permittente liberum progressum rectilineum, et uniformem.

Tenvia

Tenvia fila inter sese liquor insinuabit,
Ac magis aëriis pinguedine distat ab auris
Linea materies, liquidis quam distet ab undis, 720
Distet et à succo semper frondentis olivae.

Ergo ubi mixta semel fuerit mage densa, minusque
Materies, vacui nimia vel mole meatus
Sese inter fibras distendant; corpus opaco
Nigrantes tenebras gremio fovet: ast ubi eodem 725
Materies densata gradu se fuderit aeque
Per spatium, latebris alte pellucet in imis.
Namque illic vario pulsu, varioque repulsu
Mille locis inflexa viam detorquet, et alto
Distrahitur lux alma sinu: circum undique contra 730
Viribus hic aequis agitur, neque flectitur usquam.

Jam vero [66] varios varia de parte tuenti
Saepe oculo praebent quaevis pellucida fucos
Corpora, seu crassâ fuerint, seu mole minutâ:
Illa quidem incurvis, vel frontibus inclinatis 735
Si jubar excipiant, reddantque, et fila retexant:
Sic vitrum triquetrum, sic gemmae, et roscidus humor
Mille nitent variis distracto lumine fucis.

66 Quod ad colores variabiles pertinet, bina sunt eorum genera, et binae causae. Primum, de quo hic agitur, est illud, quod fit per separationem colorum factam a refractione corporum non habentium facies parallelas, ut in prismate, et in aquae guttis iisdem exhibentibus, ubi pro diverso positu oculi diversus color perspicitur.

Eam esse originem colorum in prismate, et guttis est omnino certum; eadem est fortasse etiam origo colorum, qui apparent in pilis tenuibus, et filo araneae Soli exposito; nam figura teres potest inducere colorum separationem, etiam per refractionem; sed quoniam ea corpora sunt satis tenuia, fieri

Sic fors et tenues fucantur saepe capilli, [1]
Staminaque, incautam queis captat aranea praedam, 740
At vario [67] ludant quae corpora opaca tuentem,
Quae servent certum, et quem servent quaeque colorem,
A mole, et textu res pendet particularum.
Nam si materies mage densa, aut pinguior imo (745
Lamellam gremio tenuem circum undique claudat,
Incertus color est; certus, si densior, aut si
Pinguior in tenui contra concluditur: illam
Dum subit obliquo radius nam tramite, cursum
Inclinat magis, atque magis, frontique propinquat:
Dum subit hanc contra, erigitur, frontemque relinquit.
Quare ibi pro vario radii flexu advenientis, (750

potest, ut ibi separatio pendeat etiam a tenuitate lamellae, et vacuolo spatio incluso, nam pili sunt quidam tubulus; atque id ea ratione, quam exponemus in sequenti adnotatione; quam ob caussam apposui illud *fors*; dicens *Sic fors et tenues fucantur saepe capilli*.

67 Alterum genus colorum variabilium est illud, quod apparet in collo columbae, in cauda pavonis, et aliis pluribus corporibus, quae pro varia sui positione ad oculum diversos in eadem sui parte colores exhibent; dum alia corpora permanenter eundem semper colorem servant. Id vero pendet a mole, et textu particularum: si adsit lamella tenuis, vacua, vel constans materia minus densa, vel pingui inclusa in materia densiore, vel pinguiore, color est variabilis; si densior, vel pinguior, in vacuo, vel intra materiam minus densam, et pinguem, color est constans.

Ejus rei caussa est hujusmodi. In primo casu radius ingrediens lamellam illam tenuiorem, vel minus pinguem, refringitur recedendo a perpendiculo; et accedendo ad positionem ipsius superficiei refringentis; unde fit, ut via radii intra lamellam sit longior, quam esset, si nulla haberetur refractio; et idcirco pro varia inclinatione radii incidentis admodum varia est longitudo viae intra ipsam lamellam; et habita ratione hujus longitudinis, et longitudinis intervalli inter binas dispositiones oppositas

Flexus

Flexus et ingressi prima cum fronte, terendae
Et mensura viae, ac vicium intervalla, colorque
Mutantur grandi discrimine; singula contra
Hìc ferme constant, fermeque brevissima frontes 755
Oppositas inter teritur via, semper iidem
Et vicium numeri redeunt, îdemque colores.

Scilicet hinc [68] Junonis aves, qua syrmate longo
Expandunt caudam ad Solem, et vernantia prata,
Aethereosque ignes tumidae in certamina poscunt, 760
Matris et Idaliae volucres, per mollia colla,
Nam ludunt, mulcentque oculos variante colore,
Includunt spatia in spatiis mage tenvia densis.
At contra arboreae frondes, maturaque poma,

particularum luminis debitae illis diversis inclinationibus, invenitur, pro diversa directione incidentiae admodum diversum esse numerum intervallorum in motu per lamellam, adeoque longe alios esse colores, qui in alia inclinatione transmittuntur, vel reflectuntur.

E contrario, ubi lamella tenuis est multo densior, vel pinguior medio circumjacente, refractio in ingressu fit per accessum ad perpendiculum; adeoque utcumque magna sit inclinatio radii incidentis, via intra lamellam est parum remota a via perpendiculari omnium brevissima, et longitudo intervalli est ejusmodi, ut idem sit intervallorum numerus pro quovis determinato colore, adeoque iidem colores ad sensum semper reflectantur, iidem transmittantur, et color compositus sit permanenter idem.

68 Hinc autem constat illud, quod initio proposueramus, Newtonum deprehendisse aliquid etiam de interno particularum textu ex sua luminis theoria. Plumae, quae colorem variabilem exhibent, habere debent spatiola vel vacua, vel plena tenui materia, inclusa in materia crassiore, ex qua constant, et idcirco sunt ita leves. Contra corpora, quae habent colorem constantem pro quavis positione oculi, cujusmodi plura hic enumerantur, debent habere densiores, vel pinguiores particulas immersas in vacuo circumjacente, vel aëre, aut quavis rariore materia.

Et teneri flores, pictisque undantia venis 765
Marmora, viventûm cutis, et genus omne metalla,
Totque aliae rerum species, quae certa remittunt
Stamina, constantique impellunt lumina forma,
Tenvibus in spatiis mage densa, aut pinguia claudunt.

Quod reliquum: toto [69] fundit se corpore constans
Ille color, tenuis quem lamina particularum (770
Exhibet, ut fuerit mage crassa, ac densa, minusve.
Lamina nam tenuis, licet usque amplissima vastam
Distendat late frontem, ut memoravimus ante,
Si spatio minus in denso conclusa, minusque 775
Materie in pingui jaceat, sua certa repellit
Filorum genera, et certum tibi tota colorem
Reflexu ostentat, quavis de parte, tuenti.
Contunde infringens: et si non tenvior inde
Prodeat; illum ipsum per singula frusta colorem 780
Aspicies pariter, pariterque in corpore nexis
Compacto e frustis idem color ille manebit.
At si [70] particulae admisso pinguescere succo

69 Huc usque expositum est, *vario ludant quae corpora opaca tuentem*, *Quae servent certum . . . colorem*; hic jam exponitur, *quem servent quaeque colorem*; nimirum cur alia alium constantem colorem habeant. Id constat a crassitudine particularum. Lamina certae exiguae crassitudinis certum colorem exhibet reflectendo juxta adn. 61, qui color pro alia crassitudine est alius. Si ea frangatur in exigua frustula, quae tamen singula servent priorem illam crassitudinem, reflectent itidem singula colorem eundem. Quare et corpus ex ejusmodi frustulis compositum habebit colorem constanter eundem, aliud nimirum alium colorem pro diversa crassitudine lamellarum, ex quibus constat.

70 Aeque facile in eadem theoria percipitur, qui fiat, ut quaedam corpora progressu temporis colorem mutent: id fiet vel admissa nova materia, qua particulae fiant crassiores, vel pinguiores, ut ubi poma, vel

Incipiant,

Incipiant, vel si contra, expirante liquore
Ad Solem, incipiant gracilescere; jam nova fuci 785
Succedet species. Sic et matura trahentes,
Poma novo affundunt vultus radiantia succo,
Et vario picti flores ornantur amictu:
Sic contra virides olim flavescere primum,
Sive rubere etiam, nimio si Solis ab aestu 790
Torrentur, prima frondes aestate videbis,
Tum saepe et flavum nigro mutare colorem:
Sic etiam affrictu et pulvis contusus, et ipsa
Cana ligustra manu nimium compressa nigrescunt.

Unde [71] tamen rubeus Phoebes squalentis in umbra
Exurgat color, et sordescat sanguine vultus; 795
Non haec una satis lucis natura docebit:
Perge age, et aërios animo tibi siste vapores.
Illi equidem, libycis si fors exortus arenis
Africus, Aethiopumve Notus de litore adusto 800
Advolet, ignitis et concitet aëra pennis,
Vel si commixto fervescant sulphure, vel si

flores maturitatem, et colores acquirunt; vel amissa parte veteris materiae, ut ubi liquore per expirationem amisso, siccantur folia, quae saepe colorem viridem mutant in rubeum, tum etiam in nigrum: ac Newtonus definivit etiam ex hujusmodi successione colorum, ad quam e seriebus computatis pro diversa tenuium lamellarum crassitudine pertineant quaedam corpora, et proinde cujus determinatè sint crassitudinis earum particulae.

Compressa etiam florum folia nigrorem acquirunt, et ad ignem nigrescunt ligna, ac aliae ejusmodi mutationes observantur plures, quae ubi accidunt, indicant mutationem factam in ipsa crassitudine, vel pinguedine particularum.

71 Ad reddendam rationem coloris rubei, qui in Luna deficiente observatur; praeter hanc generalem theoriam binarum luminis dispositionum redeuntium per vices, et colorum inde provenientium in lamellis

 Jungantur,

Jungantur, varii miſcent dum praelia venti,
Aucta mole tument, jamque omnia flectere poſſunt
Mutatis vicibus variorum fila colorum. 805
Hinc tumidae ſurgunt maſſae, Coeloque feruntur:
Scilicet hic nebulis, et nubibus ortus opacis.
Aſt ubi jam paullatim aeſtus deferbuit, atque
Seſe iterum adſtringunt tenuata mole vapores;
Prima vicem, quoniam rubeis longiſſima filis 810
Intervalla vices referunt, ſortemque novatam,
Ut monui, retinent rubicundo tincta colore
Stamina, prima globos perrumpunt libera, nec jam
Parte ſui emenſas retro pelluntur ad oras,
Aut vario hac illac flexu diſtracta feruntur: 815
Caetera adhuc mutantque vices, curſumque reflectunt.
Si moles pergat tenuarier, aurea curſum
Libera cum rubeis producunt, tum quoque flava,
Dein fugiunt virides, reliquique ex ordine fuci,
Purus et amotis pellucet nubibus aër. 820
Non tamen 72 uſque adeo tenui ſe mole vapores

tenuibus, ac particulis corporum; oportet praeterea conſiderare naturam atmoſphaerae terreſtris, per quam tranſeunt radii, qui ad Lunam abeunt.

Atmoſphaera eſt referta vaporibus, qui, ſi ſatis intumeſcant ob aliquam e rationibus hic propoſitis, aucta jam mole, reflectunt, uti de craſſis laminis diximus adn. 60. omne colorum genus; hinc ipſi atmoſphaerae tollitur pelluciditas vel penitus, ut per nubes, vel magna ex parte, ut per nebulam.

Ubi moles vaporum ſatis imminuitur, incipiunt liberè tranſire primi omnium radii rubei, caeteris adhuc per reflexionem diſtractis, tum et aurei, et flavi, et reliqui ex ordine, ac poſtremi omnium, imminuta jam plurimum vaporum mole, violacei tranſeunt, et redit ſua pelluciditas atmoſphaerae.

72 Nunquam omues vapores, qui in atmoſphaera terreſtri in-

Adſtringunt

Adſtringunt penitus cuncti, ut genus omne colorum
Poſſit inoffenſo totum procedere greſſu.
Tenvibus admixti ſemper majore ſuperſunt (825
Mole aliqui, torquentque jubar, perque aëra ſpargunt.
Tum vero multi flectentes omnia lucis
Stamina ſi ſuperant, pallet circum undique Coelum,
Pallent vicini colles, disjunctaque longe
Culmina merſa latent penitus caligine triſti.
Aſt ubi ſordentem Zephyri levis aura ſerenat 830
Aëra, jam rubeus color effugit, eque reflexis
Caeruleus filis oritur, Coelumque colorat;
Tranſmiſſae contra flaveſcunt ſtamina lucis.
Denſatur magis, atque magis, violaeque nigranti
Fit color aſſimilis; Boreae de parte nivalis 835
Si gelida errantes adſtrinxerit aura vapores,
Et minimae molis globuli diſpergere dorſo
Jam violae tantum poſſint nigrantia fila.

Praeterea 73 globulus, rubicundae ſtamina lucis
Flectere qui medium evaleat delata per axem, 840.

natant, ad eam tenuitatem deveniunt, ut relinquant viam prorſus liberam omnibus lucis radiis. Si ingens numerus remanet vaporum ejus magnitudinis, ut omnia colorum fila reflectant, ramanet quidam pallor, et ea, quae appellatur caligo; ſi vero exiguus admodum ſit eorum numerus, et plerique ſint adhuc minores; quam requiratur ad reflexionem omnium filorum, rubei tranſmittuntur fere omnes, et idcirco color compoſitus a radiis directis accedit ad flavum, compoſitus vero a reflexis ad caeruleum. Sed imminutis plurimum vaporibus, ut rigidiſſimo flante Borea, ſaturo coeruleo, et ad violaceum accedente colore Coelum imbuitur, praevalentibus plurimum inter radios reflexos violaceis, indicis, coeruleis, radiis.

73 Ad hanc rem intimius perſpiciendam proponitur hic conſiderandus unicus unius va-

Obliquis

Obliquis illapsa viis reliqua omnia flectet.
Majora haec etenim vicium intervalla requirunt,
Perque globum obliquo tendit quae semita calle,
Est brevior, medio quam qui traducitur axis.
At contra medium globulus deducta per axem 845
Vix potis est violae qui languida flectere fila,
Nulla parte sui reliquos inflectere fucos,
Et circum aëriis poterit dispergere campis.
Corporis hinc 74 radius liquidi per viscera si se
Tramite perspicuo tulerit, cui mole minuti 850
Occurrant varia globuli, partemque reflectant,
Semper plura viam mutabunt tristia fila,

poris globulus, ex cujus considerationе patebit illud, in lumine ab atmosphaera serena reflexo debere praevalere colores maximè refrangibiles, et in transmisso per ipsam colores minime refrangibiles. Nam globulus, qui possit reflectere radium rubeum, poterit reflectere reliquos omnes; globuli autem plures, qui poterunt reflectere violaceum, vel alios quosvis, non poterunt rubeum, vel quemvis se minus refrangibilem.

Si enim globus quidam habeat diametrum aequalem intervallo unico coloris rubei; is quidem reflectet radios rubeos transeuntes prope centrum; et cum fere duplo majus sit id intervallum intervallo violacei, non reflectet radios violaceos e dem loco transeuntes; at eosdem reflectet ingressos aliquanto magis ad latus, qui quidem percurrent chordas aequales ad sensum intervallo violacei; nam et omnes chordae sunt minores diametro, atque eo minores, quo remotiores, et intervalla vicium sunt longiora, ubi radii obliquius ingrediuntur. Atque idem locum habet in quovis radio minus refrangibili pro quovis magis refrangibili.

Contra vero, si globulus habeat diametrum aequalem uni intervallo radii violacei, habebit et diametrum, et quamvis chordam minorem intervallo rubei, vel cujusvis minus refrangibilis. Quare is quidem reflectet violaceos, quin possit reflectere rubeos, vel cujusvis coloris minus refrangibilis.

74 Hinc jam patet illud, quod affirmatum fuerat; ubi te-

Quae

Quae referunt violam, ardenti quam tincta rubore,
Caeruleique adeo praebebit forma coloris
Se tibi reflexo spectandam in lumine: contra 855
Transmissum lumen sensim flavescet eundo.
Quin et longa satis post intervalla viarum
Stamina jam violae quondam, jamque indica ferme
Deficiunt, magna distracta e parte, viretque
Reflexum jubar, ac transmissum sanguine fervet. 860
Est alta 75, aequoreas quam mos demittere in undas,
Machina: conclusas gremio premit aëris auras
Nequicquam inferne conata irrumpere lympha.
Hinc inde insertis crystallus pura fenestris

mere dispositi jaceant variarum magnitudinum globuli, debere reflecti majorem multitudinem radiorum violaceorum, et reliquorum e magis refrangibilibus, et transmitti majorem rubeorum, ac minus refrangibilium; cum nimirum debeant occurrere globuli omnium generum; et quicumque reflectit rubeos, reflectat etiam violaceos, mul ti autem violaceos reflectant, quin possint rubeos reflectere. Fieri autem poterit, post satis magnam eorundem globorum multitudinem, ut nulli jam ferre violacei supersint, nec indici, vel caerulei, quo casu praevalebunt virides in radiis ulterius reflexis, et rubei adhuc magis in transmissis.

75. Observationem Halleyi, quae hic exponitur, adhibet Newtonus ipse in Optica ad hanc theoriam confirmandam, Is in urinatoria machina ad ingentem maris profunditatem delatus, accepit per machinae fenestram radium Solis directum, qui erat admodum rubeus; aqua autem visa per radios utique reflexos, apparebat ipsi viridis, omnino juxta superiorem theoriam. Porro Halleyus ipse excelluit plurimum et in Astronomia tam observationibus, quam molestissimis calculis, quibus et tabulas Astronomicas pro planetis, et cometarum orbitas computavit, ac edidit, et in Physica, ac Historia naturali, quas summa industria, et labore excoluit, clarus itidem itineribus ad observationes ineundas ultra aequatorem susceptis, quibus omnibus immortalem sibi famam conciliavit.

Admittit

Admittit Phoebi radios, pontumque coërcet. 865
Ipſa ſuo moles ſtat pondere tuta : ſub imo
Piſcator gremio ſedet, ac vitalibus auris
Veſcitur, et conchas, ſeu dura corallia carpit,
Sive rates fundo merſas rimatur, et aurum
Extrahit, ac vectas peregrino e littore merces. 870
Hac olim, Angligenûm qui maximus, aſtra tueri
Sive opus, et varios numeris ſupponere motus,
Seu ponto, et dubiis vitam concredere ventis,
Naturamque alio ſervare ſub Orbe latentem,
Aeternum Hallejae gentis decus, ima profundi 875
Scrutatus pelagi ſeſe demiſerat alte
Merſus aquis : ſteterant venti, ſupremaque ponti
Se facies laevi conſtraverat aequore. Solis
Irrupit radius, tranſmiſſae et ſpicula lucis
Impetiere manum, quae protinus igne rubenti 880
Emicuit, ſparſo ceu ſanguine tincta maderet.
Reflexis contra radiis circum alta colorem
Unda dabat viridem *rutilos imitata ſmaragdos*.
Plura quidem [76] aequoreis radio ſe obſtacula in undis

[76] Aqua, marina potiſſimum denſior, et ſalinis particulis plena, longe plura luci obſtacula praebet, quam aër : hinc Coelum nunquam ſolemus videre viride : ſi vapores ſunt craſſiores, reflectitur omne radiorum genus, et habentur nubes, ac nebulae, vel caligo, uti diximus : ſi ſunt tenuiores, praevalent in reflexo lumine plurimum radii violacei, et idcirco Coelum apparet caeruleum, et quidem quandoque colore admodum ſaturo ; at multi etiam ex violaceis pergunt tranſmitti, et, ſi iter non ſit ita longum, per atmoſphaeram ; multi adhuc habentur in radio directo : quam ob cauſam radius compoſitus e tranſmiſſis interdiu flaveſcit, vel ad aureum colorem accedit ; ſi autem multo longius ſit iter, ut jam exiguus ſuperſit violaceorum numerus, tum vero di-

Objiciunt

Objiciunt, violaeque bibunt nigrantia fila, 885
Quam, qua perſpicuus nitet, ac ſine nubibus aër:
Hinc nunquam aëriis reflexum lumen ab auris
Aſpicies verni formam praebere viroris.
Seu pallent, ſeu caeruleo dant illita fuco
Stamina. Tranſmiſſi at radii, cum celſus in alto 890
Axe nitet Titan, flaveſcunt ſaepe, metallo
Ac ſaepe aſſimiles fulvo tinguntur, et idem
Mane novo liquidis cum nondum emerſit ab undis,
Seu feſſos cum ſolvit equos jam veſpere ſero,
Suſpectans altas nubes, aſpergine pingit 895
Irrorans rubea, rubeoque Aurora colore
Pura micat, Coeloque roſas effundit ab alto.
Namque jubar Solis demiſſum à lampade, ad ima
Quo magis obliquo tulerit ſe tramite terras,
Hoc etiam aërias tractu majore per auras 900
Se feret, et rubeus poſt plura obſtacula fucus
Uſque magis reliquos tranſmiſſo in lumine vincet.

rectus radius rubeſcit plurimum; quam ob cauſam primo mane, vel ſummo veſpere aliquando rubentem admodum videmus Solem, vel Lunam. Nam, uti ſuperius etiam monuimus lib. IV. adn. 26, quo Sol eſt obliquior, eo eſt longior via radii per atmoſphaeram: et quidem ea Sole in horizonte ſito eſt quamplurimis vicibus longior, quam eodem ſito prope zenith.

Interdiu, ex. gr. ex mille rubeis, et mille violaceis reflectuntur 100 violacei, et 10 rubei, adeoque in lumine tranſmiſſo habentur 990 rubei, et 900 violacei. Ibi ratio violaceorum ad rubeos eſt 10 ad 1, hic ratio rubeorum ad violaceos 11 ad 10: quamobrem ibi quamplurimum praevalent violacei, hic rubei parum praevalent. At Sole ſito in horizonte, et multo magis eodem demerſo alte ſub horizontem, reflexis jam 990 violaceis, et 900 rubeis, remanebunt violacei 10, rubei 100 in lumine reflexo, quod incurrit in nubes, quas cernimus in crepuſculo

His

His animadversis [77], longi jam meta laboris
Arripienda venit: rubei jam prima coloris (905
Causa patet, Phoeben quae densa inflammat in umbra,
Et turpi foedat squalentes sanguine vultus.
Scilicet ad mediam quae lux demittitur umbram,
Aëriis deflexa auris, trans aëra longo
Tendit iter cursu: violae proin plura nigrantis
Dispersa intereunt, rubei quam fila coloris, 910
Transmissumque rubet lumen, rubet ipsa rubenti
Squalentes perfusa genas Dea lumine: fuso
Credideris foedos sordescere sanguine vultus.

Quamquam [78] etiam multo quondam, si credere dignum est,
Sanguine perfundi, perhibent, frontemque, genasque 915
Squalentis Divae, et laniatos unguibus artus.
Quippe ferunt, medio cum jam coëuntia mense
Cornua complevere orbem, similisque nitenti

vespertino, vel aurora, et idcirco iis potissimum temporibus nubes ipsae, quae reflectunt omne radiorum incidentium genus, nobis apparent rubescentes, atque id plurimum, si satis vaporosum sit Coelum.

77 Patet jam hinc causa rubei coloris Lunae. Radii, qui in Lunam incurrunt, sunt ii, qui longissimo tractu per atmosphaeram transmittuntur, intra quam primo descendunt Terram versus, tum ab ea ascendunt praetervolantes. Hinc, si satis vaporosum sit Coelum in ea Terrae parte, per quam radii transeunt, debet omnino Lunae iis radiis illustratae idem accidere, quod nubibus illustratis a Sole delitescente infra horizontem, atque id ipsum multo magis.

78 Postremi hujusce episodii fundamentum omne consistit in Veterum mythologia. Phoebus, Diana, Vesta erant apud ipsos Sol, Luna, et Terra; satis enim constat Veteres nomine Vestae Terram saepe intellexisse. Luna in plenilunio nobis lucidissima apparet, et Solis quodammodo veluti vices gerit per noctem; quo casu pronum est fingere, Dianam sua forma superbientem celebrare festa cum ingenti comitatu Oreadum, ac Dryadum,

Ora

Ora foror fratri radios diffundit ab alto
Aethere, nocturnasque afpectu difcutit umbras, 920
Foemineo elatam faftu, formaque fuperbam
Oftentare jubar Coelo, ac folemnia fefta
Saepe agere, et curru folemnes ducere pompas.
Mille igitur Dryadas fylvis, et Oreadas altis
Montibus impavido fecum per inane volatu 925
Avehit: illae agitant choreas, ac voce fonanti
Concelebrant Divae laudes, et carmine certant.
Ut fola edenti Phoebum vix edita matri
Adftiterit, teneris et fratrem exceperit ulnis:
Ut primis arcu fylvas agitârit ab annis, 930
Cervorumque greges nunquam fallente fagitta
Fixerit: ut patrii jam grandior aetheris arcem
Servârit, geminosque immania corpora fratres
Telorum obruerit nimbo: tu furripis Orco

quas in venatione comites habere folet, quae et hymnum ea occafione canant, de quo hymno dicemus infra: tum vero illa quidem omnia aftra; et ipfam nitidiffimam Venerem ingenti lumine longiffime fuperat. Terra eo tempore vifa ex Luna, debet apparere nigra; caliginofa, et fordida; nam in plenilunio Lunam non nifi per noctem videmus; et ipfa jacens refpectu Terrae ad partes prorfus oppofitas, non nifi obfcuram Terrae ipfius faciem tum videt. Hinc locus habetur amaris dicteriis, quibus tum Veftam Diana aggrediatur infultans:

Porro in novilunio e contrario Lunae facies Terrae obverfa nigrefcit penitus, et Terra e Luna vifa ita effulget, ut Luna in plenilunio, eoque magis, tum quia eft tantillo propior Soli Terra in novilunio, quam Luna in plenilunio, caeteris paribus, tum quia ipfius fuperficies eft multis vicibus major, quam fuperficies Lunae. In novilunio autem Luna inducit Terrae defectum Solis rapiens ejus radios; fed ingens admodum eft difcrimen inter effectum eclipfeos folaris in Terra, et lunaris in Luna. Semidiameter fectionis umbrae in Terra minor eft 100 milliariis

Distractum

Distractum curru juvenem, rursumque sub auras 935
Evehis aethereas, ac nymphae tradis alendum
Egeriae, et luco protectum condis opaco:
Tu regem sacrae turpatum sanguine cervae,
Devotamque premis classem, ac turgentibus undis,
Et lue pestifera fumantes cogis ad aras 940
Sistere regalem gnatam; mox eripis, atque
Mactandam innocua statuis pro virgine cervam:
Illa tuas avecta procul jam sancta sacerdos
Excubat ante aras, sacrisque ministrat, Orestem
Illa suum servat duce te, caesoque tyranno 945
Illa rudi sub fasce tuos referentia vultus
Aufugiens simulacra rapit, nemorisque beato
Condit Aricini clivo: Caledonia regna
Immisso tu plectis apro: tu ventre tumenti
Eurynomae, tu Phoenicae pro crimine turpi 950
Humanos adimis vultus: agit altera pennas

juxta adn. 37. lib. III. Hinc non nisi perquam exiguus est Terrae tractus, qui nigrescit in eclipsi Solis inducta a Luna, adeoque is est quidam veluti naevus in ejus vultu, et solum penumbra late protenditur, quae tantummodo reprimit nonnihil nimios Solis radios, non penitus omnes praeripit. At diameter sectionis umbrae est fere tripla diametri Lunae, quae idcirco tota in umbram immergitur, et diu in eadem perstat. Hae physicae veritates praebent responsum Vestae, quae Dianae reprobat superbiam ex luce aliena, nimirum recepta a Sole; revocat in memoriam nigrorem praecedentis novilunii, collatum cum tanto suo lumine, ac inutilem invidiam, qua tentaverat ipsam objectu sui corporis obscurare, sed ob ejusdem corporis exiguam molem nihil aliud effecerat, nisi moderare fulgorem nimium pallore venustiore, et ornare vultum exiguo nigranti naevo.

Porro ubi Luna jam est immersa in umbra, occupat Coeli partem maxime distantem a loco Solis, adeoque tum Phoe-

Jam

Jam volucris, rictu ursino fremit altera: at illi
Restituis formam miserata, hanc inferis astris:
Te Metabus regno pulsus, te virgo potenti
Praesentem auxilio sensit vix orta Camilla, 955
Ultricemque habuit moriens: volat hasta tumentem
Trans fluvium, et duro infantem sub cortice portat:
Aruntem caesa fugientem virgine telo
Assequitur, Stygiasque Opis detrudit ad umbras:
Nec te secreto nudam licet inscius, antro 960
Impune Actaeon vidit, morsuque suorum
Ipse canum lacer interiit, comitumque sagittis:
Salve Erebo, Coeloque potens, salve, alta Tonantis
Progenies, terras late venerata per omnes, (965
Nympharum comes, et nemorum Latonia cultrix:
Da faciles sylvis succos, da montibus altis
Ardua frugifera vestire cacumina fronde.

Haec celebrant cantu: super omnia frontis honorem

bus Dianae *Frater abest, longeque alia regione moratur*, ubi idcirco potest dici et *Immemor*, qui nihil cogitet de labore sororis tam longe positae. Terra autem interjecta inter Solem, et Lunam tum omnino impedit, ne se mutuo videre possint; adeoque *Aspectum tanti interjecta doloris Hostis dura negat, questusque eludit inanes*.

Fuga comitum in subitis tenebris, equorum perturbatio, ruentis currus periculum, sponte jam consequuntur, ut, et foemineus Dianae furor unguibus se lacerantis, et cruentatae, juxta Veterum morem, qui Diis et immoderatos animi motus, et vitia hominum tribuebant.

Quod autem pertinet ad hymnum, praecipuas Dianae res gestas collegi ex Poëtis; et Mythologis; ejusmodi autem, ut a Nymphis virginibus in ejus laudem commemorari possint; quam ob rem nullam de Endymione mentionem feci. Pleraque autem ex iis, quae protuli, communissima sunt, et notissima.

Fabulati sunt Veteres, eam uno partu editam cum fratre Phoebo, sed ante ipsum, statim egisse obstetricem matri, cujus dodoloribus perterrita virginitatis colendae consilium susceperit.

Adjiciunt, plenumque jubar, noctemque fugatam
Alta sedet curru Latonia virgo, suasque 970
Excipit, ac tacito versat sub pectore laudes
Exultans, plauditque sibi, frontemque procacem
Circumfert late, et formae in certamina quidquid
Axe nitet, pulchri matrem quoque poscit Amoris:
Ac Vestam in primis obscura in nocte jacentem, 975
Sordentemque artus dictis compellat amaris
Insultans, caecamque vocat, fumoque nigrantem.
Illa Deae fastu, justoque agitata dolore,
Usque adeo furis, atque aliena luce superbos
Ostentans, inquit, vultus male cauta quietam 980

Notissimum est, eam a prima aetate fuisse venatricem.

In Gigantum bello dicitur ipsa egregie se gessisse sagittis suis usa, et multum ad victoriam contulisse: porro ipsorum Gigantum principes erant Porphyrion, et Alcioneus.

Hippolyti ab equis distracti, et ab Aesculapio rogatu Dianae resuscitati, ac in curam traditi Nymphae Egeriae, ut in sylvis educaretur, et aevum inglorius traduceret, meminit etiam Virgilius lib. VII. Aen.

Fusius exposui celeberrimam Iphigeniae fabulam. Cum ejus pater Agamemnon in venatione interfecisset cervam Dianae sacram, haec in ejus classem pestilentiam immisit, ac procellis assiduis iter impedivit; oraculi responsum acceptum est, Dianae iram placari non posse, nisi Regis filia immolaretur; cum tamen a patre jam jam immolanda esset, Diana contenta illo ipso tanto dolore patris, filiam surripuit, substitutâ in ejus loco cervâ, eamque transtulit in Tauridem, ubi Sacerdotis munere functa, Orestem fratrem immolandum agnovit, ac cum eo aufugit, occiso etiam, ut quidam addunt, Thoante Tyranno. Surripuit autem ipsum Dianae simulacrum, quod in lignorum fasce absconditum secum abstulit. Sunt autem qui addant, illud ipsum simulacrum deinde delatum esse ab ipsa Ariciam, ubi celebre apud Romanos fuit Dianae templum, et sacer lucus.

Caledonii apri fabella itidem est notissima. Eurynome, et Callisto nymphae Dianae comites inventae gravidae poenam ab ipsa Dea subierunt,

Solicitas

Solicitas, nec me majore effulgere nuper
Lumine, te densis meministi horrere tenebris?
Cum tacita invidia, et caeco succensa furore
Praeripere objecto Phoebeos corpore vultus
Tentâsti, et subita radiantem immergere in umbra, 985
Nequidquam; insanis moles nam tantula coeptis
Obstitit; immodicos pallor mihi fronte venustus
Repressit Solis radios, tenuisque nitentem
Distinxit naevus vultum, et decus addidit ori.
At non, et tenui tantum pallore protervos, 990
Non naevo inficiam vultus ego: disce, age, dictis
Impetere immeritam, et tanto te tollere fastu.
Haec effata locum capit; et qua pompa superbo

altera versa in avem, altera in ursam: sed illi humanam deinde formam restituit; hanc in Coelum transtulit; ubi ea est Ursa major, ac etiam Phoenices nomine appellatur.

Quod ad Metabum, et Camillam pertinet, habetur apud Virgilium lib. XI. Metabus regno pulsus dum fugeret cum infante Camilla; invenit Amasenum fluvium aquis turgentem ob praecedentes imbres; quem cum aliter transmittere non posset, nisi natando, alligavit parvulam hastae, et obduxit arboris cortice; ac voto Dianae nuncupato, futuram virginem, et venatricem, projecit hastam ipsam; quae haesit felicissime, et patri filiam servavit. Cum Aruns eam in bello contra Trojanos interfecturus esset, fatis ita poscentibus; Opim Diana unam e comitibus nymphis summisit; quae mortem heroinae ulcisceretur; atque ea Aruntem caesa virgine fugientem assecuta telo interfecit.

Actaeonis fabula est itidem notissima; qui cum Dianam imprudens in antro nudam vidisset; in quod inter venandum secesserat; ab ea in cervum conversus a suis ipsius canibus laceratus, et suorum telis confixus interiit; quam omnem fabulam elegantissime persequitur Ovidius Metam. lib. III.

Quod sub hymni finem poscitur, id omnino pertinet ad Dryadas, et Oreadas, nemorum, et montium Deas: *Da faciles sylvis fuccos, da montibus altis; Ardua frugifera vestire cacumina fronde.*

Progreditur curru, nigrantem corpore vasto
Protendit conum, ac tenebras affundit opacas. 995
Continuo Dryadesque Deas, namque ordine longo
Antevolant, ducuntque choros, et Oreadas, umbra
Occupat attonitas tristis, pallentiaque ora
Inficit, et densis confundit foeda tenebris.
Prospicit, et casu comitum turbatur acerbo 1000
Cynthia, cum subitus trepidae radiantia pallor
Ora notat, vultuque omnis decor ille venustus
Deperit, atque atra primus jam se imbuit umbra
Frontis apex, toto squalet jam corpore Diva,
Atrati squalent bijugi, subitasque tenebras, 1005
Incertumque horrent callem, currumque ruentem
Arrectis cervice comis per devia raptant.

Heu! quid agat jam sola? metu nam protinus omnes
Montanae, nemorumque Deae, se praepete cursu
Proripuere: atra currum quo flectat in umbra? 1010
Frater, ades, clamat: miserae succurre sorori:
Frater, ades: toto nuper pulcherrima Coelo,
Astriferumque altis late regina per Axem
Vecta rotis, tanta comitum plaudente corona,
Obruor heu misera, et mersi caligine tristi 1015
Sordescunt vultus: jam sola, irrisa per umbram
Raptor, et assuetas currus non sentit habenas.
Frater abest, longeque alia regione vagatur
Immemor. Aspectum tanti interjecta doloris
Hostis dura negat, questusque eludit inanes. 1020
Ergo ira succensa gravi, et furibunda nigrantes
Impetit ungue genas, teneros petit ungue lacertos,
Ungue sinus: denso exundans è vulnere sanguis,
Promicat, et toto late se corpore fundit.

EDI-

EDITORIS MONITUM.

Addimus hic, quæ ipsius Auctoris manu conscripta invenimus in exemplari Londinensi, ex quo hanc editionem comparavimus. Sic autem se habeat.

Post finem hujusce Operis addenda omnino fuerant, quae sequuntur, in laudem Ageni praestantissimi viri Reipub. Genuensis ad Aulam Londinensem Legati, qui me Londini humanissimè hospitio exceperat, et in cujus aedibus tam adnotationes omnes, quam hoc ipsum additamentum conscripseram. Ejus modestia impressionem impedivit; ea tamen illud vetare non potuit, ne in hoc exemplari, in quo plures tam impressionis, quam praeproperae scriptionis errorculos mea manu correxi, idem adjungerem sincerum, ac perenne memoris, et grati animi monumentum.

HAEC super astrorum positu, Lunaeque labore,
Defectu et Solis vario congesta canebam,
Ausonia in magna, Latio dum subdita lustro
Regna Patri, et montes, camposque, urbesque pererro,
Ac Coeli positus, atque intervalla locorum
Mensuris late captis inquiro, tumorem
Telluris vastae, hesperiis quo turget in oris,
(Namque

(Namque aliter tumet illa alibi variante figura)
Ut liceat multam deducere posse per artem (que, 10
Oppidaque, atque vias, montesque, amnesque, lacus-
In tabula, atque omnem certo ordine pingere tractum.
Nunc eadem immensum dimitto impressa per Orbem
Hinc, ubi regalem ad Thamesim me, dulcis Agene,
Excipis hospitio pingui, immensamque per urbem
Deducis latè, et curru circumvehis alto. 15
Ipse quidem cesso, ac tenues exerceo curas
Musarum cultor rudis: aut male cusa retracto
Carmina ad incudem, aut mendosa exempla typorum
Lustro iterum, atque iterum, et studio consumor inani.
Te graviora premunt: commissa negocia tractas 20
Regalis patriae Britonum Legatus in aula:
Ingentis patriae, aequoreis quae tollit ab undis
Augustum caput, et montes consurgit in altos
Despectans humilem turrito vertice pontum;
Corsorum, Ligurumque potens Regina per oras. 25
Illa quidem, ut vidit duro exardescere bello
Usque magis Terrarum Orbem, et neptunia regna,
Tot campos armis, membrisque horrere recisis
Quadrupedumque, virûmque, effusi sanguinis amnes
Ire novos, totum consterni classibus aequor 30
Horrisonis, fractasque undis fluitare carinas;
Libera, sed tanti non et secura pericli
Prospexit longè. Quid magna Britania possit,
Seu bellum urgendum, posito seu foedera bello
Nectenda, et longos nova pax mansura per annos; 35
Vidit, et huc animum, huc oculos intendit acutos.
Scilicet huc mittendus erat; qui mente sagaci
Consuleret patriae, et casus vigilaret in omnes.

Mille aderant longoque ſenes exercita ab uſu
Pectora, conſilioque viri praeſtante, vigore 40
Et juvenes fervente animi: mille omnibus unum
Illa tamen paribusque tibi, ſenibusque, virisque
Antetulit primae vernantem flore juventae.
Uſque adeo norat, cui fidere poſſet, et alti
Virtutes animi, mentemque notarat acutam. 45
Nec vero vana ſpe fallitur: aula frequentem
Excipit hìc, omnesque videt te impendere curas;
Illa procul placida fruitur tranquilla quiete.
Si tamen officiis ſupereſt brevis hora peractis, 50
Et quidquam ceſſare licet, precor, adjice mentem
Huc etiam, ac tenuem ne dedignare Camoenam
Ipſe quoque aſſuetus plectro, fidibusque canoris.
Saepe etenim tumidis Nereus erupit ab undis,
Nympharum comitante choro, Oreadesque puellae
Et Dryades, Faunique, et cornipedes Satyriſci 55
Littora complerunt circum, ac luſere choreis,
Dum canis ad cytharam, et procul alta cacumina, et imae
Valles, et nemora, et reſponſant aequoris undae.
Quin etiam auratis ſculpsere excepta tabellis
Carmina, quae Ligures latè vulgata per oras 60
Aeratis impreſſa notis nunc denique proſtant,
Et ſervant docti monumentum inſigne laboris.

F I N I S.